

# ISO-P SYSTEMIC FUNGICIDE

Caution: "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

ISOprothiolane 40% EC is a systemic fungicide approved for the control of blast disease in rice crop.

Application and dosage recommendations:  
a) Preparation of spray mixture: Take the required quantity of dilute with a little water and stir well using a stick. Then add the remaining quantity of water as per spray volume required and mix well again by stirring.

b) Plant protection Equipments: Use a knapsack sprayer, foot sprayer, Compression knapsack sprayer, compression knapsack backpack sprayer or ASP/EH/P Sprayer.

Compatibility: It is compatible with the commonly used insecticides and fungicides.

Phytotoxicity: It is not phytotoxic when used as per the recommendations.

Storage: 1. The packages containing fungicides shall be stored in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate airtight under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicides. 2. The store room should be well built, well ventilated and sufficient in dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.

Disposal of Empty Container: 1. Packages or surplus material and washing from machines and containers shall be disposed off in a safe manner so to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left out side to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Precautions by user: 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashed. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing with rubber gloves, boots. Face should be covered with dust mask or respirator and an overall or rubber apron hood or hat. 3. Use in high concentrations with low and ultra low volume application equipment is dangerous and should be avoided.

Limitations and Cautions for use: Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, livestock game, wild birds and animals.

Toxicity:  
Acute oral LD50 (rats): Male : 1190 mg/kg, Female : 1340 mg/kg  
Acute dermal LD50 (rats): Male : 10250 mg/kg, Female : 1340 mg/kg

Symptoms of poisoning: Nervousness, anxiety, tremour, convulsions and allergic manifestations.

First Aid measures: 1. Induce vomiting by tickling the back of throat. 2. Wash contaminated skin and clothes and irrigate eyes with normal saline.

Drug Therapy: If ingested, give gastric lavage with care to prevent aspiration. Treat symptomatically.  
Chemical Composition:  
ISOprothiolane I.E.N. (Based on 96% w/w a.i.) : 42.000% w/w  
Emulsifiers (Anionic Dodecyl Benzene Sulphonate Add Cal. Salt and Non ionic Strained glycerol ethylene oxide condensate) : 5.000% w/w  
Solvent (aromeXylene) : 50.000% w/w  
Total : 100.000% w/w

# ಐಸೋ-ಪಿ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

# ಐಸೋ-ಪಿ ಅಡ್ಡಸೋ-ಪಿ ಅಡ್ಡಸೋ-ಪಿ ಕವಕನಾಶಕ

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

# AGASTYA ISO-P SYSTEMIC FUNGICIDE

Caution: "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

ISOprothiolane 40% EC is a systemic fungicide approved for the control of blast disease in rice crop.

Application and dosage recommendations:  
a) Preparation of spray mixture: Take the required quantity of dilute with a little water and stir well using a stick. Then add the remaining quantity of water as per spray volume required and mix well again by stirring.

Compatibility: It is compatible with the commonly used insecticides and fungicides.

Storage: 1. The packages containing fungicides shall be stored in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate airtight under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicides. 2. The store room should be well built, well ventilated and sufficient in dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.

Disposal of Empty Container: 1. Packages or surplus material and washing from machines and containers shall be disposed off in a safe manner so to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left out side to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Precautions by user: 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashed. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing with rubber gloves, boots. Face should be covered with dust mask or respirator and an overall or rubber apron hood or hat. 3. Use in high concentrations with low and ultra low volume application equipment is dangerous and should be avoided.

Limitations and Cautions for use: Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, livestock game, wild birds and animals.

Toxicity:  
Acute oral LD50 (rats): Male : 1190 mg/kg, Female : 1340 mg/kg  
Acute dermal LD50 (rats): Male : 10250 mg/kg, Female : 1340 mg/kg

Symptoms of poisoning: Nervousness, anxiety, tremour, convulsions and allergic manifestations.

First Aid measures: 1. Induce vomiting by tickling the back of throat. 2. Wash contaminated skin and clothes and irrigate eyes with normal saline.

Drug Therapy: If ingested, give gastric lavage with care to prevent aspiration. Treat symptomatically.  
Chemical Composition:  
ISOprothiolane I.E.N. (Based on 96% w/w a.i.) : 42.000% w/w  
Emulsifiers (Anionic Dodecyl Benzene Sulphonate Add Cal. Salt and Non ionic Strained glycerol ethylene oxide condensate) : 5.000% w/w  
Solvent (aromeXylene) : 50.000% w/w  
Total : 100.000% w/w

# ಐಸೋ-ಪಿ ಅಡ್ಡಸೋ-ಪಿ ಅಡ್ಡಸೋ-ಪಿ ಕವಕನಾಶಕ

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

ಐಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ. : ಈ ಅಂಟಿಫಂಗಿಕ್ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಸ್ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಶಿಲಿಂಢ್ರನಾಶಿ.

## INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN  
ವಿಠ್ಠಲನು ದೂರವುಗಾ ಕುಂಟುಂಟಿ.  
ವಣ್ಣು ಸೆ ದೂರ ಸಡಿಲಿ!  
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE  
ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಡ್ಡಸೋ-ಪಿ 40% ಇ.ಸಿ.ಯ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು.



AGASTYA AGRO LIMITED  
An ISO Certified Company  
UNIT-1: Suvary No. 47, Murahani Pally - 501 401  
Medchal Dist., Telangana State  
Mfg Lic. No.: 0277/S-JML/2017

UNIT-II: H.No. 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.  
Mfg Lic. No.: 0227/S-JML/2016  
Customer Care Manager No.: 040-64576998  
E-mail: agastyagro@yahoo.com  
Regn. No. CIR-63, 704/2009-ISO-PROTHIOLANE(EC)/304-31





