AALQUIT

Paraquate Dichloride 24% SL
(NON SELECTIVE CONTACT HERBICIDE)

(Read the entire leaflet before use-follow the instructions fully)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

It is non selective contact herbicide which contains 24% w/w active ingredient Paraquat Dichlorid a.i by mass and balance adjuvants.

Recommendation:

Crop	Common name of weeds	Dosage/Ha A.I. (kgs)	Formu lation (Ltr.)	Dilution in water (Ltrs)	Applications Time & method	Waiting period from last spray to harvest (in Days)
Potato	Chenopodium sp Anagallis arvensis Trianthema monogyna, Cyperus rotundus, Fumaria parviflora	0.5	2.00	500	Blanket or inter row application directed on weeds	100
Cotton	Digera arvensis, Cyperus iria, Trianthema portulacastrum	0.3-0.5	1.25-2.0	500	post emergence directed spray	150-180
Rubber	Digitaria sp Eragrostis sp Fimbristylis sp Eupatorium odoratum	0.3-0.6	1.25-2.5	670	Directed spray on young succulent weed	-
Rice	Ageratum Conyzoides Commelina benghalensis Echinochloa crusgalli, Panicum repens, Cyperus iria Brachiaria mutica Marsilea quadrifoliata, Mollugo spergula	0.3-0.8	1.25-3.5	250	Blanket spray preceeding Pre-ploughing	
Wheat	Grassy & Broadleaved weeds	1.0	4.25	500	Blanket pre-sowing application for minimum tillage	120-150
Tea	Imperata cylindrica Seteria sp. commelina benghalensis boerhavia hispida paspalum conjugatum Clerodendron infortunatum Erechtites valerianifolia Arundinella benghalensis Eupatorium sp	0.2-1.0	0.83-4.25	200-400	Directed spray	90-120
Maize	Cyperus rotundus Commelina benghalensis amaranthus sp Trianthema monogyna Echinochloa sp	0.2-0.5	1.0-2.5	500	a. Blanket presowing application for minimum tillage b. Directed interrow spray on standing weeds at 20-25 Days after sowing	90-120
Grapes	Cyperus rotundus cynodon dactylon convolvulus sp portulaca sp Imtex sp	0.5	2.5	500	Blanket application one young weeds as and when required	90
Apple	Rosa moschata Rosa eglanteria Rubus ellipticus	0.75	3.2	700-1000	Blanket application one young weeds as and when required	
Aquatic Weeds	A. Eichhornia crassipes.	1.0	4.25	600-1000	Blanket application on foliage as and when required	
	B. Hydrilla	1-1.5 ppm in water	4.2	600	do	
	C. Typha jatifolia	1-2	4.2-8.4	600 or more		

Direction of used : Plant protection Equipment: Knapsac sprayer, Foot sprayer, Compression knapsack battery and ASPEE-HTP power sprayer with flat fan or flood jet nozzle.

Symptoms of Poisoning : Irritation, nose bleeding, abdominal Cramp, looseness of bowels and pain signs of liver and kidney failure may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by ticking the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If Clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity: The product is not phytotaxic when used as per field recommendation.

Drug therapy: No specific antidote is known. Treat symptomatically 500 ml of 30% suspension of sterilized benlo or fullers earth may be given orally.

Disposal of used packages, surplus materials & washings of herbicids: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of herbicide and operators to dispose packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Conditions to be specified for storage of herbicids: 1. The package containing the herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the herbicide. 2. The rooms or premises means for storing the herbicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and sufficient dimension.

Precautions for users: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke drink eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

CHEMICAL COMPOSITION

Paraquat Dichloride a.i. (based on 100% w/w a.i.)	: 24.000% w/w
Nonyl Phenol Ethylene Oxide Condensate	: 1.000% w/w
Coco amine ethoxylate	: 4.000% w/w
Silicon - Difoamer	: 0.100% w/w
Dye Acid Blue	: 0.050% w/w
Emetic Dye	: 0.050% w/w
Water	: Q.S.
Total	: 100.000% w/w

ఆల్‌క్విట్

పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24% ఎస్.ఎల్.

(విచక్షణాశక్తిలేని స్పర్శద్వారా నివారించే కలుపునాశని)

(ఉపయోగించుటకు ముందు కరపత్రమును పూర్తిగా చదవవలెను).

హెచ్చరిక : [illegible]

[illegible]

సిఫారసులు:

పంట	కలుపును సామాన్యంగా పిలిచే పేరు	హెక్టారుకు మోతాదు ఎ.ఐ. (కిలోలలో)	సూత్రీకరణ (లీటర్లలో)	కలుపుటకు నీరు (లీటర్లలో)	వాడే సమయం మరియు పద్ధతి	చివరి పిచికారి నుండి కోత కాలం వరకు వేచి వుండాల్సిన సమయం (రోజుల్లో)
బంగాళ దుంప	పప్పుకూర, వాలఆకు, గలిజేరు తుంగ, ఫ్యుమారియా పర్విఫ్లోర	0.5	2.00	500	[illegible]	100
ప్రత్తి	చెంచలికూర, నీటి తుంగ, గలిజేరు	0.3-0.5	1.25-2.0	500	కలుపు మొక్కలు మొలిచిన పిదప	150-180
రబ్బర్	చెంచలికూర కావలిగడ్డి, యుపటోరియం ఒడొరాటమ్	0.3-0.6	1.25-2.5	670	[illegible]	-
వరి	[illegible]	0.3-0.8	1.25-3.5	250	[illegible]	
గోధుమ	గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాటి ఆకులుగల కలుపు మొక్కలు	1.0	4.25	500	[illegible]	120-150
తేయాకు	[illegible]	0.2-1.0	0.83-4.25	200-400	[illegible]	90-120
మొక్క జొన్న	[illegible]	0.2-0.5	1.0-2.5	500	[illegible]	90-120
ద్రాక్ష	[illegible]	0.5	2.5	500	[illegible]	90
ఆపిల్	[illegible]	0.75	3.2	700-1000	[illegible]	
నీటిలోని కలుపు మొక్కలు	ఎ. గుర్రపుడెక్క	1.0	4.25	600-1000	[illegible]	
	బి. హైడ్రిల్లా	1-1.5 [illegible]	4.2	600		
	సి. టైఫా లటిఫోలియా	1-2	4.2-8.4	600 లేదా ఎక్కువ		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

రసాయనిక మిశ్రమము	
పారాక్వాట్ డై క్లోరైడ్ ఎ.ఐ. (100% ఆధారం ఏ.ఐ.)	: 24.000% w/w
[illegible]	: 1.000% w/w
[illegible]	: 4.000% w/w
సిలికాన్ - డిఫోమర్	: 0.100% w/w
[illegible]	: 0.050% w/w
[illegible]	: 0.050% w/w
నీరు	: తగినంత
మొత్తం	: 100.000% w/w

आलक्विट

पॅराक्वॅट डायक्लोराईड २४% एस एल

(निविशेषस्पर्श खरपतवार नाशक)

(इस्तेमाल करने के पहले सारा पर्चा पढ़िये-सावधानियाँ कड़ीप्रकार बरते।)

चेतावनी : इस लेबल/इस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें। यह एक अनुचित स्पर्शीय घास-पात नाशक है जिसमे भार के हिसाब अनुसार २४% सक्रीय तत्व पैराकाट डाई क्लोराइड २४% पुलनशील तरल है बाकी अन्य सहयोगी पदार्थ है।

उपयोग की मात्रा:

फसल	खरपतवार के सामान्य नाम	मात्रा/हेक्टार स.तत्व (कि.ग्रा)	संरचना (लीटर)	पानी कि मात्रा (लीटर)	उपयोग का समय व तरीका	आखिरी छिड़काव तथा फसल काटने में अन्तर (दिनों मे)
आलू	बथुआ कृष्णा नील रेंग्यर घास मोथा जंगली सोआ	0.5	2.00	500	खेल्ट व इन्टर से उपयोग घासपात पर	100
कपास	लहसुआ फूल मोथा पत्थर चट्टा	0.3-0.5	1.25-2.0	500	खरपतवार निकलने के बाद सीधा छिड़काव करें	150-180
रबड	क्रेब घास रामदाना बड़ाकोरा इयुपेटोरियम स्पी	0.3-0.6	1.25-2.5	670	छोटे खरपतवार पर सीधा छिड़काव करें	
धान	महा-कौआ कनकौआ सगा कोच घास मोथा वदरी मारशीलिया स्पी मालुगो स्पी	0.3-0.8	1.25-3.5	250	जुताई-बुवाई से पहले पूर्ण छिड़काव करें	
गेहूँ	घास व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार	1.0	4.25	500	छिड़काव बोने से पूर्व जब खरपतवार छोटे हो	120-150
चाय	कोदो लांगली एपासोली कनकौआ दान घास बागरा कोट बदरा बदरी इयुपेटोरियम स्पी इरेचीथाइटिस स्पी क्लोरोडेनडरोन स्पी	0.2-1.0	0.83-4.25	200-400	सीधा छिड़काव करें	90-120
मक्का	मोथा कनकौआ साठी सावा, मकरा	0.2-0.5	1.0-2.5	500	[illegible]	90-120
अंगूर	मोथा दूबघास कुल्फा फुल्नी	0.5	2.5	500	छोटे खरपतवारों पर पूर्ण छिड़काव जब आवश्यक हो	90
सेब	रोसा मोश्कोटा रोसा एगलेनटेरिया हवस इलापटिकस	0.75	3.2	700-1000	छोटे खरपतवारों पर पूर्ण छिड़काव जब आवश्यक हो	
जलीय खरपतवार	अ.जलकुंभी	1.0	4.25	600-1000	पत्तियो पर जब आवश्यक हो सीधा छिड़काव	
	ब. हाइड्रिल	1-1.5 पानी में पी.पी.एम	4.2	600	उपरोक्त	-
	स. टायफा लेटिफोलिया	1-2	4.2-8.4	600	उपरोक्त	-

उपयोग में आने वाले यन्त्र: नेपसेक स्प्रेयर, फुटस्प्रेयर, काम्प्रेशन नैपसेक बैटरी स्प्रेयर, और एस.पी.ई.ई-एच.टी.पी. पवर स्प्रेयर फलेट फेन या फलड जेट टाइप नोजल वाला।

जहर चढने के लक्षण : त्वचा में जल, नाक से खून आना, पेट दर्द, जोडो का ढीली होना व दर्द होना, लीवर तथा मूत्राशय को ठीक से काम करना हो सकते है।

प्राथमिक उपचार: 1. यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुदगुदी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारानिकला पदार्थ साफ न हो जाए. यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। 2. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा मे साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा मे ले जायें।

विषनाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। स्टेरिलाइज्ड बेन्टोनाइट या मिटटी का 30 प्रतिशत का घोल 500 मिली मुह से दिया जा सकता है।

उपचार: रोगी को बार बार उल्टी कराकर पेट साफ करायें। स्टेरिलाइज्ड बेन्टोनाइट या मिटटी का 30% का घोल 500 मिली. मुह से दें। 2 से 4 घंटो बाद यह प्रक्रिया दुहरायें लक्षणानुसार इलाज करें।

घासपातनाशक के भंडारण हेतु निर्धारित शर्तें: 1. घासपातनाशक के पैकेटो को अलग-अलग कमरों में या खाद्य पदार्थ रखें जाने वाले कमरों से दूर अलग जगह पर या आलमारियो मे दवा के प्रमाण एवं प्रकार के हिसाब से ताला चाबी में अलग-अलग रखें। 2. जिस कमरे या जगह में घासपातनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये।

घासपातनाशक के प्रयोग किये गये डिब्बों, बचे हुई घासपातनाशक तथा पात्रों के धोवन का निपटारा: 1. निर्माताओं तथा उपयोगकर्ताओं का कर्तव्य है कि खाली डिब्बों या बची हुई दवाओं और धोवन का निपटारा सुरक्षित तरीके से इस प्रकार करें कि जिससे पीने का पानी तथा वातावरण के प्रदूषण को रोका जा सके। 2. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडें। 3. पैकेटो को उपयोग के बाद तोडफोड कर आबादी से दूर जमीन में गाड दें।

उपयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां: खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुह, त्वचा और आँखो के सम्पर्क से बचायें।3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

रसायनिक संघटन :

पैराकाट डाइक्लोराइड ए.आई भारानुसार १००% स.त. पर आधारित	: २४.०००% भार/भार
नोनाइल एथीलीन ओक्साइड कन्डेंसेन्ट	: १.०००% भार/भार
कोको अमिनो इथोक्सिलेट	: ४.०००% भार/भार
सिलिकोन - डिफोमर	: ०.१००% भार/भार
डाई एसिड नीला	: ०.०५०% भार/भार
इमेटिक डाई	: ०.०५०% भार/भार
पानी	: पर्याप्त मात्रा
योग	: १००.००० % भार/भार

AGASTYA AALQUIT

Paraquate Dichloride 24% SL
(NON SELECTIVE CONTACT HERBICIDE)

ఆల్‌క్విట్

పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24% ఎస్.ఎల్.

(విచక్షణాశక్తిలేని స్పర్శద్వారా నివారించే కలుపునాశని)

आलक्विट

पॅराक्वॅट डायक्लोराईड २४% एस एल

(निविशेषस्पर्श खरपतवार नाशक)

ಆಲ್‌ಕ್ವಿಟ್

ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ 24% ಎಸ್.ಎಲ್.

(ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮುಖಾಂತರ ಕಳೆ ನಿವಾರಣೆಗೊಳಿಸುವ ಕಳೆನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

गर्मी और खुली लौ से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें।

ఎండ, వేడి, వెలుతురు తగలని చల్లని పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

जहर POISON విషం

Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured by:

AGASTYA AGRO LIMITED

An ISO Certified Company

UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401
Medchal Mandal, Medchal - Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017
(Old Mfg. Lic. No.: 220/1997-98, Dt: 06-07-1997)

UNIT-II : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Tooprannpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

Regd.No.: CIR-61,015/2008-Paraquate Dichloride (SL)(293)-243

आलक्विट

पॅराक्वॅट डायक्लोराईड २४% एस एल

अनिवडक संपर्क वनस्पतीनाशक

(सोबत जोडलेले पत्रक पूर्णपणे वाचा व त्यात दिलेल्या सुचनांचे संपूर्णपणे पालन करा)

खबरदारी : हया लेबल/इस्तपत्रिकेत निर्देशित केलेल्या पीकांकरीताच अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

हे एक बीन निवडक स्पर्शीय तणनाशक आहे, त्यात वजनानुसार २४% सक्रिय तत्व पॅराक्वाट डाईक्लोराइड मिसळणारा तरल पदार्थ आहेत बाकी इतर सहाय्यक पदार्थ आहेत.

शिफारस:

पीक	तणाचे सामान्य नाम	प्रमाणा/हे स.त. (कि.ग्रा.)	द्रावण (लि.)	सौम्यकरणासाठी पाणी (लि.)	फवारणी वेळ आणि पद्धत	शेवटी फवारणी ते कापणी कालावधी (दिवसात)
बटाटा	चिनोपोडियम एसपी अॅनागॅलिस एरवेन्सीस डिजिटेरिया सँग्विनालिस सायपरस रोटंडस न्यूमारिया पार्विफ्लोरा	0.5	2.00	500	लॅकेट किंवा दोन सरी मध्ये फवारणी सांग तणावर	100
कापूस	टैजरिया एरवेन्सिस सायपस इरिया ट्रायन्थमा पोर्टुलाकास्ट्रम	0.3-0.5	1.25-2.0	500	तण उगवल्या वर सरळ फवारणी करू नये	150-180
रबर	डिजेरिया एस.पी. इरागॅस्टिस एस.पी. मिकेनिया एस.पी. पासपॅलम ओव्हेटम इम्पेरेटा सिलिंड्रिका	0.3-0.6	1.25-2.5	670	लहान तणावर सरळ फवारणी करू नये	
भात	[illegible]	0.3-0.8	1.25-3.5	250	ब्लँकेट फवारणी पेरणी पूर्वी	
गहू	गवतवर्गीय तणे	1.0	4.25	500	पेरणी पूर्व गहू तण फवारणी	120-150
चहा	[illegible]	0.2-1.0	0.83-4.25	200-400	सांगितल्या प्रमाणे फवारणी	90-120
मका	सायपस रोटंडस कॉमेलिना बेंगालेन्सिस अॅमारेन्थस एसपी ट्रायन्थमा मोनोगायना इचिनोक्लोया एसपीपी	0.2-0.5	1.0-2.5	500	[illegible]	90-120
द्राक्ष	सायपस रोटंडस सायनोडॉन डॅक्टीलॉन कॉन्वॉल्व्युलस एसपी पोर्टुलाका एसपी ट्रायडॅक्स एसपी	0.5	2.5	500	[illegible]	90
सफरचंद	रोजा मॉसकाटा रोजा इग्लान्टेरिया रुपस इल्लीप्टिकस	0.75	3.2	700-1000	[illegible]	
अॅक्वॅटिक तण	अ. इचिहोरनिया क्रॅसीपस	1.0	4.25	600-1000	[illegible]	
	ब. हाइड्रिला	1-1.5 पी.पी.एम पाण्यात	4.2	800	[illegible]	
	क. टायफा लारिफोलिया	1-2	4.2-8.4	600 या अधिक	[illegible]	

रोप सुरक्षा उपकरणे: नॅपसॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर आणि अस्पी-एचटीपी पावर स्प्रेयर फ्लॅट फॅन फ्लड जेट नोजल।

विषबाधेची लक्षण : त्वचेस जळजळ, नाकातून रक्त वाहणे, पोटात-पेटके येग, शरीर सैलपणा आणि दुखणे, लीवर तसेच मुत्राशय व्यवस्थित काम न करणे।

प्रथमोपचार: १. जर गिळले गेले असेल तर, घशात बोट घालुन उल्टी करवावी हीच क्रिया पुनःकरीत रहावी जो पर्यंत उल्टी साफ होत नाही. जर रुग्ण बेशुद्ध असेल तर उल्टी करवू नये. २. जर कपडे व त्वचा दूषित झाल्यास दूषित कपडे काढा व त्वचा भरपूर साबण व पाण्याने धुवाय ३. जर डोळ्यात गेले तर भरपूर प्रमाणात सलाइन/स्वच्छ पाण्याने जवळ-जवळ १०-१५ मिनीटे धुवा ४. जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास रुग्णाला मोकळ्या हवेत आणा.

औषधोपचार: कोणताही खास उपचार ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा. स्टेरिलाइज्ड बेन्टोनाइट वा मातीचा ३०% चे द्रावण१०० मिली तोंडाद्वारे द्या.

तणनाशकाची साठवण करण्या साठी निर्धारित अटी: १. तणनाशकाची पॅकेजिस वेगळ्या खोलीत वा जागेत इतर सामान साठवणीच्या जागेपासून दूर तणनाशकाचे प्रमाण आणि प्रकारानुसार वेगळ्या कपाटात कडीकुलपात ठेवावे. २. तणनाशक साठवण करण्याची खोली व जागा मजबूद बांधणीची, कोरडी, भरपूर उजेडाची व हवेशीर आणि पूरेशी असावी जेणे करून पर्यावरणाशी वाफेने होणारे प्रदूषण टळेल.

वापरलेली पॅकेजिस, उरलेले साहित्य आणि तणनाशक धुवणाचे पाणी यांची विल्हेवाट: १. निर्माता, तणनाशक फॉम्युलेटर्स आणि ऑपरेटर्सनी रिकामी पॅकेजिस वा इतर साहित्य आणि धुण्याचे पाणी ह्यांची विल्हेवाट अशा पद्धतीने लावावी जेणेकरून पर्यावरण वा पाणी दूषित होणार नाही. २. वापरलेली पॅकेजिसचा पुर्नवापर होवू नये म्हणून उघड्यावर टाकू नयेत. ३. रिकामी पॅकेजिस मोडून-तोडून मनुष्यवस्तीपासून दूर पुरावित.

खबरदारी: १. अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामी डबे आणि जनावरांच्या चायापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. ३. फवारणीची तुषार श्वासाद्वारे आत घेवू नका, वायाच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणी नंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ५. फवारणी करताना धुम्रपान, खाऊ-पिऊ वा चघळू नये. ६. फवारणी द्रवण बनविताना संपूर्ण संरक्षित कपडे वापरावेत.

रासायनिक संघटन :	
पॅराक्वाट डाइक्लोराइड ए.आई भारानुसार १००% स.त. पर आधारित	२४.०००% व/व
नोनाइल एथीलीन ऑक्साइड कन्डेंसेन्ट	१.०००% व/व
कोको अमिनो इथोक्सिलेट	४.००० % व/व
सिलिकॉन - डिफोमर	०.१०० % व/व
डाई एसिड नीला	०.०५० % व/व
इमेटिक डाई	०.०५० % व/व
पाणी	पर्याप्त मात्रा
योग	१००.००० % व/व

ಆಲ್‌ಕ್ವಿಟ್

ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ 24% ಎಸ್.ಎಲ್.

[illegible]

ಬೆಳೆ	[illegible]	ಕ.ತ (ಕೆಜಿ)	[illegible] (ಲೀ)	[illegible] (ಲೀ)	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.5	2.00	500	[illegible]	100
[illegible]	[illegible]	0.3-0.5	1.25-2.0	500	[illegible]	150-180
[illegible]	[illegible]	0.3-0.6	1.25-2.5	670	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0.3-0.8	1.25-3.5	250	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	1.0	4.25	500	[illegible]	120-150
[illegible]	[illegible]	0.2-1.0	0.83-4.25	200-400	[illegible]	90-120
[illegible]	[illegible]	0.2-0.5	1.0-2.5	500	[illegible]	90-120
[illegible]	[illegible]	0.5	2.5	500	[illegible]	90
[illegible]	[illegible]	0.75	3.2	700-1000	[illegible]	
[illegible]	ಎ. [illegible]	1.0	4.25	600-1000	[illegible]	
	ಬಿ. [illegible]	1-1.5 ppm	4.2	600	[illegible]	
	ಸಿ. [illegible]	1-2	4.2-8.4	600 or more	[illegible]	

[illegible] 1-15 [illegible] 10-15 [illegible] 30% [illegible] 500 [illegible]

[illegible]

[illegible]	
[illegible]	24.000% [illegible]
[illegible] (100% [illegible])	
[illegible]	1.000% [illegible]
[illegible]	4.000% [illegible]
[illegible]	0.100% [illegible]
[illegible]	0.050% [illegible]
[illegible]	0.050% [illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	100.000% [illegible]

ஆல்குயிட்

பாரா க்வாட் டைக்ளோரைட் 24% எஸ்.எல்

(நேர்வற்ற தொடு உணர்வு மூலம் அழிக்கும் களைநாசினி)

(உபயோகிப்பதற்கு முன் இந்த நோட்டீஸ் முழுவதையும் படிக்கவும்.)

எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன்படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

இது தேர்ந்தெடுத்து செயல்படாத, தொடுநஞ்சு களைக்கொல்லி, இதில் பாராக்வாட் டைகுளோரைடுதி. மூ. உ௪% எஎ திரட்சியாக மற்றும் இதர துணைப்பொருட்கள் அடங்கி உள்ளன.

பரிந்துரைகள்:

பயிர்	களைகளின் பொதுப் பெயர்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு அளவு: தீ.மூ (கிலோ)	பார்முலேஷன் (லிட்)	கரைக்கும் நீர் (லிட்)	தெளிப்பு நேரம் முறை	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் காத்திருப்புக் காலம் (நாட்கள்)
உருளை	செனோபோடியம் எஸ்பிபி அனகாலிஸ் அர்வென்சிஸ் டிஜிடேரியா சாங்குயினாலிஸ் சைபெரஸ் ரோடண்டஸ்	0.5	2.00	500	பொதுவாக அல்லது வரிசையிடை களைகள் மீது நேரடி தெளிப்பு	100
பருத்தி	டிகோரா அர்வென்சிஸ் சைபெரஸ் இரியா	0.3-0.5	1.25-2.0	500	களை முளைத்த பின் நேரடி தெளிப்பு	150-180
ரப்பர்	டிஜிடேரியா எஸ்பிபி இராக்ரோஸ்டிஸ் எஸ்பிபி மைகானியா எஸ்பிபி	0.3-0.6	1.25-2.5	670	நேரடி தெளிப்பு	
நெல்	அகெராட்டம் கோனிசாய்ட்ஸ் கம்மெலினா பெங்காலென்சிஸ் எகினோக்லோவா க்ருஸ்கல்லி பானிகம் ரிபென்ஸ், சைபெரஸ் இரியா, பராச்சியாரியா மிலிசியா க்வாட்ரிபோலியாடா மால்வஸ்ட்ரம்	0.3-0.8	1.25-3.5	250	பொதுவான தெளிப்பு உழவுக்கு முன்பு	
கோதுமை	புல் மற்றும் அகலமான இலைகளுடைய களைகள்	1.0	4.25	500	விதைப்பதற்கு முன் தெளிக்க வேண்டும்	120-150
தேயிலை	இம்பெராட்டா சிலிண்ட்ரிகா செடாரியா எஸ்பிபி கம்மெலினா போர்ரேரியா ஹிஸ்பிடா	0.2-1.0	0.83-4.25	200-400	இலக்கு நோக்கி தெளித்தல்	90-120
மக்காச்சோளம்	சைபெரஸ் ரோடண்டஸ் கம்மெலினா பெங்காலென்சிஸ் அமராந்தஸ் எஸ்பிபி ட்ரையாந்திமா மோனோகைனா எக்கினோக்லோவா எஸ்பிபி	0.2-0.5	1.0-2.5	500	[illegible]	90-120
திராட்சை	சைபெரஸ் ரோடண்டஸ் சைனோடான் டாக்டைலான் கான்வால்வுலஸ் எஸ்பிபி	0.5	2.5	500	[illegible]	90
ஆப்பிள்	ரோசா மோஸ்கேட்டா ரோசா எக்லாண்டேரியா ரூபஸ் எலிப்டிகஸ்	0.75	3.2	700-1000	[illegible]	
நீர்நிலைக் களைகள்	அ. ஐக்கோர்னியா க்ராசிபெஸ்	1.0	4.25	600-1000	[illegible]	
	ஆ. ஹைட்ரில்லா	1-1.5 பிபிஎம் நீரில்	4.2	600		
	இ. டைபா லாட்டிஃபோலியா	1-2	4.2-8.4	600		

[illegible]

આલક્વિટ

પૅરાક્વૅટ ડાયક્લોરાડ ૨૪% એસ.એલ.

નૉન સિલેક્ટીવ સંસર્ગ ખડનાશક બૉકસોના

(સાથે જોડેલ હસ્તપત્રિકા સંપૂર્ણરિતે વાંચવી અને સુચનાઓનું પાલન કરવું)

(વાપરતા પહેલા આખુ લેબલ તથા મહિતી પત્રા વાંચો।)

ખબરદારી: સાથે આપેલ હસ્તપત્રિકામાં ઊલ્લેખ કરેલ. પાકોમાટેજ એનો પ્રયોગ કરવું જોઈએ અન્ય કોઈપણ પાકોમાટે નહી. આ એક પસંદકીરહિત સંપર્ક નીંદાણનાશક છે. જેમાં સક્રિય દ્રવ્ય તરીકે પરાક્વાટ ડાયક્લોરાઇડ ૨૪% વ/વ તથા અન્ય સંતુલિત દ્રવ્યો છે.

ભલામણ:

પાક (પાકો)	નીંદામણના સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર સ.ત. (કિ.ગ્રા.)	ફોર્મ્યુલેશન (લિટર)	પાણી (લિટર)	છંટકાવના સમય અને પદ્ધતિ	છેલ્લા છંટકાવથી કાપણી સુધીના અંતરાલ (દિવસોમાં)
બટાટા	[illegible]	0.5	2.00	500	[illegible]	100
કપાસ	[illegible]	0.3-0.5	1.25-2.0	500	[illegible]	150-180
રબર	[illegible]	0.3-0.6	1.25-2.5	670	[illegible]	
ડાંગર	[illegible]	0.3-0.8	1.25-3.5	250	[illegible]	
ઘઉં	ઘાસ અને પહોળા પાનનાં અપતૃણ	1.0	4.25	500	[illegible]	120-150
ચા	[illegible]	0.2-1.0	0.83-4.25	200-400	નિર્દિષ્ટ છંટકાવ	90-120
મકાઈ	મોથ્થડિ, શીશમુળી કણજરી વિસરપરા સામા	0.2-0.5	1.0-2.5	500	[illegible]	90-120
દ્રાક્ષ	[illegible]	0.5	2.5	500	[illegible]	90
સફરજન	રોઝા મોસ્કાટા, રોઝા એગ્લાન્ટેરિયા રૂબસ એલિપ્ટિકસ	0.75	3.2	700-1000	[illegible]	
જળીય અપતૃણ	1.જળકુંભી	1.0	4.25	600-1000	[illegible]	
	2.હાઈડ્રિલા	1-1.5 પિપિએમ પાણીમાં	4.2	600		
	3.ટાયફા લેટીફોલિયા	1-2	4.2-8.4	600		

[illegible]

ઘટકો:	
પૅરાક્વૅટ ડાયક્લોરાઇડ સ.ત. (ભારાનુસાર ૧૦૦% સ.ત. પર આધારિત)	૨૪.૦૦૦% વ/વ
[illegible]	૧.૦૦૦% વ/વ
[illegible]	૪.૦૦૦% વ/વ
સિલિકોન – ડિફોમર	૦.૧૦૦% વ/વ
[illegible]	૦.૦૫૦% વ/વ
[illegible]	૦.૦૫૦% વ/વ
પાણી	પર્યાપ્ત માત્રા
યોગ	૧૦૦.૦૦૦% વ/વ