ALLZOLE

PROPICONAZOLE 25% EC (SYSTEMIC FUNGICIDE)

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Propiconazole 25%EC is systemic fungicide with excellent action aganist disease such as karoal bunt & rust of Wheat, leaf spots, rust of groundnut, Sheath blight on rice, blister blight of tea and rust of foyabean. If contains 250gm propiconazole 1-2[-(2-4-dichlorophenyl)-4-propy-1, 3dioxolan-2-yl-methyl]-1-H-1,2,4,-triazole) per litre of emulsifiable concentrate (EC) formulation.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of the Diseases	Dosage/Ha A.I (gm)	Formulation (ml)	Dilution in water (ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (In days)
Wheat	kamal bunt (Neovossia Indica)	125	500	750	30
	Leaf rust/ Brown rust (Puccinia recondita.f sp.triticl)	125	500	750	30
	Stem rust/ Balck rust (B.grainisis f.sp.triticl)	125	500	750	30
	Stripe rust/ Yellow rust (P.striformis)	125	500	750	30
Rice	Shealth bilght(Rhizoctonia solani f.sesakt)	125	500	750	30
Groundnut	Early Leaf Spot (Cercospora arachldicola)	125	500	750	15
	Lale Leaf Spot (C.personata)	125	500	750	15
	Rust (Puccinla arachidls)	125	500	750	15

Direction of use:
measure out required quantity of the mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for high volume of application through knapsack sprayers or high volume sprayers.

Precaution:
1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning: Sedation, dyspnoea, abnormal posture may occur.

first aid:
1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline /clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote: no specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container: disposal of used packages, surplus materials and washings of insecticides.
1. It shall be the duty of manufacturers, fomulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus meterials and washing in a safe manner so as to prevent environental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions: conditions to be specified for storage of insecticides.
1. The package containing insecticides shall be stored articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides.
2. The rooms or premises means for storing insecticides shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition:

Propiconazole a.i. (Min. purity 88%)	: 25.00% M/M
Emulsifying Agent	: 10.00%M/M
(Ethoxylated vegetable oil or equivalent)	
Surfactant/Wetting agent Alkyl aryl sulfonate of Caleium salt	: 3.00%M/M
Cyclohexanone	: 25.00%M/M
Organic solvent-C-IX	: Q.S. to make 100%
Total	: 100.00%M/M

ఆల్‌జోల్

ప్రోపికోనజోల్ 25% ఇ.సి. (అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని)

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతా పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ప్రోపికోనజోల్ 25% ఇ.సి. అనేది ఒక అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని. ఇది కర్నుల్ బంట్ మరియు గోధుమలలో రస్టులు, ఆకు మచ్చలు, వేరుశనగలో రస్టు, వరిలో షీత్ బ్లైట్, టీలో బ్లిస్టర్ బ్లైట్ ఇంకా సోయాబీన్‌లో రస్టులపై ప్రభావంతంగా పనిచేస్తుంది. (ఇసి) ఇందు 250 గ్రాములు ప్రోపికోనజోల్ 1-2-(2,4-డై క్లోరోఫెనైల్) -4-ప్రొపైల్-1, 3 డైగ్లోలాన్-2-వైనిల్ -మిథైల్ -1 హెచ్ -1, 2,4-(ట్రయజోల్)లు ఒక లీటరు ఎమల్సిఫయబుల్ కాన్సంట్రేట్ (ఇసి) సూత్రీకరణందు కలవు.

పంట(లు)	ఎరువుసాధారణ పేరు	మోతాదు/హెక్టారు స.వ (గ్రా)	సూత్రీకరణ మిశ్రమం (మిలీ)	నీటి చివరి స్ప్రే నుండి కోత సమయం మధ్యవేచి ఉండే కాలం (రోజులు)
గోధుమలు	కర్నుల్‌బంట్ (నియోనొస్సియా ఇండికా)	125	500	750	30
	ఆకు రస్టు / బ్రౌన్ రస్టు (పుసినియా రెకండిటె ఎఫ్.స్పె ట్రిటిసి)	125	500	750	30
	కాండం రస్టు/ బ్లాక్ రస్టు (బి.గ్రెనినిస్ ఎఫ్.స్పె.ట్రిటిసి)	125	500	750	30
	స్ట్రైప్ రస్టు/యెల్లో రస్టు (పి.స్ట్రిఫోర్మిస్)	125	500	750	30
రైస్	షీత్ బ్లైట్ (రిజోక్టోనియా సొలని ఎఫ్‌సినకి)	125	500	750	30
వేరుశనగలు	ఎర్లీ లీఫ్ మచ్చలు (సెర్కొస్పొరా అరవిడికోల)	125	500	750	15
	లేట్ లీఫ్ మచ్చలు (సి.పిర్సొనాటా)	125	500	750	15
	రస్టు (పుసినియా అరాఫిడిస్)	125	500	750	15

వాడుటకు సూచనలు : ప్రోడక్టుని కావలసిన మోతాదులో కొలిచి కొద్దిగా నీటిలో కలపండి. మిగతా నీరుని ప్రత్యేక మోతాదులో ఎక్కువ మోతాదులో అవసరమైతే చక్కగా కలిపి స్నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ లేదా పెద్ద వాల్యూమ్‌లో స్ప్రేయర్ ద్వారా వాడచ్చు లేదా అధిక వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్లు.

జాగ్రత్తలు:
1. ఆహార పదార్థాలకు, ఖాళీ ఆహారపు డబ్బాలకి మరియు జంతు ఆహారానికి దూరంగా ఉంచాలి.
2. నోటికి, కంటికి చర్మానికి తాకరాదు.
3. స్ప్రే పొగని పీల్చరాదు, స్ప్రేని గాలి నీచు దశకు చేయరాదు.
4. అంటుకున్న దుస్తులని మరియు శరీర భాగాలని శుభ్రంగా కడగాలి.
5. స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు పొగత్రాగరాదు, త్రాగరాదు, తినరాదు మరియు నమలరాదు.
6. పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తులని కలిపేటప్పుడు మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు ధరించాలి.

విషపు లక్షణాలు : మత్తు, డైస్నోస్నియా, ఆకృతిలో మార్పు ఏర్పడవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స :
1. మింగినట్లయితే గొంతు వెనకాల కితకితలు పెట్టి వాంతులు జరిగేలా చేయండి. ఈ విధంగా వాంతు పూర్తిగా బయటికి వచ్చే దాకా చేయండి.
2. చర్మానికి, బట్టలకు అంటుకున్నట్లయితే, అంటుకున్న చర్మాన్ని, బట్టలని చాలా నీటితో మరియు సబ్బుతో కడగాలి.
3. కళ్ళలోకి వెలితే కళ్ళని సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు కడగాలి.
4. మింగినట్లయితే, రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్ళాలి.

విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీ లేదు, లక్షణాలని బట్టి చికిత్స చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాలని పారేయుట : వాడిన ఖాళీ డబ్బాలని పారేయుట, ఖాళీ అయిన సరుకుని మరియు క్రిమిసంహారకాల డబ్బాలని కడగడం :
1. తయారు చేయువారి బాధ్యత, క్రిమిసంహారకాల సూత్రాలు మరియు వాడే వారు ప్యాకేజీలు లేదా మిశ్రమం మరియు మెషిన్ నుండి కడుగుతున్నప్పుడు లేదా డబ్బాల నుండి పారేసేటప్పుడు సురక్షితమైన ప్రదేశాన్ని చూడాలి, పశిశరాలకు దూరంగా పారేయాలి లేదా నీటి కాలుష్యం కాకుండా చూడాలి వాడిన ప్యాకేజీలని తిరిగి వాడటానికి బ్రయత ఉంచరాదు.
2. వాడిన ప్యాకేజీలని తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచరాదు.
3. ప్యాకేజీలని విరక్కొట్టాలి మరియు పశిశరాలకు దూరంగా పాతి పెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: నిల్వఉంచే పరిస్థితులు ప్రత్యేకంగా ఉండాలి:
1. క్రిమి సంహారకాలున్న ప్యాకేజీలని విడిగా ఉన్న గదులలో లేదా గదులకు దూరంగా లేదా పశిశరాలకు దూరంగా ఉన్న గదులలో ఇతర వస్తువులతో పాటు కాకుండా ఆహార పదార్థాలున్న ప్రదేశంలో కాకుండా విడిగా ఉన్న అల్మారాలలో క్రిమిసంహారకం యొక్క క్వాలిటీ మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళంవేసి ఉంచాలి.
2. గదులు లేదా పశిశరాలు క్రిమిసంహారకాలని చక్కటి గాలి, వెలుతురు, పొడిగా ఉండి, చక్కగా నిర్మించబడిన గదులై తేమ ఉండని ప్రదేశం అయి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

ప్రోపికోనజోల్ ఎ.ఐ.	: 25.00% ఎమ్/ఎమ్
ఎమల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్ (ఎథోక్సిలేటెడ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్ లేదా సమానమైనది)	: 10.00% ఎమ్/ఎమ్
సర్ఫాక్టెంట్/వెట్టింగ్ ఏజెంట్ ఆల్కిల్ ఆరిల్ సల్ఫోనేట్ సి.ఎస్/ఎమ్ఇ లేదా సమానమైనది.	: 3.00% ఎమ్/ఎమ్
సైక్లొహెక్సానోన్	: 25.00% ఎమ్/ఎమ్
ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్-(సి-9)	: క్యూ ఎస్. తయారీ 100%
మొత్తం	: 100.00% ఎమ్/ఎమ్

आलझोल

सावधानी:लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है.

प्रोपिकोनाझोल २५ प्रतिशत विलेय सान्द्रण (अन्तर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

प्रोपिकोनाझोल २५ प्रतिशत विलेय सान्द्रण एक अच्छा अर्न्तप्रवाही फफूंदनाशक है। जिसका उपयोग गेहूं के कर्नाळ बंट, गेरूआँ, धान के पर्णछद अंगमारी रोग, मुंगफली के पत्तियों के दाग और गेरूआँ, चाय के ब्लिस्टर ब्लाइट तथा सोयाबीन का गेरूआँ रोगो के नियंत्रण के लिए होता है। इसमें घुलनाशील रचना के प्रत्येक लिटर मे २५० ग्राम. प्रोपिकोनाझोल (२-(२-(२,४-डायक्लोरोफोनील)-४-प्रोपिल-१,३-डायओसोल-२-इल-मेथील)-१एच-१,२,४ ट्रायझोल) सम्मिलत है।

उपयोग :

फसल	रोग के सामान्य नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा स.तत्व. ग्राम	संरचना मि.ली.	पानी की मात्रा ली.	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनो में)
गेहूं	कर्नाल बंट (निवोसिया इंडिका	१२५	५००	७५०	३०
	पत्ती/भूरी गेरूआँ. ट्रटीसाइ)	१२५	५००	७५०	३०
	तना/काली गेरूआँ (बी.ग्रानिनिस एफ. एसपी.ट्रटीसाइ)	१२५	५००	७५०	३०
	धारी/पीली गेरूआँ (पी.स्ट्राइफोरमिस	१२५	५००	७५०	३०
धान	पर्णछद अंगमारी राजोक्टोनिया सोलानाइ एफ. ससाकाई	१२५	५००	७५०	३०
मूँगफली	अगेता पत्तियों के दाग (सरकोसपोरा अराच्षीडिकोला)	१२५	५००	७५०	१५
	पछेता पत्तियों के दाग (सी. परसोनाटा)	१२५	५००	७५०	१५

उपयोग के लिये निर्देश : उत्पाद की वछित मात्रा लीजीए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। पीठ पर लादकर चलनेवाला छिड़काव यंत्र तथा बडी मात्रा वाले छिड़काव यंत्र आदी मेंबडी मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिल-हिलाकर मिला लीजिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :
१. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
२. मुंह, त्वचा और आँखो के सम्पर्क से बचायें।
३. छिड़काव की वाष्ट को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं।
५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षण : सुस्ती, सांस लेने में परेशानी, असामान्य अवस्था हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा :
१. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाये। यदी महीश बेहोश हो तो उल्टी न करायें।
२. यदी कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं।
४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विष नाशक : कोइ विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बो का निपटारा :
१. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
२. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को खुला बाहर न छोड़े और न ही खाद्य पदार्थ व दूसरी चीजें रखने के काम न लायें।
३. बची हुई कीटनाशक तथा यंत्रों के धोवन को इस प्रकार. निपटारा क[illegible] जिससे आसपास के वातावरण तथा पीने का पानी विषैला न हों।

संग्रहण की शर्तें :
१. कीटनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुंजी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें।
२. जिस कमरे या आलमारी में कीटनाशक या भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा पर्याप्त लम्बा जौड़ा होना चाहिए जिससे कि कीटनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर न हो।

रासायनिक संरचना :

प्रोपीकोनाजोल सक्रिय तत्व	: २५.०% भार/भार
इमल्सीफायर एर्जट (ईथोक्सीलेटर बनस्पति तेल या अनुरूप पदार्थ)	: 10.00% भार/भार
गिलनशील तत्व (अल्काईल एरिल सल्फोनेट का कैल्शियम/सोडियम/मैगनीशयम साल्ट)	: ३.00% भार/भार
साईक्लोहैक्सानोन	: २५.00% भार/भार
ओगेनिक घोलक (सी-१ पर्याप्त मात्रानुसार)	: क्यू.एस. १००% भार/भार
योग	: १००.00% भार/भार

AGASTYA
ALLZOLE

PROPICONAZOLE 25% EC (SYSTEMIC FUNGICIDE)

ఆల్‌జోల్

ప్రోపికోనజోల్ 25% ఇ.సి. (అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని)

आलझोल

प्रोपिकोनाझोल २५ प्रतिशत विलेय सान्द्रण (अन्तर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

ಆಲ್‌ಜೋಲ್

ಪ್ರೊಪಿಕೊನಝೊಲ್ 25% ಇ.ಸಿ. (ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
गर्मी और खुली लौ से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें।
ఎండ, వేడి, వెలుతురు తగలని చల్లని పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ఖతరా అపాయము
DANGER
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured and Marketed by:
AGASTYA AGRO LIMITED
An ISO Certified Company
UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401
Medchal Mandal, Medchal - Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017
(Old Mfg. Lic. No.: 220/1997-98, Dt: 06-07-1997)

UNIT-II : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

For Agriculture use only

REGN. No. : CIR - 37,870/2002-PROPICONAZOLE (EC) -39

आलझोल

प्रोपिकानोझोल २५% ई.सी. (सिस्टमिक फंगिसाईड)

इशारा: हे लेबल/पुस्तिकेत नमूद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर करु नये.

प्रोपिकानोझोल २५% ई.सी. हे कर्नाल बंट, गव्हाचा रस्ट, लीफ स्पॉट, शेंगदाण्याचा रस्ट, तांदळाचे शीथ ब्लाईट, चहाचा ब्लाईट आणि सोयाबिनचा रस्ट ह्यासारख्या रोगांविरुध्द सर्वोत्तम कामगिरी करणारे एक सिस्टमिक फंगिसाईड आहे. र्क्वांशच्या एमलसिफिएबल संहत (ईसी) फार्म्युलेशनच्या प्रत्येक लिटरमध्ये प्रोपिकानाझोल १-२(-२-४ डायक्लोरोफेनिल)-४-प्रॉपिल-१,३ डायक्झोलान-२ वायएल मिथाईल)-१ एक-१,२,४,-ट्रायाझोल) २५० ग्रॅम्स असते.

शिफारस :

फसल	रोगाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर क्रियाशील घटक (ग्रॅम)	फॉर्म्युलेशन (मि.ली.)	पाण्यातील विरलता (लिटर)	शेवटची फवारणी ते पीक काढणे ह्यामधील वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवसात)
गहू	कर्नाल बंट (निओवोसिया इंडिका)	१२५	५००	७५०	३०
	लीफ रस्ट/ब्राऊन रस्ट (पुसिनिया रेकांडिटा एफ.एसपी. ट्रिटिसी)	१२५	५००	७५०	३०
	स्टेम रस्ट/ब्लॅक रस्ट (पी.ग्रामिनिस एफ.एसपी.ट्रिटिसी)	१२५	५००	७५०	३०
	स्ट्राईप रस्ट/यलो रस्ट (पी. स्ट्रिफॉर्मिस)	१२५	५००	७५०	३०
भात	शिथ ब्लाईट (व्हिझोक्टोनिया सोलानी एफ.सेसाकी)	१२५	५००	७५०	३०
शेंगदाणा	अर्ली लीफ स्पॉट (सर्कोस्पोरा ॲराचिडिकोला)	१२५	५००	७५०	15
	लेट लीफ स्पॉट (सी. पर्सोनाटा) रस्ट	१२५	५००	७५०	15
	(पुसिनिया ॲराचिडिस)	१२५	५००	७५०	15

उपयोग करण्याचा सूचना :

आवश्यक प्रमाणात उत्पादन मोजून घ्या आणि थोड्या प्रमाणाच्या स्प्रेयर्स ने उपयोग करण्यासांठी उरलेले पाणी चांगले घुसळून मिसळा.

खबरदारी :

१. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थाचे रिकामे डबे आणि पशुखाद्य यापासून दूर ठेवा.
२. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा.
३. फवाऱ्यातील तुषार श्वासावाटे आत जाऊ देऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारा.
४. फवारल्यानंतर खराब झालेले कपडे आणि शरीराचे भाग स्वच्छ धुवा.
५. फवारताना धुम्रपान, काहीही पिणे, खाणे आणि चघळणे या क्रिया करू नका.
६. मिसळताना आणि फवारताना संपूर्ण संरक्षक कपडे वापरा.

विषबाधेची लक्षणे :

उपशमन, श्वास घेण्यास त्रास होणे, असाधारण ढब होऊ शकते.

प्रथमोपचार :

१. गिळले गेल्यास घशात बोट घालून उलटी काढा, उलटी स्वच्छ येईपर्यंत हे चालू ठेवा. ज्ञ्ण येशुद्ध असल्यास उलटी काढू नका.
२. कपडे आणि त्वचा खराब झाल्यास कपडे काढा आणि भरपूर साबण आणि पाणी वापरून त्वचा धुवा.
३. डोळ्यात गेल्यास सुमारे १० ते १५ मिनिटे चिठाव्या/स्वच्छ भरपूर पाण्याने धुवा.
४. श्वासावाटे आत गेल्यास रूग्णाला मोकळ्या हवेत न्या.

उतारा :

कोणताही खास उतारा नाही. लक्षणानुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनर्सची विल्हेवाट :

वापारलेली पॅकेजेस, उरलेले साहित्य, किटकनाशकाचे धुतलेले पाणी, ह्यांची विल्हेवाट.

१. पर्यावरणाला आणि पाण्याचे प्रदुषण होऊ नये ह्यासाठी पॅकेजेस, उरलेले साहित्य, किटकनाशकाचे धुतलेले पाणी, ह्यांची विल्हेवाट लावणे ही उत्पादक, किटकनाशकाचे मिश्रण करणारी व्यक्ती आणि ऑपरेटरची जबाबदारी असेल.
२. उरलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा उपयोग होऊ नये ह्यासाठी ती बाहेर फेकून देऊ नयेत.
३. पॅकेजेस तोडून बरस्तीपासून दूर पुरून टाकावीत.

साठवणीची स्थिती :

किटकनासकांच्या साठवणीच्या अटी नमूद कराव्यात.

१. किटकनाशक असलेले पॅकेज वरतूपासून दूर किंवा स्वतंत्र कपाटात किटकनाशकाचे प्रमाण आणि त्याच्या स्वरूपानुसार कुलुपबंद स्थितीत ठेवावे.
२. किटकनाशक साठवून ठेवण्याच्या खोल्या किंवा वास्तू चांगली बांधलेली, भरपूर उजेड असलेली आणि पुरेशा आकारानाची असावी.

रासायनिक मिश्रण :

प्रॉपिकोनाझोल ए.आय.	२५.००%एम/एम
इमल्सिफाईग एजन्ट: (इथोक्सिलेटेड व्हेजिटेबल ऑइल किंवा तत्सम)	१०.००%एम/एम
सर्फक्टन्ट/वेटिंग एजन्ट : (अल्काईल एरिल सल्फानेट चे कॅल्शियम/सोडियम/ मॅग्नीशियम साल्ट)	३.००%एम/एम
सायकलोहेक्सानोन	२५.००%एम/एम
ऑरगॅनिक सॉल्वन्ट (सी-९)	क्यू.एस.१००% क्वॅल्यूमाझी

ಆಲ್‌ಜೋಲ್

ಪ್ರೊಪಿಕೊನಝೊಲ್ 25% ಇ.ಸಿ. (ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಲೇಬಲ್/ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರೊಪಿಕೊನಝೊಲ್ ಗೋಧಿಯ ಕರ್ನಲ್ ಬಂಟ್, ತುಕ್ಕು ರೋಗ, ಸೆಲಗಡಲೆಯ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗ, ಭತ್ತದ ಗರಿಮುರುಟು ರೋಗ ಮತ್ತು ಚಹಾದ ಬ್ಲೈಟ್ ರೋಗ, ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್‌ನ ತುಕ್ಕು ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲ ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ ಇಮಲ್ಸಿಫೈಯೆಬಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ (ಇ.ಸಿ) ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಪಿಕಾನಜೋಲ್. 1-2(- (2,4-ಡೈಕ್ಲೋರೋಫೆನೈಲ್) -4-ಪ್ರೊಪೈಲ್-1,3, ಡಿಕ್ಸೋಲಾನ್- 2-ವೈಲ್- ಮಿಥೈಲ್)- 1 ಎಚ್- 1,2,4-ಟ್ರಯಾಜೋಲ್) ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಳೆ	ರೋಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣಗಳು/ಹೆ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀ.)	ಕೊಸೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲುವರೆಗಿನ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ
ಗೋಧಿ	ಕರ್ನಲ್ ಬಂಟ್ (ನಿಯೋವೊಸಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ)	125	500	750	30
	ಎಲೆತುಕ್ಕು/ಕಂದುತುಕ್ಕು (ಪುಸ್ಸಿನಿಯಾ ರಿಕಾಂಡಿಟಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ. ಟ್ರಿಟಿಸಿ)	125	500	750	30
	ಕಾಂಡತುಕ್ಕು/ಕಪ್ಪುತುಕ್ಕು (ಪಿ.ಗ್ರಾಮಿನಿಸ್ ಎಫ್.ಎಸ್.ಪಿ.ಟ್ರಿಟಿಸಿ)	125	500	750	30
	ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ತುಕ್ಕು/ಹಳದಿತುಕ್ಕು (ಪಿ.ಸ್ಟ್ರಿಫಾರ್ಮಿಸ್)	125	500	750	30
ಭತ್ತ	ಗರಿಮುರುಟು ರೋಗ (ರಿಜೋಕ್ಟೋನಿಯಾಸೋಲನಿ) ಎಫ್.ಸೆಸಕಿ)	125	500	500	15
ಸೆಲಗಡಲೆಅರಂಭದ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ	(ಸೆರ್‌ಕೊಸ್ಪೊರಾ ಅರಾಚಿಡಿಕೊಲಾ)	125	500	500	15
	ಅಂತ್ಯದ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ (ಸಿವರ್‌ಸೊನಟ)	125	500	500	15
	ತುಕ್ಕುರೋಗ (ಪುಸ್ಸಿನಿಯಾ ಅರಾಚಿಡಿಸ್)	125	500	500	15
ಬೀನ್ಸ್	(ಫಕೊಲಥ್ರೋರಾ ಪಚಿರಿಜಿ)				

ಉಪಯೋಗದ ನಲುವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ : ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿರಿ. ನ್ಯೂಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಯರ್ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳಿಂದ ಬಳಸಲು ಉಚ್ಚ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾದ ಊರೆದ ನೀರಿನ್ನನರಿಸಿರಿ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು:

1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ.
2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ.
3. ಸಿಂಪರಣಾ ಮಂತ್ರುರು ಶ್ವಾಸನೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ.
4. ಸಿಂಪರಣೆಯ ನಂತರ ಕಲ್ಕುಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುಬೇಡಿ. ಏನನ್ನೂತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬೇಡಿ.
6. ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಪುಧರಿಸಿರಿ.

ವಿಷಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ನೆಡೇಶನ್, ಡ್ಯೆಸ್‌ಪ್‌ನಿಯಾ, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೇಹಭಂಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

1. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಪಿಸಿರಿ. ವಾಂತಿಯು ತಿಳಿಯಾಗುವ ತನಕ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ರೋಗಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಬೇಡಿ.
2. ಬಟ್ಟೆ ಬರಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ಕಲ್ಕಶಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಶಗೊಂಡಿ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಧಾಕಳ ನಾಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲ್ಕಶಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ನಲ್ಲಿನ/ಶುದ್ಧ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಮಾಡಿರಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಸರ್ಜನೆ : ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೆಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ.

1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲಮಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಕೀಟನಾಶಕದ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟರರು ಮತ್ತು ಬಳಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೂಗಿಯಬೇಕು.

ಶೇಖರಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು : ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುವ ವಿಧಾನಗಳು :

1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿರುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿರಬೇಕು.
2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿರುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಾಳಿಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟುಬೆಳಕುವಾಗಿಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಪ್ರೊಪಿಕೊನಝೊಲ್ ಸಂ.	:25.00% ಎಮ್/ಎಮ್
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯಲ್ ಅಥವ ಸಮನಾದುದು)	:10.00% ಎಮ್/ಎಮ್
ಸರ್ಫಕ್ಟಂಟ್/ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ : ಆಲ್ಕೈಲ್ ಲರಿಲ್ ಸಲೋನೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿ/ಎನ್‌ಎ/ಎಮ್‌ಜಿ.ಸಾಲ್ಟ್	:3.00% ಎಮ್/ಎಮ್
ಸೈಕ್ಲೊಹೆಕ್ಸಾನೋನ್	:25.00% ಎಮ್/ಎಮ್
ಆರ್ಗನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್-ಸಿ(9)	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್. ಟುಮೇಕ್ 100%

આલ્ઝોલ

પ્રોપિકોનાઝોલ ૨૫% ઈ.સી. (સિસ્ટમિક ફંગિસાઈડ)

ચેતવણી : લેબલ/પુસ્તિકામાં દર્શાવેલ પાકો સિવાય અન્ય પાકોમાં ઉપયોગ કરવો નહીં.

પ્રોપિકોનાઝોલ ૨૫% ઈ.સી. ઘઉંનાં કર્નલ બંટ અને ગેરૂ, પાંદડાંનાં ડાઘ, શીંગના ગેરૂ, ચોખામાં અચ્છદ અંગમારી, ચામાં કોડકિયો અંગમારી, સોયાબીનમાં ગેરૂ, જેવા રોગ સામે ઉત્તમ કાર્ય કરે છે. આ 250 ગ્રામ પ્રોપિકોનાઝોલ 1-2 (2,4 - ડાયક્લોરોફેનિલ) - 4- પ્રોપિલ -1, 3 ડાયઝોલાન -2-ઇલ-મીથાઇલ) - 1એચ-1,2,4-ટ્રાયઝોલ) પ્રતિ લીટર ઇમલ્સિફ યેબલ કન્સનટ્રેટ (ઇસી) સંયોજનમાં ધરાવે છે.

ભલામણ :

પાક (પાકો)	રોગનાં નામ	સામાન્ય માત્રા/હેક્ટર સ.ઘ. (ગ્રા.)	પાણીમાં ઉમેરણ સંયોજન (મિ.લિ)	પાણીમાં ઉમેરણ (લિ.)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધી યોગ્યવાળો સમયગાળો (દિવસો)
ઘઉં	કર્નલ બંટ (નિયોવોશિયા ઇન્ડિકા)	125	500	750	30
	પાંદડું ગેરૂ/ભૂરૂ ગેરૂ (પુસિનિયા રિકોન્ડિટા એક. એસપી. ટ્રિટિસી)	125	500	750	30
	ડાળ ગેરૂ/કાળું ગેરૂ (બી. ગ્રીમિનિસ એક. એસપી. ટ્રિટિસી)	125	500	750	30
	પટારા ગેરૂ/પીળું ગેરૂ (પી. સ્ટ્રઇફોર્મિસ)	125	500	750	30
ચોખા	આચ્છદ અંગમારી (રિઝોક્ટોનિયા સોલાની એક. સેસાકાઇ)	125	500	500	30
શીંગ	વહેલું પાંદડું ડાઘ (સર્કોસ્પોરા અરાચિડિકોલ)	125	500	500	15
	પાંદડું ડાંઘ (સી. પાસોનેટા)	125	500	500	15
બિલંબ	પાંદડું ડાંઘ (સી. પાસોનેટા)	125	500	500	15
	ગેરૂ(પુસિનિયા અરાચિડિસ)	125	500	500	15

કઇરીતે ઉપયોગ કરવો : ઉત્પાદની જરૂરી માત્રા માપસર કાઢી લો અને સહેજ પાણી નાખીને સારી રીતે હલાવો. આ પછી નિર્ધારિત પ્રમાણે મોપસેર સ્પ્રેયરો અથવા ઉચ્ચ વોલ્યુમનાં સ્પ્રેયરો થકી છાંટવાના ઉચ્ચ વોલ્યુમ માટે પૂરતું હલાવ્યા સાથે બાકીનું પાણી ઉમેરી દો.

તકેદારીઓ :

1. ખાદ્યપદાર્થો, ખાદ્યપદાર્થોના ખાલી ડબ્બાઓ અને પશુઓના આહારથી દૂર રાખો.
2. મોઢું, આંખ અને ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો.
3. છાંટકાવથી ઊડતાં ઝાકળ ધ્યાનમાં લેવાનું ટાળો, પવનની દિશામાં છંટકાવ કરોએ.
4. છંડકાય પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરનો ભાગ સાફ ધોઇ નાખો.
5. છંટકાવ કરતી વેળા ધૂમ્રપાન, કશું પણ ચાવવુંકે ખાવા પીવાનું ટાળો.
6. મિશ્રણ કરતી વેળાએ અને છંટકાવ કરતી વેળાએ સંપૂર્ણ સંરક્ષણાત્મક કપડાં કહેરો.

ઝેરનાં લક્ષણ :

બેચેની, શ્વાસમાં તકલીફ, અસામાન્ય શારીરિક સ્થિતિ ઉદભવી શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર :

1. જો ગળી જવાય તો ગળતી પાછળ ક્રાવી દ્વારા મારીને ઉલટી કરાવો. ઉલટી સાફ નહીં થાય ત્યાં સુધી તેનું પુનરાવર્તન કરો. જો દર્દી બેભાન હોય તો તે ઉલટી કરવા પ્રયત્નકરતી નહીં કરાય.
2. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થયાં હોય તો તે કાઢીને ભરપૂર પ્રમાણમાં પાણી અને સાબુ વડે સાફ ધોઇ નાખો.
3. જો આંખ દૂષિત થઇ હોય તો 10 થી 15 મિનિટ સુધી સાફ પાણીની ધારથી આંખ પર મારીને ધુઓ.
4. જો શ્વાસમાં ગયું હોય તો દર્દીને તાજી હવામાં લઇ જાવો.

પ્રતિકારક : કોઇ ચોક્કસ પ્રતિકારક જ્ઞાત નથી. લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

વપરાયેલા ડબ્બાનો નિકાલ :

વપરાયેલાં પેકેજો, વધારાની સામગ્રીઓ અને જંતુનાશકોના ધોવાણના કચરાનો નિકાલ :

1. પેકેજ અથવા વધારાની સામગ્રીઓ અને ધોવાણનાથી નીકળેલ કચરાનો નિકાલ સુરક્ષિત રીતે થાય તે જોવાની જંતુનાશકોના ઉત્પાદકો, સૂત્રીકરણકરતાં અને એ પોટરોની જવાબદારી છે, જેથી પર્યાવરણ કે જળ પ્રદૂષણ નહીં થાય.
2. વપરાયેલાં પેકેજોનો પુનઃ ઉપયોગ કરવા માટે તેને બહાર ધુડરામાં નહીં રાખવાં.
3. પેકેજો તોડી નાખવાં અને માનવી વસ્તીથી દૂર દાટી દેવાં.

સંગ્રહની સ્થિતિઓ :

જંતુનાશકોના સંગ્રહ માટે નિર્ધારિત કરેલી સ્થિતિઓ :

1. જંતુનાશકો ધરાવતા પેકેજોને જંતુનાશકની માત્રા અને પ્રકારને આધારે અલગ તાળું-ચાવી ધરાવતી અલમારીમાં સંગ્રહ કરવો.
2. જંતુનાશકોના સંગ્રહ કરવા માટેનો રૂમ કે સંકુલ સારી રીતે બંધાયેલો હોવો જોઇએ, જંગ્યા પૂરી હોવી જોઇએ, હવાઉજાશ સારા હોવા જોઇએ અને જગ્યા પૂરતી હોવી જોઇએ.

રાસાયણિક સંમિશ્રણ :

પ્રોપિકોનાઝોલ એ.આઈ.	: 25.00% એમ/એમ
ઇમલ્સિફાઇંગ એજન્ટ (ઇથોક્સીલેટેડ વેજિટેબલ ઓઇલ અથવા સમક્ષ)	: 10.00% એમ/એમ
સરફેક્ટન્ટ/વેટિંગ એજન્ટ : આલ્કઇલ એરિલ સલ્ફોનેટ સીએ / એન્એ / મિગ્ર મિમક અથવા સમક્ષનું	: 3.00% એમ/એમ
સઇક્લોહેક્સાનોન	: 25.00% એમ/એમ
ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ - (સી-9)	:100% બનાવવા ક્યુએસ

ಆಲ್‌ಸೋಲ್

ಪ್ರಾಪಿಕಾನಾಸೋಲ್ 25% ಇ.ಸಿ. (ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್)

ಎಚ್ಚರಿಕೆಕೆ : ಇಪ್ತ ಲೆಬಿಲ್ / ಕುಣ್ಡುಪಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ ಕುರಿಪಿಟಿಪ್ಪಟ್ಟವರ್ಗಳ ವಿಡುತ್ತು, ವೆರು ಪಬಿರ್‌ಕಳ ಮೆಲ್ ಉಪಯೋಗಿಕಕ್ ಕೂಡಾತ್ತು.

ಪ್ರಾಪಿಕಾನಾಸೋಲ್ 25% ಇ.ಸಿ. ಒರು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಇದು ಕರ್ನಲ್ ಬಂಟ್. ಮರ್ರುಮ್ ಕೊಯ್ಯುಮಯಿಲ್ ತುರು, ಇಲೈಪ್ಪುಳ್ಳಿಗಳಿಲ್, ನಿಲಕ್ಕಡಲೆಯಿಲ್ ತುರು, ನೆಲ್ಲಿಲಿ ಕುರುಕಲ್, ತೆಯಿಲೆಯಿಲ್ ವೆಡಿಪ್ಪು ಕುರುಕಲ್ ಮರ್ರುಮ್ ಸೋಯಾ ಬೀನಿಲ್ ತುರು ಪೋಂಱ ರೋಗಂಕಳುಕ್ಕು ಎತಿರಾಕ ಶಕ್ತಿಯಾಯುಂತ್ತ ಸೆಯಲ್ತಿರಿಣ ಕೊಂಡುಂತ್ತು. ಇತಿಲ್ ಎಮಲಸಿಃಬಾಯಬಿಲ್ ಕಾನ್‌ಸೆಂಟ್ರೇಟ್ (ಇಸಿ) ಕಲವಾಯ ಒರು ಲೀಟ್ರಿಲ್ ಲೀಟ್ರಿಲ್ 250 ಕಿರಾಂ ಪ್ರೊಪಾಪಿಕೊನಾಸೋಲ್ 1-2 (-(2,4-ಟೈಕ್ಲೊರೊಫೆನೈಲ್)-4-ಪ್ರೊಪೈಲ್-1,3 ಡೈಆಕ್ಸೊಲಾನ್-2-ಮೆಥೈಲ್)-1ಹ-1,2,4-ಟ್ರಿಯಾಸೋಲ್) ಅಡಂಕಿಯುಳ್ಳದು.

ಪಿರಿತ್ತುವರ :

ಪಯಿರಿ (ಕಳ್)	ನೊಯಿಕಳಿನ್ ಪೊದುಪೆಯರ್	ಡೋಸೇಜ್/ಏಕ್ ಹೆಕ್ಟರ್ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)	ಕರಾಂಪದು ನೀರು (ಲೀಟರ್)	ಕಡೆಸಿತೆಳಿರಿಪ್ಪು ಮರ್ರುಮ್ ಕಡೆಸಿ ಮರ್ರುಮ್ ಕಡೆಸಿ ಅಲುವಡೆಕ್ಕು ಇಡೆಯೆ ಸಾತ್ತಿರುಕ್ಕುಂ ಕಾಲಂ (ನಾಟ್‌ಕಳಿಲ್)
ಕೊತುಮೆ	ಕಾನಲ ಬಂಟ್ (ನಿಯೋವೊಸಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ)	125	500	750	30
	ಇಲೈತತ್ತು ತುರು/ ಪಚುಪ್ಪುರು (ಪಸಿನಿಯಾ ರಿಕಾಂಡಿಟಾ) ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ.ಟ್ರಿಟಿಸಿ	125	500	750	30
	ಮೂಂಡುತುರು/ಕಪ್ಪುತುರು (ಪಿ/ಗ್ರಿಮೆಸ್‌ನಿಲಿಲ್ ಎಸ್ಪಿ. ಎಸ್ಪಿ.ಟ್ರಿಟಿಸಿ)	125	500	750	30
	ಮುಟ್ಟಿತುರು/ಮಞ್ಞತುರು (ಪಿ.ಸ್ಟ್ರಿಫಾರ್ಮಿಸ್)	125	500	750	30
ತೆಲ	ಕಳಿಂಜ ಕುರುಕಲ್ (ರಿಜೋಕ್ಟೊನಿಯಾಸೊಲನಿ)	125	500	500	30
ನಿಲಕ್ಕಡಲೆ	ಮುಂಬಿಲೈಪ್ ಪುಳ್ಳನ (ಸೆರ್‌ಕೊಸ್‌ಪೊರಾ ಅರಾಚಿಡಿಕೊಲಾ)	125	500	500	15
	ಪಿನ್‌ಬಿಲೈಪ ಪುಳ್ಳಿ (ಸಿ.ಪೆರಸೊನಟ)	125	500	500	15
	ತುರು (ಪಸಿನಿಯಾ ಅರಾಚಿಡಿಸ್)	125	500	500	15

ಪಯನ್‌ಪಡುತ್ತುಂ ಮುಱಕಳ :

ತೇವವಾಯಾನ ಅಳವು ತಯಾರಿಪ್ಪಯ ಎಡುತ್ತು ಸಿಱಿತಳವು ತಣ್ಣಣಿ ಊಱ್ಱಿ ನಲ್ಲರಾಕ ಕಲಕ್ಕಪುಂ. ನಾಪ್‌ಸಾಕ್ ತೆಳಿಪ್ಪಾನಿಲ್ ಅಲ್ಲತ್ತ ಅಧಿಕ ತುಣವುಳ್ಳ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್‌ಕಳಾಯ ಪಯನ್‌ಪಡುತ್ತುಂಬೊತ್ತು ಮಿಶಿಯುಳ್ಳ ತಣ್ಣಣ್ಣಿಯ ಕುರಿಪಿಪಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಪಱ ಕಿಣ್ಣಿಡಿಕ್ ಕೊಣ್ಡಿಟಲಕ್ಕಕವೇಣ್ಡುಂ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು :

1. ಉಣವುಪ್ಪೊರುಕ್ಕಳ್, ಕಾಲಿ ಉಣವು ಪಾತ್ರಿಗಳುಕ್ಕು ಮರ್ರುಂ ವಿಲಂಗುಕಳಿನ್ ಉಣವಲಿರುನ್ನತು ದೂರಾಮಾಕ ವೈಕ್ಕಪುಂ.
2. ವಾಯ್, ಕಣ್ಣುಕಳುಮರ್ರುಂ ಚರ್ಮುಮತ್ತಿಲ್ ಪಡುವತ್ತು ತವಿರಿಕ್ಕಪುಂ.
3. ತೆಳಿಕ್ಕುಂ. ನೀರ್ತ್ತಿಯಲ್ಲಾಕಲೈ ಕ್ಕಾಳಿಕ್ಕಕ್ಕ ಕೂಡಾತ್ತು. ಕಾಱ್ಱಡಿಕ್ಕುಂ ದಿಶೆಯಿಲ್ ತೆಳಿಕ್ಕಪುಂ.
4. ತೆಳಿತ್ತ ಪಿನ್ ಪುಳ್ಳುಕಳ್‌ಕೊಲ್ಲಿ