रिफोन

इथेफोन ३९% एस.एल.

खबरदारी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्यां पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

इथेफोन ३९% एस.एल. झाडे आणि रोपें यासाठी अनेक प्रकारे उपयोग आहे. १. जसे फूलें येण्यास उपयोक्त. २. फळ पिकण्यासाठी उपयुक्त. ३. आकार वाढवण्यासाठी. ४. उत्पादन वाढवण्यासाठी ५. वड स्प्राउटिंग इत्यादि. फवारण्यासाठी मिश्रण बनवण्याची पद्धत.

१ मि.ली. इथेफोन ३९% एस.एल. १ लिटर पाण्यामधे ४८० पी.पी.एम. द्रुसते. फवार/बनवण्यासाठी जें पाणी घेल्यान येते ते खराब असू नये.

शिफारीसी :

उपज	उपयोग	निर्देश
द्राक्षे	पिकवण्यासाठी आणि आकार वाढवण्यासाठी	काढण्या पूर्वी २-३ आठवडे, २०० पी.पी.एम. दिल्याने मोठे आणि आकर्षक फळ मिळते.
सफरचंद	फुलें येण्यासाठी पिकण्यासाठी आणि	फूळ येण्यापूर्वी २०० पी.पी.एम. फळ येण्यापूर्वी २ अठवाडे
आंबा	दोष दूर करण्यासाठी	२०० पी.पी.एम. आक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमधे, दोन आठवडयांत एकदा फुलें येईपर्यंत
अननस	फूलें येण्यासाठी आकार वाढवण्यासाठी	१०० पी.पी.एम. लावल्यानंतर १०-१२ माहिन्यानी
	पिकण्यासाठी	१०० पी.पी.एम. दोन हफ्ते अगोदर फवारणी होऊ शकते.
कॉफी अरबिका	पिकण्यासाठी	२०० पी.पी.एम. पूर्ण विकास झालेल्या फलावर दोन आठवडे अगोदर.
कॉफी रोबस्टा	पिकण्यासाठी	१०० पी.पी.एम.
सन्तरा	पिकण्यासाठी	२०० पी.पी.एम. पूर्णपणे वाढले फलावर
ऊस	पिकण्यासाठी	१००० पी.पी.एम. ५-६ आठवडे अगोदर

अनुकूलशिलता : इतर कोणताही रसायण मेळवुं नहि.

झेरीपण : सिफारशी प्रमाण मधे वापरा कोणताही हानि नाहे.

डोवेसिक नका. एल.डी. इंदुर माटे ४२२९ मि.ग्रा. किलो भार आहे.

विषबाधेची लक्षणे :

गिळले गेल्यास खतरापण होउ शकतात. त्वक आणि डोके संपर्क होणार अलर्जी होऊ शकतात.

सावधगिरी :

मुलापासून, बेजवाबदर व्यक्ती आणि पशुपासून दूर ठेवावे. खाद्य पदार्थ, पशु, पक्षीच्या खाद्य पदार्थापासून दूर ठेवावे.

विषप्रतिकारक :

कोणताही निश्चित निवारक उपाय नाहीं. लक्षणानुसार आणि मदत होईल असा उपचार करा.

प्रथमोपचारचे उपाच :

दूषइत त्वचा धुवून काढावी व डोळ्यांना मिठाच्यां पाण्याने धुवा.

जर गिळले गेले असेल तर शत सोडियम बाय कार्बोनेटने पोटाची सफाई करावी. जर शरीरावर सोडल्यस खूप पाण्याने धुवावे.

विनियोग :

रिकाम्या डब्यांना जन्नसंपर्का पासून दूर नेऊन जमीनीत पुरावे. म्हणजे त्याचा पुन्हा दुपऱ्यांदा वापर होणार नाहीं राहिलेले सामान आणि डबे व मशीन धूतलेले पाणी ह्यांना अशा तऱ्हेने फेका की त्यामुळे वातावरण व जलप्रदूषण होणार नाही.

रसायनिक संरचना : इथिफान टेक्निकल (न्यूनतम शुद्धता ७५% स.त)...५२.०००% भार /भार प्रोपीलीन ग्लेकोल ....२६.०००% भार/ भार आसुत

ریفون

ایتھیفون ۳۹% ایس.ایل.

پیٹھیکے : ایک کیلوں میں تیلیسیڈ چیزیارگیوں کو سادھیلو پربھاوونتوالا ہارمونس سنیتھیٹک سنگھیا کی وِرِدھی نیئنترِنی۔ نیروپیتھ گوئیڈیڈ۔ ہوتھ بیڈوونتے ماڈوونوڈو-پکوتے بڑوونتے ماڈوونوڈو۔ کایوئے پریمانوں کو دوگنا ماڈوونوڈو-ایلوونوریوں کو چھوٹا کرنوونوڈو-پھوگی بیڈوونوڈو پھولنا۔

سنیتھیٹک تیاری : ایتھیفون ایک لیٹر نیریوں میں ایک سو اسی پی پی ایم کو نیڈوتے ہیں۔ الکوہل نیریوں کو اوپیوگ کرنا چاہیے۔

سفارشیں :

دراکھ	ہنگامے ماڈوونتے ماڈوونوڈو کایوئے پریمانوں کو	بیلے کو ایک سے تین ہفتے
سیب	ہوبیڈوونتے ماڈوونوڈو ہنگامے ماڈوونوڈو	ہوبیڈوونتے کالے میں ایک سو اسی پی پی ایم بیلے کو ایک سے دو ہفتے
آم	کایوئے پریمانوں کو	ایک سو پچاس سے ایک سو پی پی ایم
کایو	ہیڈیوونوڈو ایک سال کایو بیڈوونوڈو	اکتوبر نومبر میں
	ایک سال بیڈوونوڈو	مارچ میں
	کایو بیڈوونوڈو رودھیوں کو	پھول کے بعد
	بیڈوونوڈو ہر سال	پندرہ دن
	بیڈوونوڈو	اوپر چار سے پانچ
		سپریمیں ماڈوونوڈو
انناس	ہوبیڈوونتے ماڈوونوڈو	سیسا نو سے دس
	پریپکوتے تیاری	تین ماہ
	کایوئے پریمانوں کو	ایک سو پی پی ایم
	ہیڈیوونوڈو	بیلے کو ایک سے دو ہفتے
		پھول کے بعد ایک سو سے ایک سو دس پی پی ایم
		سپریمیں ماڈوونوڈو
		ریوں میں ہنگامے میں پریپکوتے بڑوونتے ہیں۔
کافی اراکا	پریپکوتے تیاری	دو سو پی پی ایم سپریمیں
کافی روبسٹا	پریپکوتے تیاری	ایک سو پی پی ایم
سنترا	پریپکوتے تیاری	دو سو پی پی ایم
گنا	پریپکوتے تیاری	ایک ہزار پی پی ایم پانچ-چھ ہفتے پہلے

سازگاری : ایتھیفون کے ساتھ کوئی بھی کیمیائی دوا استعمال نہیں کی جا سکتی۔

زہریلا پن : سفارشی مقدار میں استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

ڈی ایل ڈی : ایک سو بیس پی پی ایم ۔ ایک کلو وزن کے لیے ۴۲۲۹ ملی گرام۔

زہریلا پن : زہریلا پن نہیں ہوتا۔

زہر کا علاج : زہر کا علاج نہیں ہوتا۔

احتیاطیں : بچوں اور جانوروں سے دور رکھیں۔

زہر کا علاج : زہر کا علاج نہیں ہوتا۔

ہدایات : خالی ڈبے کو زمین میں دفن کر دیں۔

ہدایات : خالی ڈبے کو زمین میں دفن کر دیں۔

ரிபோன்

இதிபான் 39% எஸ்.எல்.

எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும்.

முன்னுரை : இது பயிர் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க கூடிய ஹார்மோன். இதனை தெளிப்பதன் மூலம் கீழ் குறிப்பிட்ட பயன்களை பெற முடியும்.

1. பூக்களின் வறர்ச்சி ஊக்குவிப்பு 2) பழம் பழுக்க ஊக்கம் அளிக்கிறது 3. அதிக பழ அளவு 4. அதிக விளைச்சல் 5. மெட்டு மலர்தலை அதிகப்படுத்துகிறது.

தெளிக்கும் கலவை தயாரிக்கும் முறை :

ஒரு மி.லி. மருந்தினை ஒரு லிட்டர் நீரில் கலக்கவும், இது 480 பி.பி.எம் அளிக்குறது. உப்பு அமில நிரினை பயன்படுத்தக் கூடாது.

பரிந்துரை :

பயிர்கள்	பயன்	வழிமுறை/தெளிப்பு
திராட்சை	பழம் பழுக்க ஊக்கம் அதிக பழ அளவு	2-3 வார அறுவடைக்குமுன் 200 பி.பி.எம்
ஆப்பிள்	பூ வளர்ச்சி துண்டுதல் பழம் பழுக்க மற்றும் அவை அதிகரிப்பு	200 பி.பி.எம் பூமுன் தெளிப்பு 50-100 பி.பி.எம் 2 வரை அறுவடைக்கு முன்
மாங்காய்	அதிக காய் பிடிப்பு	200 பி.பி.எம் தெளிசபு முன் இரவு, அக்டோபர் (அ) முதல் நவம்பர் மாதத்தில் 4-5 தெளிப்பு தெளிக்க வேண்டும்.
அன்னாச்சி	பூ வளர்ச்சி ஊக்கம்	100 பி.பி.எம் செடிநட்ட
பழம்	பழம் பழுத்தல்,	10-12 மாதம் பின் 100 பி.பி.எம் தெளிப்பு 2 வரம் பாதுகாப்பு
காமி அரபிக்கா	படிம் பழக்க ஊக்கம்	பழம் பழுக்க 200 பி.பி.எம் தெளிப்பு
காபி ரழஸ்டா	படிம் பழக்க ஊக்கம்	100 பி.பி.எம் தெளிப்பு
ஆரஞ்சு	படிம் பழக்க ஊக்கம்	200 பி.பி.எம் தெளிப்பு முதிர்ந்த பழங்கள் மீது
கரும்பு	படிம் பழக்க ஊக்கம்	1000 பி.பி.எம் 4-6 வார அறுவடைக்கு முண்

ஒத்தியல்பு : எந்த ஒரு வேதியியல் கலவையுடன் ஒத்தியல்பு கிடையாது.

பைட்டோ டாக்ஸிட்டி : பரிந்துரை செய்யப்பட்ட மருந்து எழ்த ஒரு பைட்டோ டாக்ஸிட்டினை ஏற்படுத்தாது.

விஷத்தன்மை : விழத்தன்மையற்றது. விவுத்தனஅமை எலிகலில் குறைந்த வித்தல் அளவு 42 விமிகி/கிலோ உடல் எடை.

அறிகுறிகள் : விழுங்கப்பட்டால் விவுத்தன்மையுயைது. தோல், கண், மியுக்கஸ் மெம்பிரோன் மீது எரிச்சலை ஏற்படுத்தக் கூடியது. தோல், கண் மற்றும் துணிகளில் படுதலை தவிர்க்கவும்.

முதலுதவி : தோல் மற்றும் கண்களில் பட்டால் அதிமான நீரினால் நன்றாக் கழுவ வேண்டும். விங்கப் பட்டியிருந்தால் வாந்தி ஏற்படுதலை துண்ட வேண்டும். மருத்துவரை அழைக்கவும்.

விவுமுறிவு :

குறிப்பிட்ட விவுமுறிவு எதுவுமில்லை, அறிகுறி வைத்து மருத்துவுவம் அளிக்கவும்.

எச்சரிக்கை : குழந்தைகள், உணவுப் பொருட் களுக்கு அப்பால் வைக்க வேண்டும்.

பாதுகாப்பு : மருந்துள்ள பெட்டியை குளிர்ந்த, காய்ந்த, காற்றோட்டமுள்ள அறையில் வேறு பொருட்களுக்கு அப்பால் வைக்கவும். மருந்தின் அளவை பொருத்து இதற்கான தனி அறை நன்கு கட்டப்பட்ட, கிரய்ந்த, காற்றோட்டம் உள்ள அறையில் பூட்டி வைக்கவும்.

டிரான்ஸ்போர்ட் :

வேறு வகை உணவு பொருட்கள் மற்றும் கால்நடை உணவுப் பொருட்களுக்கு அப்பால் வைத்து டிரான்ஸ்போர்ட் செய்யவும்.

காலி டப்பா அழிக்கும் முறை :

காலி டப்பாவை அழித்து மற்றும் புதைக்க வேண்டும். காலி மருந்து டப்பா மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியே போடக் கூடாது. காலி டப்பா, பாத்திரங்கள் கழுவிய நீரினை பாதுகாப்பான முறையில் வெறியேற்ற வேண்டும் அது சுற்றுபுறச் சுழல், நீர்நிலை பாதிக்காத வகையில்.

உத்திரவாதம் :

உயர்ந்த வகை பிரடெட். மருந்தின் செயல் தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனை அதிகாரியை சார்ந்தது அல்ல, மருந்தின் தூய்மை மற்றும் மரசுரதல் குறிபிட பட்டுள்ள மருந்தின் அளவு உத்திரவாதம் உடையது.

பாடல்கள்

எத்தே.போன் தொழில்நுட்பம் (குறைந்தபட்ச தூய்மை 75% w / w a.i.) .... 52.00% w / w

புரோப்பிலீன் கிளைகோல் ..... 26.00% w / w

காய்ச்சி வடிகட்டிய நீர் .... 22.00% w / w

AGASTYA RIPHON ETHEPHON 39% S.L.

रिफोन इथेफोन ३९% एस.एल.

ریفون ایتھیفون 39% ایس.ایل.

ரிபோன் இதிபான் 39% எஸ்.எல்.

ఆగస్త్య రిఫోన్ ఇథేఫాన్ 39% ఎస్.ఎల్.

ರಿಫೋನ್ ಇಥೆಫೋನ್ 39% ಎಸ್.ಎಲ್.

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
गर्मी और खुली लौ से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें।
ఎండ, వేడి, వెలుతురు తగలని చల్లని పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ఆపాయం ఖాతరా ఉపయోగించకండి
ఆపాయ
DANGER
Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।
ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಕರನೆ ಸೆ ಪಹಲೆ ಸಾರಿ ಪರ್ಚಿ ಪೂರಿ ತರಹ ಪಢಿಯೆ।

Manufactured by:
AGASTYA AGRO LIMITED
An ISO Certified Company
UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401
Medchal Mandal, Medchal - Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017
(Old Mfg. Lic. No.; 220/1997-98, Dt: 06-07-1997)

UNIT-II : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

Regd.No.:CIR-108122/2013-ETHEPHON(SL)(340)-1

RIPHON

ETHEPHON 39% S.L.

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

Introduction : A plant Growth regulator is proved to be an effective Hormone spray for achieving the following functions.

1) Inducing flowering, 2) Inducing ripening,3) Enlarging fruit size, 4) Increasing yield, 5) Inducing bud sprouting etc.

Preperation of spray solution :

One ml. of this in one litre of water gives 480 ppm; alkaline water should not be used.

Recommendations :

CROPS	USE	DIRECTIONS
Grape	Inducing ripening Enlarging size	200 ppm 2-3 weeks before harvest
Apple	Inducing flowering	200 ppm pre-bloom spray
	Inducing ripening and size	50-100 ppm 2 weeks before enlargementharvest
Mango	Breaking attemate bearing tendencies	200 ppm spray at fortningtly intervals by Oct. or early Nov. 4-5 sprays.
Pineapple	Inducing flowering	100 ppm 10-12 month after Planting 100 ppm spray
	Inducing ripening size enlargement	2 week store havest induce ripening
Coffee arabica	Inducing ripeing	200 ppm spray
Coffee robusta	Inducing ripeing	100 ppm spray
Orange	Inducing ripeing	200 ppm on well developed fruits
Sugarcane	Inducing ripeing	1000 ppm 4-6 weeks before harvest

Compatibility : Not compatible with other chemical

Phytotoxicity : It is safe on crops in recommended doses.

Toxicity : Relatively Non-toxic to man or mammal the acute oral LD to rats being 4229 mg. per kg of body weight.

Symptoms of poisoning :

Harmful if swallowed. irritates skin. eyes and mucuous membrane. Avoid contact with skin. eyes or clothing.

First Aid :

In case of skin contact wash immediately with soap and water. In case of flushing into the yes flood the eye with plenty of water. If swallowed induce vomiting by inserting fingers into the throat. call the physician.

Antidote :

There is no specific antidote. Symptomatic treatment may be given.

Caution :

Keep out of reach of children food stuff and animal feeds.

Storage : Packages containing the material shall be stored in cool, dry and well ventilated places away from other articles. Depending upon the quantities it can be stored in almirah under lock and key on in well built,dry and well ventilated rooms.

Transportation : Packages containing the material shall be transported in such a way as to avoid contamination of food-stuff and animal feeds.

Diposal of containers :

The Packages shall be broken and burried away from habitation. Packages should not be left outside to prevent their re-use. The empty containers, surplus material and washings should be disposed off in such a safe manner as to prevent environment and water pollution.

Warranty :

The product is of high grade, Since its use is not under the direct control, neither the manufacturer nor the distributor makes any warranty except the purity and the quantity of the active ingredient as shown on the label.

Chemical Composition

Ethephon tech (Minimum purity 75% w/w a.i)	52.000% w/w
Propylene glycol	26.000% w/w
Distilled water	22.000% w/w

రిఫాన్

ఇథేఫాన్ 39% ఎస్.ఎల్.

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ఉపోద్ఘాతం : ఈ దిగువ తెలిపిన చర్యలను సాధించటానికి ఒక ప్రభావవంతమైన హెూర్మోన్ పిచికారీగా మొక్కల వృద్ధి నియంత్రిణి నిరూపితమైనది.

పుష్పించేలా చేయడం : పక్వతను తీసుకురావటం-కాయ పరమాణాన్ని పెద్దది చేయటం-దిగుబడిని పెంచటం-మొగ్గలు విడువటం మొదలైనవి.

పిచికారీ తయారీ : దీనిని ఒక లీటరు నీటిలో ఒక మి.లీ. లీటరును 480 పిపిఎమ్‌ను ఇస్తుంది. అల్కలిన్ నీటిని ఉపయోగించరాదు.

సిఫారసు:

ద్రాక్ష	పండేలా చేస్తుంది కాయ పరిమాణాన్ని పెంచుతుంది	పంట కోయటానికి 2-3 వారాల ముందు 200 పి పి ఎమ్
యాపిల్	పుష్పించేలా చేస్తుంది పండేలా చేస్తుంది	పుష్పించే కాలానికి ముందు 200 పి పి ఎమ్ పంట కోయటానికి 2 వారాల
మామిడి	ఒక పరిమాణాన్ని పెంచుతుంది కాయలు కానే దోరడిని అంతం చేసి ప్రతి సంవత్సరం కాపు	ముందు 50-100 పి పి ఎమ్ అక్టోబరు లేదా నవంబరు నెల మొదటి వారంలోపు 15 రోజులు వ్యవధితో 4-5 సార్లు 200 పిపిఎమ్‌ను పిచికారీ చేయాలి.
అనాస	పుష్పించేలా చేస్తుంది పరిపక్వతకు తేస్తుంది కాయ పరిమాణాన్ని పెంచుతుంది	మొక్క నాటిన 10-12 నెలల తరువాత 100 పి పి ఎమ్‌ను పంట కోయటానికి 2 వారాల ముందు 100 పి పి ఎమ్‌ను పిచికారీ చేయటం వల్ల పండు పరికారీ చేయటం వల్ల పండు పరిపక్వతకు వస్తుంది.
కాఫీ అరబికా	పరిపక్వతకు తెస్తుంది	200 పి పి ఎమ్ పిచికారీ
కాఫీ రొబస్టా	పరిపక్వతకు తెస్తుంది	100 పి పి ఎమ్ పిచికారీ
నారింజ	పరిపక్వతకు తెస్తుంది	బాగా ఎదిగిన కాయలపై 200 పి పి ఎమ్
చెరకు	పరిపక్వతకు తెస్తుంది	పంట కోయటానికి 4-6 వారాల ముందు 1000 పి పి ఎమ్

అనుకూలత : ఇతర రసాయనాలతో ఉపయోగించటానికి ఇది అనుకూలమైనది కాదు.

ఫైటాటాక్సిసిటీ : పంటలపై సిఫారసు చేయబడిన మోతాదులలో ఇది సురక్షితం

విష ప్రభావం : సాపేక్షకంగా చూస్తే మనిషికి లేదా స్తన్యజాతి జంతువులకు దీనివల్ల ఎలాంటి విష ప్రభావంఉండదు. ప్రతి కిలో శారీరిక బరువుకు 4229 మి.గ్రా. చొప్పున ఎలుకలపై ప్రయోగించినపుడు విష ప్రభావం కనిపించింది.

విషప్రభావ లక్షణాలు : మ్రింగినట్లైతే ప్రమాదకరం. చర్మంపై మంట, పుట్టట, కళ్ళు మందుట, ముక్కు కొరుట లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. చర్మానికి, కండ్లకు, దుస్తులకు తగలకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.

ప్రథమ చికిత్స : చర్మం పై పడినట్లైతే, సరిపడినన్ని నీళ్ళతోను, సబ్బుతోను శుభ్రపరచుకోనువలెను. కళ్ళలో పడినట్లైతే నీటితో బాగుగా శుభ్రపరచుకోనవలెను. ఇదు మందు కడుపులోనికి వెళ్ళినట్లైతే గొంతు వెనుక భాగం మీద నొక్కి వాంతులు చేయించండి. విషపూరిత లక్షణాలు కనిపించినట్లైతే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

ఔషధ చికిత్స : ప్రమాద లక్షణాన్నిబట్టి ఔషధం ఇవ్వాలి.

జాగ్రత్తలు : పిల్లలకు, ఆహార పదార్థములు ఉండే చోటుకు మరియు పశుగ్రాసం ఉండే చోటుకు దూరంగా ఉంచండి.

నిల్వ చేయుట : వేరు గదులలో లేదా ఆహార పదార్థములు ఉండే చోటుకు మరియు పశుగ్రాసం ఉండేచోటకు దూరంగాను లేదా మరేదైన చోటునందు లేదా ఇదు పరిమాణం, తత్వాన్ని బట్టి వేరే అలమారలో కీటకనాశిని గల ప్యాకెట్‌లను ఉంచి నిల్వ చేయవచ్చు. నిల్వ చేయుటకు ఉద్దేశించిన గదులు, ప్రాంగణాలు అవసరమైనంత ఎత్తు, పొడవు, వెడల్పు కలిగి ఉండాలి. పోడిగా ఉండి కాలువ్యాన్ని (ఆవిరిని పేల్చుటను) నివారించేందుకు వీలుగా వెలుతురు, గాలివచ్చే విధంగా నిర్మించబడ వలెను.

ఖాళీ డబ్బాల నిర్మూలన : నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా ఖాళీ డబ్బాలను పగల గొట్టి పాతిపెట్టవలెను. ఉపయోగించబడిన ఖాళీడబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నివారించేందుకు వాటిని వెలుపల పెట్టరాదు. పర్యావరణ పరిక్షణకు లేదా జల కాలువ్యాన్ని నివారించేందుకు డబ్బాలను లేదా వ్యర్థ పదార్థాలను నిర్మూలించుటకు ఉపకరణములకు శుభ్రపరుచుటను సురక్షితమైన పద్ధతిలో నిర్మహించవలెను.

వారంటీ : ఉత్పత్తిని ఉపయోగించటం మా అదుపులో లెనందువల్ల, ఉత్పత్తి నాణ్యతకు మినహాయేమను దేనికి బాధ్యత స్వికరించలేము.

రసాయనిక మిశ్రమము:

ఎథిఫాన్ టెక్నికల్ (కనిష్ట నాణ్యత 75% బా/బా ఎ.ఐ)..... 52.000% బా/బా

ప్రాపిలిన్ గ్లైకాల్..... 26.000% బా/బా

డిస్టిల్ వాటర్..... 100.000 % బా/బా

रिफोन

इथेफोन ३९% एस.एल.

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

इथेफोन में पेड़ पौधों के लिये अनेक उपयोगी तत्व हैं, जो कि अनेकों प्रकार से लाभदायाक हैं जैसे १) फूलों की संख्या में वृद्धि । २) फल पकाने के लिये । ३) आकार बढ़ाने के लिये । ४) उत्पादन बढ़ाने के लिये एवं फुटाव के लिये ।

स्प्रे बनाने का तरीका : १ मि.ली. इथेफोन १ लिटर पानी में ४८० पी. पी.एम. देता है । स्प्रे बनाने के लिये जो पानी लेना है, वह खारा नहीं होना चाहिए ।

सिफारिशें :

उपज	उपयोग	निर्देश
अंगूर	पकाने के लिये और आकार बढ़ाने के लिये	लवन के दो हफ्ते पहले २०० पी.पी.एम. देने से बड़ा और आकर्षक फल मिलता है ।
सेब	फूल आने की प्रेरणा तथा पकाने के लिये और आकार बढ़ाने के लिये	फूल आने से पहले २०० पी.पी.एम. ५०-१०० पी.पी.एम. लवन के दो हफ्ते पहले
आम	विकलापता दूर करने के लिये	२०० पी.पी.एम. अकदूबर या नवम्बर से दो हफ्ते में एक बार फूल आने तक
अनानास	फूल आने के लिये एवं आकार बढ़ाने के लिये और पकाने के लिये	१०० पी.पी.एम. प्लान्टिंग करके १०-१२ महीने के बाद १०० पी.पी.एम. स्प्रे दो हफ्ते पहले।
कॉफी अरबिका	पकाने के लिये	२०० पी.पी.एम. पूर्ण विकसित फल पर दो हफ्ते पहले ।
कॉफी रोबस्टा		पकाने के लिये १०० पी.पी.एम.
सन्तरा	पकाने के लिये	२०० पी.पी.एम. पूर्ण विकसित फल पर ।
गन्ना	पकाने के लिये	१०० पी.पी.एम. ४-६ हफ्ता पहले

संगति अनुकूलता :

इसके साथ अन्य रसायन मत मिलाइये ।

वानस्पतिक विषाक्ता :

सिफारिशें किऐ हुये प्रमाणो में यह कोई हानि नहीं करती हैं । यह ज्यादा डोवसिक नहीं है । एल.डी. चूहे के लिये ४२२९ मि.ग्रा./किलो भार है ।

विष प्रभाव के लक्षण :

निगलता खतरनाक हैं । त्वचा और आंख में पड़ने पर खुजली होगी ।

सावधानियां :

बच्चों से दूर रखिये । खाने का पदार्थ, पशु पक्षियों के खाने से दूर रखिये । निगलना खतरनाक हैं । आंख त्वचा और कपड़े में लगना नहीं चाहिये ।

एन्टिडोट : लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें । खास एन्टिडोट कोई नहीं।

प्राथमिक चिकित्सा :

अगर निगल गया तो गले में अंगुली डाल कर उल्टी कीजिये । आधा गिलास पानी में दो चम्मच नमच डालकर पिलाइये । वोमिट. फलूईड साफ होने तक यही दे दीजिये अगर आंख में लगा तो खूब पानी से धो लीजिये । त्वचा में पड़ने पर साबून से धो लीजिये ।

खाली डिब्बों का निपटारा :

डिब्बो या बची हुई दवा तथा धोलन को इस तरह मिटाना चाहिये जिससे आसपास की चीजो या पानी विशैला न होने पाए ।

प्राधीकार :

यह उत्तम किस्म का है । इस का परिणाम और परिशुद्ध के अलावा निर्माता व विक्रता पर कोई गारन्टी नहीं देता है ।

रसायनिक संरचना : इथिफान टेक्निकल (न्यूनतम शुध्दता ७५%स.त)...५२.०००% भार /भार प्रोपीलीन ग्लेकोल ....२६.०००% भार/ भार आसुत

AGASTYA RIPHON

ETHEPHON 39% S.L.

రిఫాన్

ఇథేఫాన్ 39% ఎస్.ఎల్.

रिफोन

इथेफोन ३९% एस.एल.

రిఫాన్

ఇథేఫాన్ 39% ఎస్.ఎల్.

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

गर्मी और खुली लौ से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें।

ఎండ, వేడి, వెలుతురు తగలని చల్లని పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

ప్రమాదం खतरा अपाय DANGER

Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured by:

AGASTYA AGRO LIMITED

An ISO Certified Company

UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401
Medchal Mandal, Medchal - Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017
(Old Mfg. Lic. No.: 220/1997-98, Dt: 06-07-1997)

UNIT-II : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

Regd.No.:CIR-108122/2013-ETHEPHON(SL)(340)-1