

लार्वा

इमोरेकिटन बैंजोयेट ५% एस.जी. कीटकनाशक

खबरदारी : ह्या लेबल /हस्तप्रिकेत निवेदित केलेल्या पीकांचे नियन्त्रित अन्य

कुठल्याहि पीकांवर याचा उपचार करू नये.

इमोरेकिटन बैंजायेट ५% एस.जी. हे पाण्यात विरचणारे गोळयासारखे कीटकनाशक असूर त्यार ५% सक्रिय घटक आणि कापसावरीत बोव्ह तसेच भौतिक लॉन्ग फॉल फॉल पोखरणाऱ्या किड्यांच्या नियंत्रणासाठी याची शिकारस केली आहे हे पोटात जाऊन परिणाम दाखवणारे कीटकनाशक आहे त्याचा खाचाखाच्या परिणामांसाठी अल्यांनी ते खाणे किंवा शिथून धेणे आवश्यक आहे याचा परिणाम आलेला अल्या पंगु आल्यासारखा चेतावानी होतात. अन्य ग्रहण करण्याचे थोंबवतात आणि २-४ दिवसात मरतात.

घटक :

इमोरेकिटन बैंजोयेट सक्रिय घटक

(किमान शुद्धता ९५% वर आधारित) : ५.२७०० व/व
सोडियम-एन-मेथिल-एन-आलियोइल-टॉर्ट : ७.५००० व/व
सोडियम अल्किल नॅथ्यॉन सल्फोने : १.०००० व/व
पोलीडायरेलिलिरॉक्सेन : ०.१००० व/व
लॅक्टोजे जैन्हायड्रस : उपरित प्रग्रामात
एकूण : १००.०००० व/व
वापरण्यासाठी शिफारस : कापाशी आणि भेंडी यावरीत किंवा नियंत्रण करण्यासाठी फोटिअर स्पर्गे प्रमाणे इमोरेकिटन बैंजोयेट यी शिफारस केली आहे,

मात्रा प्रति हेक्टेयर

प्रक्रिया	कीट का	सक्रिय तत्व	संरचना	पाण्याची	शेवटच्या
सामान्य नाम	(ग्रा.)	(ग्रा.)	(लीटर)	मात्रा	फवारणी पासून
कापूस बॉलर्वर्म	११	२२०	५००	१५	
भेंडी फॉल					
आणि कॉड	११	२२०	५००	३	
पोखरणाऱ्या कीडी					

वापरांसंबंधी सूचना : अल्यांच्या अल्यांच्या चाहूल लागत्यावर प्रथम वापर करा. आवश्यक असेल त्याप्रमाणे परत वापर करा. पुरेशा प्रमाणात पाण्याचा वापर करून सर्व वरन्स्पर्यावर कफारारे जाईल याची काळजी या.

साठवण : १. कीटकनाशक असलेली पाकिटे ही मूल्याची वेष्टात, त्यात खोलीत किंवा अन्य वरु, विशेषत : खाद्यापार्द ठेवण्याचा जागेपासून रुट ठेवावीत. शक्य असेल तर कडीकुलापाने बंद केलेल्या कपाटात ठेवावीत. २. अशा साठा करण्याच्या खोल्या मजबूत वांधीच्या, कोरड्या, भरूरू उजेडे आणि खेळीची हवा असलेल्या वा योग्य लांबी संदीच्या असाव्यात. यामुळे कोणतेही वाप्त सादून राहणार नाही.

दक्षता : खाद्यापार्दाची खांडी कफारारीचे द्रावण बनवण्यासाठी वापर नका. ते द्रावण दवलण्यासाठी वारीचा वापर करा. त्याचे तोकां कपडे कीटकनाशकाच्या संपर्कात येणार नाही याची काळजी या. याचे वाप्त ढूऱ्या नका. वापर करताना हातातोने घाला. शरीर संरक्षक कपडे, मुखवटा, गोंगांग, रुट इत्यादीचा उपयोग करा. याची हाताळणी किंवा कफारारी करताना काही खाई नका, पिण नका, धुधप्राण करू नका. काम आल्यावर साबण लावून, भरूरू पाण्याने हात रच्य धुवा आणि कपडे बदला. कपड्यावर संडले तर कपडे रच्य धुवा. जाताशयात मिश्वण्यार नाही याची काळजी या.

वापरलेल्या वेटांपाची विरुद्धवा : १. अतिरिक्त द्रावण, टाकातू पाणी रिकारी केटप्पे (खोके), पयोवरणाची हानी होणार नाही आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही अशा रीतीने नष्ट करा. २. वापरलेल्या खोल्यांचा पुनर्वारपर टाळण्यासाठी ते उघड्यावर टाकू नका. ३. असे वापरलेले खोके मोहोतीऱ्या करून वर्सीपासून रुट पुरुन टाका.

विषवारीची लक्षणे : स्नायूर्याची सुरुक्त्रा कमी झाल्यासारखे वाटणे, स्नायूर्याचे कंप सटणे सुटणे, वुत्रुल विसरात्यावरीची होणे असी लक्षण सुरुक्त्रास दिसतात.

प्रथमोपचार : संबंधित व्यक्तीला मोकळ्या हवेत नाच आणि ती गारदून जाणार नाही याची काळजी या. त्याची संरक्षक आसेल तर संबंधित कपडे ताबतोत बदला. संपर्कात आलेले शरीरावर अवयव भरूरू पाण्याने साबण लावून रच्य धुवा. डोकात गेले असेल तर भरूरू वेळ डोके पाण्याने रच्य धुवा. पोटात गेले असेल तर शक्य असल्यास दोन ग्लास पाणी पिण्यास या. जबरदस्तीने उलटी करू नका. ताबतोत ठेविकीय भवत या. सुचना : जार रुग्ण वेश्वद अवरथेत बरेल तर, तोंडाटे काही देऊ नये तरेच उल्टी काडण्याचा प्रयत्न करू नये.

उतार : निश्चित असा उतारा उपलब्ध नाही. लक्षण पाहून उपचार करा.

लावार्स

ज्येंमेमेज्नॉ बैंजेंचें ५% एस.जी. कीटकनाशक

वृक्षात : लग्नसूराद रुक्तप्रदात्रीला सूक्षितसाठे डीजॉग्ल मौलिया लिंगायतीसूरा लावार्सीनीसूरा वृक्षात.

ज्येंमेमेज्नॉ बैंजेंचें ५% एस.जी. हे पाण्यात विरचणारे गोळयासारखे कीटकनाशक असूर त्यार ५% सक्रिय घटक आणि कापसावरीत बोव्ह तसेच भौतिक लॉन्ग फॉल फॉल पोखरणाऱ्या किड्यांच्या नियंत्रणासाठी याची शिकारस केली आहे हे पोटात जाऊन परिणाम दाखवणारे कीटकनाशक आहे त्याचा खाचाखाच्या परिणामांसाठी अल्यांनी ते खाणे किंवा शिथून धेणे आवश्यक आहे याचा परिणाम आलेला अल्या पंगु आल्यासारखा चेतावानी होतात. अन्य ग्रहण करण्याच्या थोंबवतात आणि २-४ दिवसात मरतात.

घटक :

इमोरेकिटन बैंजोयेट सक्रिय घटक

(किमान शुद्धता ९५% वर आधारित) : ५.२७०० व/व

सोडियम-एन-मेथिल-एन-आलियोइल-टॉर्ट : ७.५००० व/व

सोडियम अल्किल नॅथ्यॉन सल्फोने : १.०००० व/व

पोलीडायरेलिलिरॉक्सेन : ०.१००० व/व

लॅक्टोजे जैन्हायड्रस : उपरित प्रग्रामात

एकूण : १००.०००० व/व

वापरण्यासाठी शिफारस : कापाशी आणि भेंडी यावरीत किंवा नियंत्रण करण्यासाठी फोटिअर स्पर्गे प्रमाणे इमोरेकिटन बैंजोयेट यी शिफारस केली आहे,

मात्रा प्रति हेक्टेयर

प्रिक्रिया : ५.२७०० व/व

सोडियम-एन-मेथिल-एन-आलियोइल-टॉर्ट : ७.५००० व/व

सोडियम अल्किल नॅथ्यॉन सल्फोने : १.०००० व/व

पोलीडायरेलिलिरॉक्सेन : ०.१००० व/व

लॅक्टोजे जैन्हायड्रस : उपरित प्रग्रामात

एकूण : १००.०००० व/व

वापरण्यासाठी शिफारस : कापाशी आणि भेंडी यावरीत किंवा नियंत्रण करण्यासाठी फोटिअर स्पर्गे प्रमाणे इमोरेकिटन बैंजोयेट यी शिफारस केली आहे,

मात्रा प्रति हेक्टेयर

प्रिक्रिया : ५.२७०० व/व

सोडियम-एन-मेथिल-एन-आलियोइल-टॉर्ट : ७.५००० व/व

सोडियम अल्किल नॅथ्यॉन सल्फोने : १.०००० व/व

पोलीडायरेलिलिरॉक्सेन : ०.१००० व/व

लॅक्टोजे जैन्हायड्रस : उपरित प्रग्रामात

एकूण : १००.०००० व/व

वापरण्यासाठी शिफारस : कापाशी आणि भेंडी यावरीत किंवा नियंत्रण करण्यासाठी फोटिअर स्पर्गे प्रमाणे इमोरेकिटन बैंजोयेट यी शिफारस केली आहे,

मात्रा प्रति हेक्टेयर

प्रिक्रिया : ५.२७०० व/व

सोडियम-एन-मेथिल-एन-आलियोइल-टॉर्ट : ७.५००० व/व

सोडियम अल्किल नॅथ्यॉन सल्फोने : १.०००० व/व

पोलीडायरेलिलिरॉक्सेन : ०.१००० व/व

लॅक्टोजे जैन्हायड्रस : उपरित प्रग्रामात

एकूण : १००.०००० व/व

वापरण्यासाठी शिफारस : कापाशी आणि भेंडी यावरीत किंवा नियंत्रण करण्यासाठी फोटिअर स्पर्गे प्रमाणे इमोरेकिटन बैंजोयेट यी शिफारस केली आहे,

मात्रा प्रति हेक्टेयर

प्रिक्रिया : ५.२७०० व/व

सोडियम-एन-मेथिल-एन-आलियोइल-टॉर्ट : ७.५००० व/व

सोडियम अल्किल नॅथ्यॉन सल्फोने : १.०००० व/व

पोलीडायरेलिलिरॉक्सेन : ०.१००० व/व

लॅक्टोजे जैन्हायड्रस : उपरित प्रग्रामात

एकूण : १००.०००० व/व

वापरण्यासाठी शिफारस : कापाशी आणि भेंडी यावरीत किंवा नियंत्रण करण्यासाठी फोटिअर स्पर्गे प्रमाणे इमोरेकिटन बैंजोयेट यी शिफारस केली आहे,

मात्रा प्रति हेक्टेयर

प्रिक्रिया : ५.२७०० व/व

सोडियम-एन-मेथिल-एन-आलियोइल-टॉर्ट : ७.५००० व/व

सोडियम अल्किल नॅथ्यॉन सल्फोने : १.०००० व/व

पोलीडायरेलिलिरॉक्सेन : ०.१००० व/व

लॅक्टोजे जैन्हायड्रस : उपरित प्रग्रामात

एकूण : १००.०००० व/व

वापरण्यासाठी शिफारस : कापाशी आणि भेंडी यावरीत किंवा नियंत्रण करण्यासाठी फोटिअर स्पर्गे प्रमाणे इमोरेकिटन बैंजोयेट यी शिफारस केली आहे,

मात्रा प्रति हेक्टेयर

प्रिक्रिया : ५.२७०० व/व

सोडियम-एन-मेथिल-एन-आलियोइल-टॉर्ट : ७.५००० व/व

सोडियम अल्किल नॅथ्यॉन सल्फोने : १.०००० व/व

पोलीडायरेलिलिरॉक्सेन : ०.१००० व/व

लॅक्टोजे जैन्हायड्रस : उपरित प्रग्रामात

एकूण : १००.०००० व/व

वापरण्यासाठी शिफारस : कापाशी आणि भेंडी यावरीत किंवा नियंत्रण करण्यासाठी फोटिअर स्पर्गे प्रमाणे इमोरेकिटन बैंजोयेट यी शिफारस केली आहे,

मात्रा प्रति हेक्टेयर

प्रिक्रिया : ५.२७०० व/व

सोडियम-एन-मेथिल-एन-आलियोइल-टॉर्ट : ७.५००० व/व

सोडियम अल्किल नॅथ्यॉन सल्फोने : १.०००० व/व

पोलीडायरेलिलिरॉक्सेन : ०.१००० व/व

लॅक्टोजे जैन्हायड्रस : उपरित प्रग्रामात

एकूण : १००.०००० व/व

वापरण्यासाठी शिफारस : कापाशी आणि भेंडी यावरीत किंवा नियंत्रण करण्यासाठी फोटिअर स्पर्गे प्रमाणे इमोरेकिटन बैंजोयेट यी शिफारस केली आहे,

मात्रा प्रति हेक्टेयर

प्रिक्रिया : ५.२७०० व/व

सोडियम-एन-मेथिल-एन-आलियोइल-टॉर्ट : ७.५००० व/व

सोडियम अल्किल नॅथ्यॉन सल्फोने : १.०००० व/व

पोलीडायरेलिलिरॉक्सेन : ०.१००० व/व

लॅक्टोजे जैन्हायड्रस : उपरित प्रग्रामात

एकूण : १००.०००० व/व

वापरण्यासाठी शिफारस : कापाशी आणि भेंडी यावरीत किंवा नियंत्रण करण्यासाठी फोटिअर स्पर्गे प्रमाणे इमोरेकिटन बैंजोयेट यी शिफारस केली आहे,

मात्रा प्रति हेक्टेयर

प्रिक्रिया : ५.२७०० व/व

सोडियम-एन-मेथिल-एन-आलियोइल-टॉर्ट : ७.५००० व/व

सोडियम अल्किल नॅथ्यॉन सल्फोने : १.०००० व/व

पोलीडायरेलिलिरॉक्सेन : ०.१००० व/व

लॅक्टोजे जैन्हायड्रस : उपरित प्रग्रामात

एकूण : १००.०००