Chlorantraniliprole 9.3%+Lambdacyhalothrin 4.6% ZC
(Insecticide)

Lambdacyhalothrin 4.6%+Chlorantraniliprole 9.3% ZC is a broad spectrum foliar insecticides providing both rapid knockdown and long lasting efficacy against pest.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (g)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in water (L)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Brinjal	Shoot and fruit borer, Jassids	28	200	500	5	-
Chilli	Thrips, Mites & Fruit borer	37.5	625	500	5	-
Cotton	bollworm	37.5	250	500	20	-
Okra	Shoot and fruit borer Jassids	28	200	500	3	-
Pigeon Pea	Pod borer	30	200	500	18	-
Rice	Stem borer, leaf folder green leaf hopper	28-35	200-250	500	3	
Soy bean	Leaf worm, Girdle beetle, Semilooper Stem fly	28	200	500	41	-

Direction of Use : Measures out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

Time of Application: When used as per the recommendations given below, Lambdacyhalothrin 4.6%+Chlorantraniliprole 9.3% ZC protects the Pigeon Pea crop from Pod borer and bollworm complex in cotton.

Precautions : Do not cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin. eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapors. Wear hand gloves and face shield to avoid contact with the skin and prevent any splashes into the eyes. Wear protective clothing, mask, goggles and boots while handling and application of the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticides. Also wash the contaminated clothes.

Symptoms Of Poisoning : No case of human poisoning is on record.

First Aid : Remove the affected person to a well ventilated area to fresh air and protect him from under cooling. Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. Rinse eyes with clean water for several minutes. If ingested, have the person sig a glass of water if able to swallow. Get the attention of the medical doctor immediately. NOTE: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

Phytotoxicity : -

Antidote: No specific antidote known. treat symptomatically and give supportive therapy. This product is toxic to fish and honey bees.

Disposal Of Used Container: 1. Packages or surplus material and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapor. 3. Do not allow product to freeze.

Chemical Composition:

Chlorantraniliprole a.i	9.30% w/w
Lambdacyhalothrin a.i.	4.60% w/w
Wetting and Dispersing agents: Tristyrylphenol polyethoxyester phosphate	3.70% w/w
Sodium lignosulphate	0.93% w/w
Emulsifiers: Solution of an acrylic graft copolymer in water and propyleneglycole	1.85% w/w
Copolymer butanol PO/EO	0.24% w/w
Dodecy lbenzenesulfonic acid sodium salt	0.08% w/w
Fatty acids, polycondensed	0.41% w/w
Thickners: Magnesium aluminium silicate dispersion	3.24% w/w
Linear polysaccharides	0.29% w/w
Preservative: 1,2 -benzisothiazol-3-one	0.23% w/w
Antifreeze: DL-propanediol-(1,2)	6.52% w/w
Antifoaming agent: Polydimethyl siloxane	0.19% w/w
Silicone emulsion	0.02% w/w
Stabiliser: Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated	0.51%w/w
Buffers: Potassium hydroxide	0.09% w/w
Sulfuric acid	0.27% w/w
Ammonia	0.12% w/w
Pigment: Titanium dioxide	0.49% w/w
Capsule wall: Poly urea	0.77% w/w
Sloventc: Solvent Naphtha	3.79% w/w
Water	Q.S %
Total	100% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

क्लोरेनट्रोनिलिप्रोल 9.3% + लैम्बडास्योहेलोथरिन 4.6% जैड सी
(कीटनाशक)

लैम्बडास्योहेलोथरिन 4.6% + क्लोरेनट्रोनिलिप्रोल 9.3% जैड सी एक बहुपयोगी कीटनाशक मिश्रण है जो तीव्रता से कीडे को मार गिराने की क्रियाशीलता रखता है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा.)	प्रति हेक्टेयर मात्रा संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
बैंगन	तना एवं फल भेदक और तेला	28	200	600	5	—
		37.5	625	500	5	—
कपास	सुंडिया	37.5	225	500	20	—
भिन्डी	तना एवं फल भेदक और तेला	28	200	500	3	—
अरहर	फली भेदक	30	200	500	18	—
धान	तना छेदक, पता मोड़क, हरा फुदका	28–35	200–250	500	53	—
सोयाबीन	पत्ते का कीड़ा, करचनी बीटल, सेमीलूपर तना मक्खी	28	200	500	41	—

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश

उत्पाद की लिखित मात्रा लिजिए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। निदिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लिजिए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल में प्रयोग कीजिये।

प्रयोग का समय नीचे दिये गये सिफारिश की अनुसार लैम्बडास्योहेलोथरिन 4.6:. क्लोरेनट्रोनिलिप्रोल 9.3: जैइ सी का इस्तेमाल अरहर की फसल पर फली भेदक और कपास पर सुंडिया की रोकथाम के लिए की जाती है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए । स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी को प्रयोग करें। त्वचा, आँख, और मुँह को कीटनाशक के संपर्क से बचाये तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोके । सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान दस्तानों, नकाब और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना पीना और धूम्रपान करना नहीं चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद कीटनाशी से प्रभावित हिस्सो को अच्छी तरह धो लो और कपड़े बदल ले। दूषित कपड़ो को अच्छी तरह धो ले

विष के लक्षण अब तक कोई भी विष की घटना नहीं हुई। प्रयोगशाला के परिक्षणों में चूहों पर विष का कोई निश्चित लक्षण नहीं **है।**

प्राथमिक चिकित्सा

प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषत जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाएं। त्वचा में लगने परः प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा उसका प्रभावित हिस्सो को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोयें। आँखो को कुछ तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए । निगल जाने पर कुछ भी तरल ना दें।

सूचनाः यदि मरीज बेहोश हो तो मुंह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

पौधविशाक्तता

विष नाशक कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं, लक्षण के अनुसार उपचार करें। यह उत्पादन मच्छी व मधुमक्खी के लिए हानिकारक है।

खाली डिब्बों का निपटारा 1. पर्यावरण प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बो, बचा हुआ घोल पदार्थ, मशीनों के धुलाई और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। 2. उपयोग किए गए डिब्बो पैकटो को वैसे ही बाहर नही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार उनके दुबारा उपयोग को रोका जा सकता है। 3. पैकटो / डिब्बो को तोड़ मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें 1. कीटनाशक के डिब्बो को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के समान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरो या इमारतों से दूर अलग कमरो या इमारतों में अथवा अलग से ताला बन्द अलमारियों में रखना चाहिए । 2. कीटनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारते मजबूत, सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण न हो सकें। 3. कीटनाशक को जमने ना दें।

रासायनिक संरचना

क्लोरेन ट्रोनिलिप्रोल स.त.	9.30 % भा/भा
लैम्बास्योहेलाथरिन स.त.	4.60 % भा/भा
वेटीन एंड डिस्प्रजिंग एजेंटः ट्रिसटायराइलफिनोल पोलिइथॉक्सिएस्टर फॉसफेट	3.70 % भा/भा
सोडियम लिग्निनसल्फोनेट	0.93 % भा/भा
इमल्सिफायर एक्लिक ग्राफट कोपोवलिमर का घोल पानी व प्रोपायलीनग्लायकोल	1.85 % भा/भा
कोपोलिमर ब्युटेनोल पीओ / इओ	0.24 % भा/भा
डोडिससाइल बैन्जिनसल्फोनिक एसिड सोडियम लवण	0.08 % भा/भा
फैटि एसिड पोलिकंडेन्साइ	0.41 % भा/भा
थिक्नरः मैग्निशियम एल्युमिनियम सिलिकेट	3.24 % भा/भा
लिनिअर पोलिसैकोराइड	0.29 % भा/भा
प्रिजरवेटिव 1.2 बैन्जिसोथायाजोल – 3 एन	0.23 % भा/भा
एंटिफ्रिज डी एल प्रोपेनडायल (1,2)	6.52 % भा/भा
ऐंटीफोमिंग ऐजेंटः पोलीडायमिथाइल सिलोग्जेन	0.19 % भा/भा
सिलिकोन इमल्शन	0.02 % भा/भा
स्थेबलाइजर लिग्नोसल्फोनिक एसिड, सोडियम लवण, सल्फोमिथाइलेटड	0.51 % भा/भा
बफैरसः पॉटिशयम हाइड्रॉक्साइड	0.09 % भा/भा
सल्फ्युरिक एसिड	0.27 % भा/भा
अमोना	0.12 % भा/भा
पिगमेंटः टाइटेनियम डायॉक्साइड	0.49 % भा/भा
कैप्सुल वॉलः पोलि युरिया	0.77 % भा/भा
सौलवेन्टः सॉलवेन्ट नेप्था	3.79 % भा/भा
पानी	पर्याप्त मात्रा
कुल	100 % भा/भा

चेतावनीः लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 9.3% + లాంబ్డాసైహలోథ్రిన్ 4.6% జెడ్‌సి
(కీటకనాశిని)

లాంబ్డాసైహలోథ్రిన్ 4.6% + క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 9.3% జెడ్ సి విస్తృత చర్య గల సత్వరమే కీటకాలను నిర్మూలించు, దీర్ఘకాల ప్రభావం గల అకులపై పిచికారీ చేయు కీటకనాశిని.

సిఫారసు :

పంటలు	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.మ. (గ్రా.)	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (మిలీ)	నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు కోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులు)	పునఃప్రవేశం ప్రతి పిచికారీ తరువరి (గంటలు)
వంగ	కొమ్మ మరియు కాయతొలుచు పురుగు, పచ్చదోమలు	28	200	500	5	
మిరప	తామర పురుగులు, నల్లి మరియు కాయతొలుచుపురుగు	37.5	625	500	5	
ప్రత్తి	కాయతొలుచు పురుగులు	37.5	250	500	20	
బెండ	కొమ్మ మరియు కాయ తొలుచు పురుగు, పచ్చదోమలు	28	200	500	3	
కంది	కాయతొలుచు పురుగులు	30	200	500	18	
వరి	కాండంతొలుచు పురుగులు ఆకుమడ్డు పురుగు, పచ్చదోమలు	28-35	200-250	500	53	
సోయాబీన్	ఆకుతొలుచు పురుగులు పెంకుపురుగు, దాసరి పురుగు కాండం ఈగ	28	200	500	41	

ఉపయోగించుటకు సూచన : అవసరమైన పరిమాణంలో ఉత్పత్తికి కొద్దిపాటి నీటిలో కలిపి బాగా కలియతిప్పాలి. తదుపరి సూచించిన మిగతా నీటిని కలిపి కలియతిప్పి, సరియగు స్ప్రేయర్‌తో పంటపై పిచికారీ చేయుటకు ద్రావణం సిద్ధం చేయండి.

ఉపయోగించు సమయం: క్రింద సిఫార్సు చేయబడిన ప్రకారం ఉపయోగించినచో, లాంబ్డాసైహలోథ్రిన్ 4.6% + క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 9.3% జెడ్‌సి కంది పంటలోని కాయతొలుచు పురుగు మరియు ప్రత్తి పంటలోని కాయతొలుచు పురుగుల నుండి రక్షిస్తుంది.

ముందు జాగ్రత్తలు: పిచికారీ ద్రావణాన్ని సిద్ధం చేయడానికి వంట పాత్రలను ఉపయోగించరాదు. కలియ తిప్పుటకు కర్రను ఉపయోగించండి. మందును చర్మము, కళ్ళు మరియు చర్మంనకు అంటనీయరాదు. మందు పొగమంచు మరియు ఆవిరి పీల్చరాదు. చర్మమునకు అంటకుండా మరియు కళ్ళలో చిందకుండా చేతి తొడుగులు మరియు ముఖ కవచం ధరించాలి. ఉపయోగించునపుడు సురక్షిత దుస్తులు, ముఖకవచం, కళ్ళ జోడు మరియు బూట్లు ధరించండి. ఉపయోగించే సమయంలో ఏదైనా తినుట, త్రాగుట లేదా పొగ త్రాగుట వంటివి చేయరాదు. పని ముగిసిన తదుపరి చేతులను సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచుకొని, దుస్తులు మార్చుకోవాలి. కీటకనాశినుల ద్వారా పర్యావరణం మరియు నీటి వనరులను కలుషితం చేయరాదు. పని ముగిసిన తర్వాత దుస్తులు మార్చుకోండి. పురుగుమందులతో గాలి మరియు నీటి వనరులను కలుషితం చేయరాదు . కలుషిత దుస్తులను కూడా శుభ్రపరచుకోవాలి.

విష లక్షణాలు: మానవులలో ఒక కేసు కూడా నమోదు కాలేదు.

ప్రథమ చికిత్స : ప్రభావిత వ్యక్తిని స్వచ్ఛమైన గాలికి, బాగా వెలుతురు వచ్చే ప్రదేశంలోనికి తరలించి శరీరం చల్లబడకుండా రక్షించండి. కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించి, ప్రభావిత శరీర భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభ్రపరుచుకోవాలి. శుభ్రమైన నీటితో కొద్ది నిమిషాల పాటు కళ్ళను ధారగా కడగాలి. మింగినచో, ఒక గ్లాసు నీటిని మింగగలిగితే వ్యక్తికి త్రాగించండి. వెంటనే వైద్యుని పిలవండి. గమనిక: అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి వాంతులు చేయించరాదు లేదా నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు.

విషతులుల్యత :-

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణాల ప్రకారం చికిత్స ఇవ్వండి. ఈ ఉత్పత్తి చేపలు మరియు తేనెటీగలకు విషకారి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ వినర్జన : 1. ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన పదార్థాలను మరియు యంత్రాలను కడిగిన ద్రావణం పర్యావరణం మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా వినర్జించాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించడానికి వీలులేకుండా బయట పారవేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ: 1. కీటకనాశినులను నిల్వ చేయ ప్యాకేజీలను ఒరిజినల్ కంటైనర్లలో వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలకు, ప్రత్యేకంగా ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ప్రత్యేక అలమారాలలో తాళం వేసి భద్రపరచుకొనవలెను. 2. నిల్వచేయు గదులు పొడిగా, చల్లగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, కలుషిత అవిరిని నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి. 3. ఉత్పాదనను గడ్డ కట్టనీయరాదు.

రసాయన మిశ్రమం

క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ స.మ.	9.3% భా/భా
లాంబ్డా సైహలోథ్రిన్ స.మ.	4.60% భా/భా
వెట్టింగ్ మరియు డిస్పర్షింగ్ ఏజెంట్లు: ట్రైస్టైరిల్ ఫినాల్ పాలిఇథాక్సీ ఈస్టర్ ఫాస్ఫేట్	3.70% భా/భా
సోడియం లిగ్నోసల్ఫేట్	0.93% భా/భా
ఎమల్సిఫైయర్లు: సొల్యూషన్ ఆఫ్ యాక్రిలిక్ గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్ ఇన్ వాటర్ మరియు ప్రొపిలిన్ గ్లైకోల్	1.85% భా/భా
కోపాలిమర్ బుటనాల్ పి ఓ /ఈ ఓ	0.24% భా/భా
డొడెసిల్ బెంజీన్ సల్ఫానిక్ ఆమ్లం సోడియం ఉప్పు	0.08% భా/భా
ఫ్యాటీ ఆమ్లం, పాలీ కండెన్సడ్	0.41% భా/భా
థికనర్‌లు: మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికేట్ డిస్పర్షన్	3.24% భా/భా
లీనియర్ పాలిసాకరైడ్లు	0.29% భా/భా
ప్రిజర్వేటివ్: 1,2 -బెంజిసోథయాజోల్-3-వన్	0.23% భా/భా
యాంటీఫ్రీజ్: డి ఎల్ -ప్రొపేన్ డయోల్ -(1,2)	6.52% భా/భా
యాంటీఫోమింగ్ ఏజెంట్: పాలీడిమెథైల్ సిలోక్సేన్	0.19% భా/భా
సిలికాన్ ఎమల్షన్	0.02% భా/భా
స్టెబిలైజర్: లిగ్నోసల్ఫానిక్ యాసిడ్, సోడియం ఉప్పు సల్ఫోమెథిలేటెడ్	0.51% భా/భా
బఫర్లు: పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్	0.09% భా/భా
సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం	0.27% భా/భా
అమ్మోనియా	0.12% భా/భా
పిగ్మెంట్: టైటానియం డయాక్సైడ్	0.49% భా/భా
క్యాప్సుల్ వాల్: పాలీ యూరియా	0.77% భా/భా
సాల్వెంట్ : సాల్వెంట్ నాఫ్తా	3.79% భా/భా
నీరు	క్యు ఎస్ %
మొత్తం	100% భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే తప్ప, మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

AGASTYA

INDIGO
Chlorantraniliprole 9.3% + Lambdacyhalothrin 4.6% ZC
(Insecticide)

इंडिगो
क्लोरेनट्रोनिलिप्रोल ९.३ % + लैम्बडास्योहेलोथरिन ४.६% जैड सी
(कीटनाशक)

ఇండిగో
క్లోరంట్రానిలిప్రోల్ 9.3% + లాంబ్డాసైహలోథ్రిన్ 4.6% జెడ్ సి
(కీటకనాశిని)

ಇಂಡಿಗೋ
ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 9.3% + ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಸಿಹಲೋಥ್ರಿನ್ 4.6%ಜೆಡ್‌ಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

విషం
ज़हर
विषम
POISON
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

Unit-I : Survey No. 47, Murahari Pally - 501 401, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017
(old Mfg. Lic.No.:220/1997-98. Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

For Consumer Complaints / Feed back : Customer Care Manager available at above mentioned address or Call
No.: 040 - 6457 6958 E-mail : agastyaagro@yahoo.com
उपभोक्ता शिकायतों–फीडबैक के लिए: कस्टमर केयर मैनेजर उपरोक्त पते या कॉल पर उपलब्ध है।
౦౪౦–౬౪౪౭౬౯౪౭ ఈ-మెయిల్ : agastyaagro@yahoo.com

Reg.No.: CIR-222171/2022-Chlorantraniliprole + Lambdacyhalothrin (ZC) (442)-35

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ક્લોરૉંટ્રાનિલિપ્રોલ 9.3%+ લૅમ્બડાસિહૅલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી

(કીટકનાશક)

લૅમ્બડાસિહૅલોથ્રિન 4.6: . ક્લોરૉંટ્રાનિલિપ્રોલ 9.3: ઝેડસી હે બ્રૉડ સ્પેક્ટ્રમ પર્ણાસંબંધી કીટકનાશકે આહે ને કીટકાંવિરુદ્ધ જલદ નૉકડાઉન આણિ દીર્घકાળ ટિકણારી પરિણામકારકતા પ્રદાન કરતે.

શીફારસઃ

પીક(ંચે)	કીટકાંચે સામાન્ય નાવ	ડોસ/હે એઆય (ગ્રા.)	ફૉર્મયુલેશન (મિલી)	પાણી મધ્યે યલ્યુશન (લી)	પ્રતીક્ષા કાલાવધી શેવટચ્યા ફવારણીચ્યા દરમ્યાન (દિવસાત)	પુન્હા પ્રવેશ પ્રલંબ નંતર વાપર (તાસાત)
વાંગી	અંકુર આણિ ફળ બોઅરર, જસ્સીદ્સ	28	200	500	5	
મિરચી	થ્રિપ્સ, માઇટ્સ આણિ ફ્રૂટ બોરર	37.5	625	500	5	
કાપૂસ	બૉંડઅળી	37.5	250	500	20	
ભેંડી	અંકુર આણિ ફળ બોઅરર, જસ્સીદ્સ	28	200	500	3	
તૂર	શેંગા બોઅરર	30	200	500	18	
તાંદૂળ	સ્ટેમ બોઅરર, લીફ ફોલ્ડર, ગ્રીન લીફ હૉપર	28–35	200–250	500	53	
સોયાબીન	લીફ વર્મ, ગર્ડલ, બીટલ, સેમીલૂપર, સ્ટેમ ફ્લાય	28	200	500	41	

વાપરણ્યાચી : પદ્ધત ઉત્પન્નાચી આવશ્યક માત્રા મોજા આણિ થોડ્યા પ્રમાણાત પાણ્યાત ચાંગલે મિસળા. યોગ્ય ફવારણી યંત્રાને પિકાચ્યા સંપૂર્ણ કવ્હરેજસાઠી કસૂન આંદોલનાસહ નિર્દિષ્ટ કેલ્યાનુસાર ઉર્વરિત પાણી ઘાલા.

વાપરણ્યાચી વેળ : ખાલી દિલેલ્યા શિફારશીંનુસાર વાપરલ્યાસ, લૅમ્બડાસિહૅલોથ્રિન 4.6:% + ક્લોરૉંટ્રાનિલિપ્રોલ 9.3:% હે તૂર પિકાચે બૉંડઅળી આણિ કાપસાતીલ બૉંડઅળીપાસૂન સંરક્ષણ કરતે **ખબરદારી :** સ્પ્રે દ્રાવણ તયાર કરણ્યાસાઠી સ્વયંપાકાચી માંડી વાપરુ નકા. ફવારણીચે દ્રાવણ ઢવળણ્યાસાઠી સ્પિકર વાપરા. ત્વચેશી સંપર્ક ટાળા. ડોળે આણિ ફેસ. ધુકે આણિ બાષ્પાંચા ઇનહેલેશન ટાળા. ત્વચેચા સંપર્ક ટાળણ્યાસાઠી હાતમોજે આણિ ફેસ શીલ્ડ ઘાલા આણિ ડોळ્યાંવર કોળતેહી શિડકાવ હોઊ નયે. ઉત્પાદન હાતાळતાના આણિ વાપરતાના સંરક્ષણાત્મક કપડે, માસ્ક, ગૉંગલ આણિ બૂટ ઘાલા. કરુ નકા. સાબણાને આણિ भરપૂર પાણ્યાને हાત ધુવા આણિ કામ સંપલ્યાનંતર કપડે બદલા. કીટકનાશકાંસહ हવા આણિ પાણ્યાચે સ્રોત દૂષિત होણ્યાપાસૂન ટાळા. તસેચ દૂષિત કપડે ધુવા.

વિષબાધાચી લક્ષણે : માનવી વિષબાધાચે કોણતેહી પ્રકરણ રેકॉર્ડવર નાહી. ફાયટોટૉક્સિસિટી – ઉતારા વિશિષ્ટ ઉતારા જ્ઞાત નાહી. લક્ષણાત્મક ઉપચાર કરા આણિ સહાય્યક થેરપી દ્યા. હે ઉત્પાદન માસે આણિ મધમાશાંસાઠી વિષારી આહે.

વાપરલેલ્યા કંટેનરચી વિલ્હેવાટ : 1. મશિન આણિ કંટેનરમધીલ પૅકેજેસ કિંવા અતિરિક્ત સાહિત્ય આણિ વૉશિંગચી પર્યાવરણ આણિ જલ પ્રદૂષણ રોખણ્યાસાઠી સુરક્षित પદ્ધતીને વિલ્હેવાટ લાવાવી. 2. વાપરલેલે પૅકેજ ત્યાંચા પુનર્વાપર ટાળણ્યાસાઠી બાહેર સોડલે જાઊ નયે. 3. સંકુલ તોડૂન વસ્તીપાસૂન દૂર પુરલે જાવે.

પ્રથમોપચાર : બાધિત વ્યક્તીલા હવેશીર ઠિકાણી ઠાવી હવેત નેઊન થંડ હોણ્યાપાસૂન સંરક્ષણ કરા. દૂષિત કપડે કાઢૂન ટાકા આણિ શરીરાચે પ્રભાવિત ભાગ સાબણાને આણિ પાણ્યાને પૂર્णપણે ધુવા. કાही મિનિટે ડોळે સ્વચ્છ પાણ્યાને સ્વચ્છ ધુવા. ચાલ્લ્યાસ, ગિळણ્યાસ સક્षમ અસલ્યાસ ત્યા વ્યક્તીલા એક ગ્લાસ પાણી પિણ્યાસ સાંગા. તાબડતોબ વૈદ્યકીય ડૉક્ટરાંચે લક્ષ વેધૂન ઘ્યા. ટીપસ ઉલટવા હોઊ દેઊ નકા કિંવા બેશુદ્ધ ઝાલેલ્યા વ્યક્તીલા તોંડાને કાહીહી દેઊ નકા

ફાયટોટૉક્સિસિટી : –

ઉતારા : કોણતાહી વિશિષ્ટ ઉતારા જ્ઞાત નાહી. લક્षणાત્મક ઉપચાર કરા આણિ સહાય્યક થેરપી દ્યા. હે ઉત્પાદન માસે આણિ મધમાશાંસાઠી વિષારી આહે..

સ્ટોરેજ અટી : 1. કીટકનાશકે અસલેલી પૅકેજેસ મૂળ કંટેનરમધ્યે વેગळ્યા ખોલીત કિંવા આવારાત સાठવૂન ઠેવલી પાહિજેત ત્યા ખોલ્યા કિંવા આવારાત ઇતર વસ્તૂ વિશેષતસ અન્નપદાર્થ ઠેવણ્યાસાઠી વાપરલ્યા जાતાત કિંવા લૉક આણિ चાવીચ્યા ખાલી વેગळ્યા અલમિરામધ્યે ઠેવલ્યા પાહિજેત. 2. કીટકનાશકે સાવવગપાસૂની અસલેલ્યા ખોલ્યા કિંવા પરિસર ચાંગલ્યા પ્રકારે બાંધલેલ્યા, કોરડ્યા ચાંગલ્યા પ્રકાશાચ્યા આણિ હવેશીર આણિ બાષ્પાને દૂષિત હોઊ નયેત હ્મણૂન પુરેશા આકારાચે અસાવેત. 3. ઉત્પાદન गોતવૂ દેઊ નકા.

રાસાયનિક રચના

ક્લોરૉંટ્રાનિલિપ્રોલ સ.ઘ.	9.3% વ/વ
લૅમ્બડાસિહૅલોથ્રિન સ.ઘ.	4.60% વ/વ
ઓલે કરણે આણિ વિખુરણારે એજંટરૂ ફૉસ્ફેટ ટ્રિસ્ટિરિલફેનૉલ પૉલીથૉક્સીસ્ટર	3.70% વ/વ
સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફેટ	0.93% વ/વ
ઇમલ્સીફાયસર્સ ઍંક્રલિક ગ્રાફટ કૉપૉલિમરચે પાણી આણિ **પ્રોપિલીનગ્લાઈકોલ**	1.85% વ/વ
કૉપૉલિમર બ્યૂટેનૉલ	0.24% વ/વ
ડોડીસીલ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક આસીડ સોડિયમ સાલ્ટ	0.08% વ/વ
ફૅટી એસિડ, પૉલીકૉન્ડેન્સ્ડ	0.41% વ/વ
જાડસર : મૅગ્નેશિયમ ઍલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ ડિસ્પેંશન	3.24% વ/વ
લનિયર પૉલિસેકરાઇડ્સ	0.2% વ/વ
સંરક્ષક : 1,2 –બેંઝિસોથિયાઝોલ–3–વન	0.23% વ/વ
ઍંટીફ્રીઝ ડીલ્ય–પ્રોપૅનેડિઓલ–(1,2)	6.52% વ/વ
ઍંટીફોમિંગ એજંટ પૉલીડિમિથાઇલ સિલોક્સેન	0.9% વ/વ
સિલિકૉન ઇમલ્શન	0.02% વ/વ
સ્ટૉંબિલાયઝરરૂ લિગ્નોસલ્ફોનિક એસિડ, સોડિયમ મીઠ, સલ્ફોમેથિલેટેડ	0.51% વ/વ
બફર : પોટૅશિયમ હાયડ્રૉક્સાઇડ	0.09% વ/વ
સલ્ફ્યૂરિક એસિડ	0.27% વ/વ
અમોનિયા	0.12% વ/વ
રંગદ્રવ્યરૂ ટાયટૅનિયમ ડાયઑક્સાઇડ	0.49% વ/વ
કૅપ્સૂલ વૉલરૂ પૉલી યુરિયા	0.77% વ/વ
સ્લોહ્વેંટ્સરૂ સૉલ્વેંટ નેફ્થા	3.79% વ/વ
પાણી	ઉર્વરિત પ્રમાણતા% વ/વ
એકૂણ	૧૦૦% વ/વ

ખબરદારીઃ યા લેબલધ્યત્રકાવર નમૂદ કેલ્યાશિવાય ઇતર પિકાંવર વાપરૂ નયે.

ક્લોરંટ્રાનિલીપ્રોલ્ 9.3% + લ્યાંબ્ડાસિહલોત્રિન્ 4.6% જેડ્ સિ

(કેરૂતનાશક)

લ્યાંબ્ડાસિહલોત્રિન્ 4.6% ક્લોરંટ્રાનિલીપ્રોલ્ 9.3% ઝેડ્સી એ ઇતલાલવાદ એલેગલ કેરૂતનાશકવાગિદ્રુ, કેરૂતગલ વિરુદ્ધ સ્તુતલ નાકઁક્ટન્ મત્તુ દિર્ઘકાલિલન પરિણામકારિત્વદન્નુ ઒દગિસુતુદિ.

શિફારસુલુગલુ:

બેલેગલુ	રોગંદુ સામાન્ય	પ્રમાણ પ્રતિ હેક્ટેરુલુ ફલિતાંકલ પદાર્થલુ (ગ્રા)	શિલીંદ્ર પ્રમાણલુ (મિલી)	નાશકંદુ બેરેસુદ પ્રમાણલુ (લીટર)	કોનેયુ નીરિલો કલિપિન મત્તુ કલિપિન તરુવાત અંતર (દિનગલુલુ)
બદન૆ ચિગુરુ	મત્તુ હણ્ણુ કોરેયુવ હુળુ, જાસિડ્	28	200	500	5
ચિલ્લિ	થ્રૈપ્સ્, હુળગળુ હણ્ણુ કોરેયુવ કેટ હુળુ	37.5	625	500	5
હત્તિ		37.5	250	500	20
બેંડકાયિ	ચિગુરુ મત્તુ હણ્ણુ કોરુવ જાસિડ્સ્	28	200	500	3
રેડગ્રામુ	પાડર કોરુવ	30	200	500	18
ધત્તુ	કાળદ કોરેયુવ હુળુ, એલ૆ ફોલ્યુરુકરિરુ	28–35	200–250	500	53
ૅયોબીન્	એલ૆ કોરેયુવ હુળુ, લિફ્ફા વર્મર્, ગર્દલ્ બીટલ્, સૈમિ લુપર્, કાળદદ નોણ	28	200	500	41

બલક૆ય નિર્દેશકગળુ: બુત્તુન્નદ અગત્યવિરુવ પ્રમાણવન્નુ અళેયુત્તુદે મત્તુ અદન્નુ સ્વલ્પ પ્રમાણદ નીરિનોળગિદે ચિક્કુમી એરુદંતે માડિ. સુરુકુવાદ સિંપઝેકિરુવ યંત્રદોળગિદે બેળેગળ સંપૂર્ણ વ્યાપ્તિગે સંબાળન અંદોળલનદોળગિદે નિર્દિષ્ટપડિસિદ ળવેદ પ્રમાણદ નીરન્નુ સેરિયે. અન્નુળિયુવ સમયુ: અન્નુળિયુવ સમયુ: કેળગે નેરલાગદ શિફારસુગળ પ્રકરુ બરેયિદાગ, લ્યાંબ્ડાસિહલોત્રિન્ 4.6% + ક્લોરંટ્રાનિલીપ્રોલ્ 9.3% ઝુડાસિયુ કેંબુ કાળુ બેળેયુનુ કાળુ કોરેયુવ મત્તુ હત્તિયલ્લિન હુળુવિન કાંબ્રૅક્સ્ દિંદ રક્ષિસુત્તુદે.

મુંસ્નેક્ષુળકેગળુ : સ્પ્રેય દ્રાવણવન્નુ તયારુપુદુ ઉદુગે પાત્રેગળન્નુ માડબેકુ. સ્પ્રેય દ્રાવણવન્નુ બેરેસલુ બેકુ. ચિમ્મદ સંપર્કવન્નુ તપ્પિસુ. કણ્ણુગળુ મત્તુ બાટ્ટે, મોંબુ મત્તુ અવિગળ ઇન્નુળિંદાન્ અન્નુ તપ્પિસુ. ચિમ્મદિ સંપર્કવન્નુ તપ્પિસલુ મત્તુ કણ્ણુગળગે યાવુદેનુ સ્પ્ર૆ગળન્નુ તડેગેદુકોળલુ કૈ કૈગેવસુગળ મત્તુ મુંબળિદ ગુરુતુગળેગળન્નુ ધરિસિ. ઉત્તુન્નવન્નુ નિર્વહિસુવાગ મત્તુ અન્નુળિયુવાગ રક્તકાક્રુક બાટ્ટે, મુંબળિવાડ, કેન્નડક મત્તુ બૂરુંબુગળન્નુ ધરિસિ. ઉત્તુન્નવન્નુ અન્નુળિયુવાગ કેત્નુદેંદે, કુડિયબેંદે અથવા ધૂમપાન માડબેંદે. કૈગળન્નુ સાબૂનુ મત્તુ સાકક્રુ નીરિનિંદ તોળેયિરિ મત્તુ કેલસ મુંગિદ નંતર બાટ્ટે બદલિસિ. કેટનાશકગળેંદદ ગાળિ મત્તુ જલમૂલગળ માલિન્યવન્નુ તપ્પિસિ. કેલુદિદ બાટ્ટેગળન્નુ સહ તોળેયિરિ.

વિષદ લક્ષણગળુ : માનવદ વિષદ યાવુદેંદે પ્રકરણ દાખલિગાલ્લિ.

પ્રથમ ચિકિત્સે : કેત્તિદ વક્તિયન્નુ કાજા ગાળગે ચિન્નુગે ગાળિ ઇરુવ પ્રદેશક્કે કેગેદુહાકે મત્તુ કળસાગિનુવિકેયિંદ અવનન્નુ રક્ષિસિ. કલુષિત બાટ્ટેગળન્નુ કેગેદુહાકે મત્તુ દેહદ કેત્તિદ ભાગગળન્નુ સાબૂકનુ મત્તુ નીરિનિંદદ ચિન્નુગે તોળેયિરિ. હલવારુ નિમિષગળ કાલ શુદ્ધ નીરિનિંદદ કણ્ણુગળન્નુ તોળેયિરિ. સેવનિદર૆, વૃદ્ધયુ સુંગગળુ સાધ્યવાદરે ઒ંદુ લોટુ નીરન્નુ કુડિયિરિ. કક્ષણ વૃદ્ધદુ ગમન સેળેયિરિ. સૂચનેગળુ: પ્રજ્ઞાપ્તિન વૃદ્ધગે વાગુકે માડબેંદે અથવા બાયિયિંદદ એનન્નૂ નીડબેંદે.

પ્રૈયોગશાલકુકિટ : –

પ્રતિકેવિસ: યાવુદેનુ નિર્દિષ્ટ પ્રતિકેવિસ તિળિદિલ્લ. રોગનિલક્ષણદ ચિકિત્સે મત્તુ બેંબલ ચિકિત્સેયન્નુ નીડિ. એગ અબ્રુત્નુવુ મિંગળુ મત્તુ જીંગળુન૊ળગેગે વિષકરિયાગ�.

બલકદ કંટ્રૈનર વિલેવારુ: 1. પરિસર મત્તુ જલ માલિન્યવન્નુ તડેગેટ્ટલુ પ્યાકેજુગળુ અથવા હેચ્ચુવરિ વસ્તુગળુ મત્તુ યિંત્રગળુ મત્તુ કંટ્રૈનરગળેંદ તોળેયિયુવ વસ્તુગળન્નુ સુરક્ષિત રીતિયલ્લિ એળેવરુગે માડબેંદે. 2. બళસિદ પ્યાકેજુગળન્નુ અવુગળ મરુબળકેયન્નુ કડેયલુ હોરગે બિડબારદુ. 3. પ્યાકેજુગળન્નુ મુંબરુ વાસસ્થાનદિંદ દૂર હૂળેયિકે.

મત્તે બલકદ ઝાલે કંટ્રૈનરગળુ અપાયકારુ.

કેટબરુકણ પરિસ્કિગળુ: 1. કેત્તિનાશકગળન્નુ હોંદિરુવ પ્યાકેજુગળન્નુ પ્રત્યેક કેળદે અથવા અવરુણદલ્લિ મૂળલ પાત્રેગળલ્લિ કેટબરિસબેકુ અથવા ઇતર વસ્તુગળન્નુ ઎શેષવાગિ આહારદ વસ્તુગળન્નુ સંગ્રહિસલુ બళસુવ કેળદેગિગળ અથવા અવરુણગળિંદ દૂરવિરુવંતે અથવા લાક્ષ મત્તુ કેર અડિયલ્લિ પ્રત્યેક અલ્રિગળલ્લિ ઇણદિરેકુ. 2. કેત્તિનાશકગળન્નુ સંગ્રહિસલુ ઉદ્દેશિસિરુવ કેળદેગળલ્લિ અથવા અવરુણગળન્નુ ચિન્નુગે નિર્માસિરેકુ. ચિન્નુગે બેળગિંદલે મત્તુ માવે અવિયિંદદ માલિન્યવન્નુ તપ્પિસલુ સાકક્રુ આયામગળન્નુ હોંદિરુવંતે. 3. ઉત્તુન્નવન્નુ ફ્રીજ્ માડલુ અનુમતિકરિસબેંદે.

રાસાયનિક સંયોજનેગળુ:

ક્લોરંટ્રાનિલીપ્રોલ્ સ ફ	9.3% કુ/કુ
લ્યાંબ્ડા સૈઝિહલોથ્રિન્ સ ફ	4.60% કુ/કુ
કેંદગોળિસુવ મત્તુ ચેદુરોસુવ એજેંટ્: ટ્રિસ્ટૈરિલ્ ફેનાલ્	3.70% કુ/કુ
કાલોશ્રાક્ટ્સ્ટર ફ્રાક્ટેટ્	
સોડિયેળ લિગ્નોસલ્ફેટ્	0.93% કુ /કુ
એમલ્સ્ફિયેળરુગળુ: સંલ્લિ અક્રેલિક ગ્રાફ્ટ્ કૉપોલિમર્સ પ્રકારુ પાણિયુ મત્તુ મ૊લિકગળુ	1.85% કુ/કુ
કૉપોલિમર્ બ્યુટેનોલ્	0.24% કુ/કુ
ડોડેસૈલ્ બેન્ઝિન્ સલ્ફોનિક્ આસિડ્ સોડિયેળ ઉપ્પુ	0.08% કુ/કુ
ક૊ઝુનાઝુગળુ. કાલોકરુડેન્ટ્સ	0.41% કુ/કુ
દટ્ટસાગુવુદુ: મૅગ્નેશિયમ્ અલ્યુમિનિયેળ સિલિકેટ્ પ્રસરણ	3.24% કુ/કુ
લિનિયેળ કાલોસ્કુકુર્ડ્સ્ગળુ	0.29% કુ /કુ
સંરક્ષક: 1,2 –બેંઝિસોથિયાઝોલ્–3–઒નુ	0.23% કુ/કુ
ફ્રાઇસ્ટરારુઢેંદક: ઢિ એલ્ –પ્રોપનેડિયોલ્–(1,2)	6.52% કુ/કુ
આંટોફ૊મિંગ્ એજેંટ્: કાલોડિમિથૈલ્ સિલોક્સેન્	0.19% કુ/કુ
સિલિક૊ન્ એમલ્જન્	0.02% કુ/કુ
સ્ટૈબલિયાઝરરુ લિગ્નોસલ્ફોનિક એસિડ, સોડિયમ મીઠ, સલ્ફોમેથિલેટેડ	0.51%કુ/કુ
સલ્ફ્યૂરિક્ એસિડ	0.27% કુ/કુ
અમોનિયા	0.12% કુ/કુ
રંગદ્રવ્યરુ ટાયટૅનિયમ ડાયઑક્સાઇડ	0.49% કુ/કુ
કૅપ્સૂલ વૉલરુ પૉલી યુરિયા	0.77% કુ/કુ
સ્લોહ્વેંટ્સરુ સૉલ્વેંટ નેફ્થા	3.79% કુ/કુ
પાણિ	100% કુ/કુ

઎ચ્ચરિકે: ઈ લેબલ્/પ્રેઝેન્તુદલ્લિ કેળદિરુવ બેળેગળન્નુ મ૊દલુપડિસિ બેરે બેળેગળ મેલે ઇદન્નુ ઉપયોગિસુવુદુ.

કૅલોરોરાન્ટ્રાનીલિપ્રરોલ 9.3% + લામ્પ્ડાસિહલોથ્રિન 4.6% ઇસ્ટ્સિ

(પ્રતિરોધક્કરોલલી)

સૈના કલિમણ્ ક્યુરેસ્ એસ્ તયારિકે, કુયારિપ્પુ મરોત્તુમ 100.000 % વ્વ/વ એર્ચરિકેક્ક: ઇન્દુ લપેબિલે/ તુન્નોત્પાદ પ્રિરસ્રત્તુલિ કુરુપિપ્પડિપ્પટ્ટનુલ્લંતુતે તવિર મત્તુ પયિરુકલિલ પયન્પડુત્તુતક્કે કલ્પિત્રુ.

રકિલમેણ્ટ્સ્પિયેરુન્ :

કુત્તરિ	સ્ટન્ડ મત્તુરાપ પદુપ તૂલપ્પડિપાન્, જુરસિટ્સ્	28	200	500	5 -
સિલ્લિ	ત્રુરિપ્સ્, મડટ્સ્ a પદુપ તૂલપ્પડિપાન્	37.5	625	500	5 -
પરુત્તિ	કાયપ્પરૂ	37.5	250	500	20 -
ઉક્રા	ક્વુશ્ટ્ મત્તુરાપ કાય તૂલપ્પડિપાન્ જુરસિટ્સ્	28	200	500	3 -
પરુા	કાય તૂલપ્પડિપાન્ પટ્ટાણિ	30	200	500	18 -
નલે	તન્ડ તૂલપ્પડિપાન્, ઇલ અટ્પડિપા પચ્ચલ ઇલ્લ તન્ડ	28-35	200-250	500	53 -
સોયા	ઇલ્લ પરૂપ, કિરુટિલ પૈન વન્ડ, સમિલિલુપ્પર તન્ડ	28	200	500	41 -

પયન્પાટ્ટિલે દિસ: ઉત્પત્તિયિલે તવેયોન અલવુ અલવિટ્કિરુતુ મત્તુરાપ ઉરુ સિરિય અલવુ તન્નુંરિલ નન્કુ કલક્કવામ્. તકરુન્નુ તલિપિપાન્ મલેલા પયિરિલ્ મલેરુત્તુપ્પ પ્રપંચિરુક્ક પરૂપયોનિલ કિલરુંચ્ચિયાટ્ન્ કુરુપિપ્પડિટ્ટ અલવુ તુન્નુંરુંચ્ચે સેરૈક્કવામ્.

વિન્નપ્પંપિક્કરુા નરેગ: કૅલુદિ કલેરાટ્ન્કપ્પડિટ્ટનુલ પરિત્રુતરુગળિલ્ પયિપયન્પડુત્તુતમેરોરુ, લામ્પ્પડાસિહલોત્રિન્ 4.6% કૅલોરોરાન્ટ્રાનીલિપ્રરોલ 9.3% ઇસ્ટ્સિ, પરુત્તુયિલે કાય તૂલપ્પડિપાન્ મત્તુરાપ કાયપ્પરૂવિલ્ ઇરુન્નતુ પરુા પયિરુા પાતુકરાક્કિરુતુ.

મનસેરિલ્ચેરિક્કકેગળ્: તલિપિપરુક્ક કરુસલ્સતુ તયારિપ્પડુતુક્કુ સમયેલ્ પાત્રદિરુંકલતંચે સયેય વન્ડેરામ્. તલિપિપરુા કરુસલ્લ કિલરુવતુક્કુ કરુંચેયિપ્પડુ પયન્પડુત્તુવામ્. તરેલપ્પન્ તુરોરાત્તુ તવિરિક્કવામ્. કણ્કલ્ મત્તુરાપ આટ્ન. મશિપન્પલી મત્તુરાપ નીરાવિકલન ઉલ્ળિગૂરપ્પડુતુતે તવિરિક્કવામ્. તરેલપન્ તુરોરાત્તુ તવિરિક્કવામ્, કણ્કલિલ તલિરિપ્પડુતુ તુરુક્કવામ્ કયરુત્તલિલ્ મત્તુરાપ મ૊ક્ક કવસંકલન અણિયરુંકલ્. તયારિપ્પડુ કયોયાલપ્પડે પરેરુા પયન્પડુત્તુવામ્ પરેરુા પારુકાપ્પરૂ આટ્ન, મ૊કલરિટી, કણ્ણાટી મત્તુરાપ પરિટ્સ્ અણિયરુંકલ્. તયારિપ્પડુપ્પડે પયન્પડુત્તુવામ્ પરેરુા સાપ્પિટલવેરુા, કુપિક્કવેરુા અલ્લતુ પ૊કપિટિક્કવેરુા કલેરુતુ. સેરેપ્પરુા મત્તુરાપ નિરુલ્લ તુન્નુંરિ કલેરુન્ન કકલન કલુવલી, લલેલ્લ માટ્પિન્નતુમ્ ઉટકલન માત્રુવામ્. પરિશ્રિક્કલેરુલેકલન્ અટ્પિકલુમાન કાત્રુરા મત્તુરાપ નીર્રુનિલ્લકલન મારુપટ્ટતુવતુક્કુ તવિરિક્કવામ્. અસ્રત્તમાન તુન્નુંકલયરુા તવલકંકવામ્.

વિષત્તિન્ અરિકરુતિકલ્: મનિતુ વિષમ્ એતુવરુા પયિવ સયેયપ્પડવિલ્લલ.

મરુલરુતલી: પાતિક્કપ્પડિટ્ટ કુપરા નન્કુ કાત્રુરેરાટ્ટમાન પકરુતિક્કુ પરુતિય કાત્રુરુક્કુ અપુતુક્કુતુરુ ચલેન્રુ કુલીર્ચ્ચિયિલિરુન્નુતુ અવરુપ્પડે પાતુકાક્કવામ્. અસ્રત્તમાન આટ્કલેકલન અકરુત્રી, ઉટલલિન પાતિક્કપ્પડિટ્ટ પકરુતિકલન સેરેપ્પરુા મત્તુરાપ તુન્નુંરિરુટલ્ નન્કુ કરુપવામ્. પયન્પડુત્તુતિય કલેરુક્કલન અકરુત્રતલ્: 1. સરુત્રરુચ્ચિપુલ મત્તુરાપ નીર્ મારુપાટ્ટલ્તુતે તટુક્કવામ્ વકમયિલે, ઇયત્રિરુક્કલ્ મત્તુરાપ કલેરુક્કલન્કલિલ ઇરુન્નુ પરેરુતિકલ્ અલ્લતુ ઉપરિ પરેરુરટ્કલ્ મત્તુરાપ સલવકલ્ પાતુકરાપ્પાન મારુથલિલ્ અપરુપ્પડિટ્ટતુપ્પડિપ વન્ડેરામ્. 2. પયન્પડુત્તુપ્પડિટ્ટ કુરેરુકપ્પરુકલન મીન્ડરુા પયન્પડુત્તુવતુક્કુ તટુક્ક વલિયિલે વિટક્કરેટુતુરુ. 3. કુરેરુકપ્પરુકલ્ ઉટકુક્કપ્પડિટ્ટ પયન્પડુત્તુક્કુક્કપ્પડિટ્ટ વન્ડેરામ્.

વિરુંરુક કલેરુક્કલન્કલન મીન્ડરુા પયન્પડુત્તુતુવતુરુા આપત્તુતાનતુરુા

સમિતિપ્પડ નિપત્રકલન્કલ્: 1. પરિશ્રિક્કલેરુલેકલ્ અટ્પંકિય પરેરુટ્ટલંકલ્ તની અરુક અલ્લતુરુા વલારુક્કુતિલ્ અસ્રલ્ કલેરુન્કલન્કલિલ્ સમિતિક્કપ્પડિટ્ટ વન્ડેરામ્, અરુકલ્ અલ્લતુરુા વલારુકંકલિલ્ ઇરુન્નુતુ મત્રુ પરેરુરટ્કલન કુરુપિપ્પરુક ઉલવરુપ્પડે પરેરુરટ્કલન સમિતિક્કુ અલ્લતુરુા પરેટ્ટન મત્તુરાપ સાવિયિલ્ કૈમુ તની અલેધિરુંકલિલ્ વકક્કપ્પડિટ્ટ વન્ડેરામ્. 2. પરિશ્રિક્કલેરુલેકલન સમિતિત્તુવ વપ્પડતુક્કાન અરુકલ્ અલ્લતુરુા વલારુકંકલ્ નન્કુ કટ્ટપ્પડિટ્ટકુતરાવામ્, નન્કુ નરીયમ મત્તુરાપ કાત્રુરેરાટ્ટમાનતુરુકલ્, નીરાવિયાલ મારુપટ્ટવતુક્કુ તવિરિક્ક પરેરુતુમાન અલવરુકલક્કે કલેરુન્દુતુરુકવામ્ ઇરુક્કુ વન્ડેરામ્. 3. કુયારિપ્પડિટ્ટ રુળવલતુક્કુ અનુમતિક્કારદીરુકલ્.

વદેષિયિલ્ કલવલ:

કલરોરાન્ટ્રાનલિપ્રરોલ્ સ.ઘ.	9.3% વ/વ
લામ્પડાસિકલહોરુત્રિન્ એણ	4.60% વ/વ
કરુમરુકલુા મત્તુરાપ રીઝુટ્રિકલ્કલુા મ૊કવર્કલ્: ટ્રિસ્ટિલ્પ્રિલ્ફેનોલ	3.70% વ/વ
પાલિઝુક્રેરુટ્રિલ્ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.93% વ/વ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	1.85% વ/વ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.24% વ/વ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.08% વ/વ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.41% વ/વ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	3.24% વ/વ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.29 % /વ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.23% વ/વ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	6.52% વ/વ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.9% વ/વ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.02% વ/વ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.51%કુ/કુ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.09%કુ/કુ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.27% કુ/કુ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.12% કુ/કુ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.49% કુ/કુ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	0.77% કુ/કુ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	3.79% કુ/કુ
કરુમરુપાકકેગળ્: પ્રિલ્ઓ પાલ્પેટ્ સરુરિયિલ્ લિંકેન્ટ્રિસલ્પેટ્	100% કુ/કુ

એચ્ચરિકે: ઇન્દુ લપેબિલે/ તુન્નોત્પાદ પ્રિરસ્રત્તુલિ કુરુપિપ્પડિપ્પટ્ટનુલ્લંતુતે તવિર મત્તુ પયિરુકલિલ પયન્પડુત્તુતક્કે કલ્પિત્રુ.

રાટ્રેલિપ્રોલ 9.3% + લામ્બડા સિહાલોથ્રિન 4.6% ઝેડસી (કીટનાશક)

લેમ્બડાસાયહેલોથ્રિન 4.6% + ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 9.3% ઝેડસી એ પાંદડાં પર વ્યાપક અસર કરનારું જંતુનાશક છે, જે જીવાતોના ઉપદ્રવને ઝડપથી અટકાવે છે અને તેની અસર લાંબા સમય સુધી જળવાઈ રહે છે.

ભલામણઃ

પાક(ઓ)	કીટકનું સામાન્ય નામ	ડોસ/હેક્ટર એ.આઈ. (ગ્રામ)	સંયોજન (મિલી)	પાણીમાં પાતળું (લિટર)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી વચ્ચેનો પ્રતિક્ષાગાળો (દિવસમાં)	દરેક વપરાશ બાદ પુનઃપ્રવેશ (કલાકમાં)ફ્રૂટ અને
ફ્રૂટ	બોર