BUMPER

Fipronil 80% WG - Insecticide

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

Fipronil 80% w/w WG formulation contains 800 g fipronil active ingredient per kg of formulation, fipronil is an insecticides used as a foliar spray for the control of stem borer and leaf folder in Rice, thrips in Grapes, thrips in Onion and Cotton.

Recommendation:

Crop	Common Name of the Pest	Dosage per ha a.i. (g)	Dosage per ha Formulation (ml)	Dosage per ha Dilution in water (L)	Waiting period from last application to harvest (in days)
Grape	Thrips	40-50	50-62	750-1000	20
Cotton	Thrips	60	75	375-500	14
Rice	Stem borer, Leaf folder	40-50	50-62.5	375-500	15
Cabbage	Diamond back moth	75	93.75	500	15
Onion	Thrips	60	75	500	15

Direction of Use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified through agitation for total coverage of crop with suitable sprayers.

Time of Application: Give first spray as soon as incidence of stem borer (appearance of dead hearts) and leaf folder (appearance of white stripes on leaves) start and 1-2 more sprays depending upon severity of the incidence.

Precaution: Caution: Do not use the product near the areas of Bee-Keeping.

Plant Protection Equipment: Hand operated Knapsack sprayer is recommended. Hollow cone or Triple action nozzle can be used.

Precautions: Do not smoke or chew pan or tobacco while handling this product. Wash exposed body parts with soap and water after handling and before eating drinking & smoking. Avoid application on blossoming Onion.

Symptoms Of Poisoning: Mainly consists of irritability, lethargy, muscle tremors and in extreme case possibly convulsions may occur. Fipronil is reversible GABA receptor inhibitor and these symptoms are reversible after termination of exposure.

First Aid: If the chemical is inhaled get the victim into fresh air immediately, if breathing is stopped apply artificial respiration. Induce vomiting if swallowed by tickling at the back of the throat with the finger. Flush the eye with plenty of cold water. Wash the contaminated skin with plenty of soap and water. Get medical attention.

Phytotoxicity: Non-phytotoxic when used as recommended

Antidote: No specific antidote is known. Give symptomatic treatment.

Disposal Of Used Container: 1. The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material and washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions: 1. The packages containing insecticides shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms/ almirahs under lock and key depending upon the nature and quality of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour/air. 3. Avoid application on Blossoming onion

Chemical Composition:

Fipronil active ingredient	80.00 % w/w
Sodium Polycarboxilate	2.90 % w/w
Sodium dioctyl sulfoscuccinate 85%	1.90 % w/w
Silicon Oil emulsion	0.30 % w/w
Sodium lignosulphonate	Q.S. %
Total:	100.00% w/w

బంపర్

ఫిప్రోనిల్ 80% డబ్ల్యు.జి. - కీటకనాశని

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ఫిప్రోనిల్ 80% భా/భా డబ్ల్యు.జి ఫార్ములేషన్‌లో కిలో ఫార్ములేషన్‌లో 800 గ్రా ఫిప్రోనిల్ క్రియాశీల పదార్థం ఉంటుంది, ఫిప్రోనిల్ అనేది వరిలో కాండం తొలుచు పురుగు మరియు ఆకు ముడతను నియంత్రణకు ఫోలియర్ స్ప్రేగా ఉపయోగించే పురుగుమందు, ద్రాక్షలో త్రిప్స్, ఉల్లిపాయ మరియు పత్తిలో త్రిప్స్ నివారించేటందుకు వాడుతారు.

సిఫారసులు:

పంట	కీటకం మామూలు పేరు	ఎ.ఐ. (గ్రా.)	ఒక్కో హెక్టారుకు సూత్రీకరణ (మి.లీ.)	కలపవలసిన నీళ్ళు (లీ.)	ఆఖరి పిచికారి నుండి పంట కోతకు మధ్య వేచివుండవలసిన సమయం (రోజుల్లో)
ద్రాక్ష	త్రిప్స్	40-50	50-62	750-1000	20
ప్రత్తి	త్రిప్స్	60	75	375-500	14
వరి	కాండం తొలుచు, ఆకు ముడత	40-50	50-62.5	375-500	15
క్యాబేజి	డైమండ్ బాక్ మోత్	75	93.75	500	15
ఉల్లిపాయ	త్రిప్స్	60	75	500	15

ఉపయోగించుటకు సూచనలు:

దరఖాస్తు సమయం: కాండం తొలుచు పురుగు (చనిపోయిన గుండెలు కనిపించడం) మరియు లీఫ్ ఫోల్డర్ (ఆకులపై తెల్లటి చారలు కనిపించడం) ప్రారంభమైన వెంటనే మొదటి స్ప్రేని ఇవ్వండి మరియు సంభవం యొక్క తీవ్రతను బట్టి మరో 1-2 స్ప్రేలను ఇవ్వండి.

ముందు జాగ్రత్త:

ముందు జాగ్రత్తలు: హెచ్చరిక: తేనెటీగలను పెంచే ప్రాంతాలకు సమీపంలో ఉత్పత్తిని ఉపయోగించవద్దు.

మొక్కల రక్షణ పరికరాలు: చేతితో పనిచేసే నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ సిఫార్సు చేయబడింది. హాలో కోన్ లేదా ట్రిపుల్ యాక్షన్ నాజిల్‌ని ఉపయోగించవచ్చు.

జాగ్రత్తలు: ఈ ఉత్పత్తిని నిర్వహించేటప్పుడు ధూమపానం చేయవద్దు లేదా పాన్ లేదా పొగాకు నమలవద్దు. బహిర్గతమైన శరీర భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో తర్వాత కడగాలి

నిర్వహణ మరియు మద్యపానం & ధూమపానం తినడానికి ముందు. వికసించే ఉల్లిపాయపై దరఖాస్తును నివారించండి.

విషం యొక్క లక్షణాలు: లక్షణాలు: ప్రధానంగా చిరాకు, బద్ధకం, కండరాల వణుకు మరియు తీవ్రమైన సందర్భంలో మూర్ఛలు సంభవించవచ్చు. ఫిప్రోనిల్ రివర్సిబుల్ గాబా రిసెప్టర్ ఇన్హిబిటర్ మరియు ఎక్స్పోజర్ ముగిసిన తర్వాత ఈ లక్షణాలు తిరిగి మార్చబడతాయి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ: సిఫార్సు చేసిన విధంగా ఉపయోగించినప్పుడు యొక్కలకు ఎటువంటి హాని చేయదు.

విరుగుడు: ననిర్దిష్ట విరుగుడు ఏమీ లేదు. రోగలక్షణాలను అనుసరించి చికిత్స చేయండి

ఉపయోగించిన కంటైనర్‌ను పారవేయడం: 1. ఉపయోగించిన పాత్రలను పగలగొట్టి, నివాసాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి లేదా కాల్చివేయాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా ఉండటానికి వాటిని బయట ఉంచకూడదు. 3. పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యాన్నినివారించటానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థాలు మరియు కడిగిన పాత్రలను సురక్షితమైన ప్రదేశాలలో పారవేయాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1. క్రిమిసంహారకాలను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలు ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలకు దూరంగా ప్రత్యేక గది లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయబడతాయి లేదా పురుగుమందు యొక్క స్వభావం మరియు నాణ్యతను బట్టి తాళం మరియు కీ కింద ప్రత్యేక గదులు / అల్మిరాలలో ఉంచాలి. 2. క్రిమిసంహారకాలను నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడాలి, బాగా వెలుతురు, పొడి, బాగా కాంతి మరియు ఆవిరి/గాలితో కలుషితం కాకుండా తగినంత పరిమాణంలో నిర్మించాలి. 3. వికసించే ఉల్లిపాయపై దరఖాస్తును నివారించండి.

రసాయన మిశ్రమము:

ఫిప్రోనిల్ క్రియాశీల పదార్థం	80.00 % భా/భా
సోడియం పాలికార్బాక్సిలేట్	2.90 % భా/భా
సోడియం డయోక్టైల్ సల్ఫోస్కుకినేట్ 85%	1.90 % భా/భా
సిలికాన్ ఆయిల్ ఎమల్షన్	0.30 % భా/భా
సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	క్యు.ఎస్. %
మొత్తం:	100.00% % భా/భా

बम्पर

फिप्रोनिल 80 प्रतिशत डब्लू.जी.-कीटनाशक

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

फिप्रोनिल्न 80 भार/भार डब्लूजी में 800 ग्राम फिप्रोनिल सक्रिय तत्व प्रति | किलो फार्मुलेशन में समाविष्ट है। फिप्रोनिल एक कीटनाशक है, जिसका प्रयोग धान में तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडी प्याज, अंगूर तथा कपास में चुरदा की रोकथाम के लिए किया जाता है।

उपयोग की मात्राऐ:

फसल	कीट का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व (ग्रा)	मात्रा प्रति हेक्टेयर संरचना (मि. ली.)	मात्रा प्रति हेक्टेयर पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिडकाव और फसल की कटाई के बीच अंतराल (दिन)
अंगूर	चुरदा	40-50	50-62	750-1000	20
कपास	चुरदा	60	75	375-500	14
धान	तना छेदक, पत्ता लपेट सुंडी	40-50	50-62.5	375-500	15
पात गोभी	हीरा पीठ पतंगा	75	93.75	500	15
प्याज	चुरदा	60	75	500	15

उपयोग के लिए निर्देश:

प्रयोग का समय: पहला छिड़काव करें। जैसे ही तना छेदक सुंडी (तने का सुखना)तथा पत्ता लपेट सुंडी (जैसे ही पत्तो पर सफेद धारीया दिखाई दे)का हमला शुरु हो। अगर इन सुंडीयो का हमला ज्यादा हो या फिर दिखाई पड़े तो 4-2 छिड़काव और दे।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: ससावधानः फिप्रोनिल्न 80 डब्ल्युजी का प्रयोग मधू मक्खी पालन की जगह के पास ना करें। पौध सुरक्षा यंत्र - हाथ से चलने वाले नैपसैक स्प्रेयय का उपयोग करे। होलो कॉन या ट्रिपल ऐक्शन की नोजल का इस्तेमाल कर सकते है। सावधानियाँ- इस्तेमाल के समय धूम्रपान न करें, न ही खाएं और पीए। इस्तेमाल के बाद और खाने पीने या धूम्रपान से पहले शरीर के दूषित भागो को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धो ले। प्याज में फूल खिलने के समय इसका उपयोग करने से बचें

विष के लक्षण: चिड़चिडापन, उदासी,मासपेशियों में ऐठना।अत्याधिक प्रकोप की अवस्था मे दौरे पड़ने की संभावनाएं हो सकती है। फिप्रोनिल गाबा रिसेप्टर अवरोधक है एंव कीटनाशक से संबंध हटाते ही उपरोक्त लक्षण समाप्त हो जाते है और प्रभावित व्यक्ति पूर्वावस्था में आ जाता है।

प्राथमिक चिकित्सा: पकीटनाशक श्वास द्वारा अन्दर गयी हो तो तुरन्त खुली हवा मे ले जाएं। श्वास रुकने त्रगे तो कृत्रिम शवासोच्छश्रवास अमत्र में त्राएं। कीटनाशक पेट में चले जाने पर मरीज को गले के अंदर उंगली डालकर उल्टी करवाएं। आँखो को भरपूर पानी से धो ले। दूषित त्वचा को साबून और पानी से धोएं। डाक्टरी सत्राह प्राप्त करें।

पौधविशाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करें, पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नही है।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नही है। ल्क्स्कृषणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. खाली डिब्बो को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करे तथा जमीन मे गाड दीजिये या इनसिनरेटर मे जला दें। 2. खाली डिब्बों को बाहर न रखिये ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सकें। 3.डिब्बो ,बचे हुए कीटनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वतावरण या पानी दूषित न हो|

सग्रहण की शर्तें: 1.कीटनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या भवन में अन्य पदार्थो के संग्रह हेतु कमरों या भवन से दूर रखना चाहिए अथवा कीटनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलमारी मे ताला लगाकर रखना चाहिए। 2. कीटनाशकों के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार ,सुखे , प्रर्याप्त बड़े होने चाहिए/ताकि बाष्प/हवा के साथ प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हों। 3. ब्लोसोमिंग प्याज पर न छिडकें

रसायनिक संरचना:

फिप्रोनिल सक्रिय तत्व	80.00 % भार/भार
सोडीयम पॉलीकार्बोक्सिलेट	2.90 % भार/भार
सोडीयम डाइओक्टाइल सफ्लोसक्सीनेट 85 प्रतिशत	4.90 % भार/भार
सीलीकॉन ऑइल इमलशन	0.30 % भार/भार
सोडीयम लिग्नोसल्फोनेट	प्र्याप्त मात्रा %
योग	100.00% भार/भार

AGASTYA

BUMPER

Fipronil 80% WG - Insecticide

बम्पर

फिप्रोनिल 80 प्रतिशत डब्लू.जी. - कीटनाशक

బంపర్

ఫిప్రోనిల్ 80% డబ్ల్యు.జి. - కీటకనాశని

ಬಂಪರ್

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 80% ಭಾ/ಭಾ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಜಿ - ಕೀಟನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
गर्मी और खुली ली से दूर ठंडी, सूखी जगह पर रखें।
ఎండ, వేడి, వెలుతురు తగలని చల్లని పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.
ಎಂಡ, ವೆಡಿ, ವೆಲುತುರು ತಗಲನಿ ಚಲ್ಲನಿ ಪೊಡಿ ಪ್ರದೇಶಂಲೊ ಉಂಚಂಡಿ.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಸಗಿರ ವಿಷಮು
ज़हर POISON ವಿಷ
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।
For agricultural use only

Manufactured and Marketed by:
AGASTYA AGRO LIMITED
An ISO Certified Company
UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 501 401
Medchal Mandal, Medchal - Malkajgiri Dist., Telangana State.
Mfg. Lic. No. : 027/TS-IML/2017
(Old Mfg. Lic. No.: 220/1997-98, Dt: 06-07-1997)

UNIT-II : H.No.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com

Regn. No.:CIR-141748/2017-Fipronil (WG) (377)-1222

बम्पर

फिप्रोनिल 80% भार/भार डब्लू.जी.-कीटनाशक

खबरदारी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत निर्देशित केलेल्यां पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

फिप्रोनिल 80% भार/भार घुलनशील पौवडर फॉर्म्युलेशनमध्ये प्रति किलो फॉर्म्युलेशनमध्ये 800 ग्रॅम फिप्रोनिल सक्रिय घटक असतो, फिप्रोनिल हे एक कीटकनाशक आहे जे तांदूळ, द्राक्षातील थ्रीप्स, कांदा आणि कापसातील थ्रीप्स, स्टेम बोरर आणि लीफ फोल्डरच्या नियंत्रणासाठी पर्णासंबंधी स्प्रे म्हणून वापरले जाते.

सिफारशी:

पीक	किडीचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर डोस			अंतिम फवारणी ते कापणीपर्यंतचा प्रतिक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये)
		ए.आय (ग्रॅम)	द्रवण (मिली)	पाण्यात विरघळवणे (लि.)	
द्राक्ष	थ्रिप्स	40-50	50-62	750-1000	20
कापूस	थ्रिप्स	60	75	375-500	14
तांदूळ	स्टेम बोअरर, लीफ फोल्डर	40-50	50-62.5	375-500	15
कोबी	हिरा पतन पतंग	75	93.75	500	15
कांदा	थ्रिप्स	60	75	500	15

वापरण्याची दिशा:

अर्ज करण्याची वेळ: स्टेम बोअरर (मृत हृदय दिसणे) आणि लीफ फोल्डर (पानांवर पांढरे पट्टे दिसणे) चा प्रादुर्भाव सुरू होताच पहिली फवारणी करा आणि प्रादुर्भावाच्या तीव्रतेनुसार आणखी 1-2 फवारण्या करा.

खबरदारी:

खबरदारी: मधमाशी पालन क्षेत्राजवळ उत्पादन वापरू नका.

वनस्पती संरक्षण उपकरणे: हाताने चालवलेल्या नॅपसॅक स्प्रेअरची शिफारस केली जाते. पोकळ शंकू किंवा ट्रिपल ॲक्शन नोजल वापरता येते.

खबरदारी: हे उत्पादन हाताळताना धूम्रपान करू नका किंवा पॅन किंवा तंबाखू चघळू नका. शरीराचे उघडे भाग नंतर साबणाने आणि पाण्याने धुवा

हाताळणी आणि खाण्यापूर्वी मद्यपान आणि धूम्रपान. कांद्याला फुलणे टाळा.

विषबाधाची लक्षणे: लक्षणे: प्रामुख्याने चिडचिडेपणा, आळस, स्नायूंचा थरकाप आणि अत्यंत प्रकरणांमध्ये शक्यतो आकुंचन होऊ शकते. फिप्रोनिल हे उलट करता येण्याजोगे गभा रिसेप्टर इनहिबिटर आहे आणि ही लक्षणे एक्सपोजर संपल्यानंतर उलट करता येतील.

प्रथमोपचार: केमिकल श्वास घेतल्यास पीडितेला ताक्काळ ताज्या हवेत न्यावे, श्वासोच्छ्वास थांबल्यास कृत्रिम श्वासोच्छ्वास लावा. बोटाने घशाच्या मागच्या बाजूला गुदगुल्या करून गिळल्यास उलट्या करा. भरपूर थंड पाण्याने डोळे स्वच्छ धुवा. दूषित त्वचा भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. वैद्यकीय लक्ष द्या.

फायटोटोक्सिसिटी: शिफारसीनुसार वापरल्यास गैर-फायटोटॉक्सिक

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणात्मक उपचार द्या.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: 1. रिकामा डबा तोडून वस्तीपासून दूर गाडला जावा किंवा जाळून टाकावा.

2. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. 3. पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि धुण्याची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावावी जेणेकरून पर्यावरण आणि जल प्रदूषण टाळता येईल.

स्टोरेज अटी: 1. कीटकनाशके असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर, वेगळ्या खोलीत किंवा आवारात साठवल्या जाव्यात किंवा कीटकनाशकाच्या स्वरूपावर आणि गुणवत्तेनुसार लॉक आणि चावीच्या खाली स्वतंत्र खोल्यांमध्ये/अल्मिरात ठेवाव्यात. 2. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे बांधलेले, चांगले प्रकाशित, कोरडे, हवेशीर आणि बाष्प/हवेने दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा आकाराचे असावेत. 3. कांद्याला फुलणे टाळा

रसायनिक संरचना :

फिप्रोनिल सक्रिय घटक	80.00 % भार/भार
सोडियम पॉली कार्बोक्सीलेट	2.90 % भार/भार
सोडियम डायोक्टाइल सल्फोस्किनेट 85%	1.90 % भार/भार
सिलिकॉन तेल इमल्शन	0.30 % भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	क्यु.एस. %
एकूण:	100.00% भार/भार

ಬಂಪರ್

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 80% ಭಾ/ಭಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ - ಕೀಟನಾಶಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 80% ಭಾ/ಭಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ 800 ಗ್ರಾಂ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ, ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೈಪ್ಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೈಪ್ಸ್.

ಉಪಯೋಗಗಳು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ			ಕೊಯ್ಲು ಮೈಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಪರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ (ದಿನಗಳು)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿಲಿ)	ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕು (ಲೀಟರ್)	
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಥ್ರೈಪ್ಸ್	40-50	50-62	750-1000	20
ಹತ್ತಿ	ಥ್ರೈಪ್ಸ್	60	75	375-500	14
ಅಕ್ಕಿ	ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಲೀಫ್ ಫೋಲ್ಡರ್	40-50	50-62.5	375-500	15
ಎಲೆಕೋಸು	ವೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪತಂಗ	75	93.75	500	15
ಈರುಳ್ಳಿ	ಥ್ರೈಪ್ಸ್	60	75	500	15

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ:

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ: ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು (ಸತ್ತ ಹೃದಯಗಳು) ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಫೋಲ್ಡರ್ (ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು) ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಭವದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 1-2 ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಜೇನುಸಾಕಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆ: ಕೈಯಿಂದ ಚಾಲಿತ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೊಳ್ಳಾದ ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕನ್ನು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. ತೆರೆದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ. ಹೂಬಿಡುವ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆಲಸ್ಯ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಡುಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸೆಳೆತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಗಾಬಾ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಬಲ್ಲವು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಬೆರಳಿನಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವ ಮೂಲಕ ನುಂಗಿದರೆ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು / ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಶುಷ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿ/ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

3. ಹೂಬಿಡುವ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ರಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ:

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ	80.00 % ಭಾ/ಭಾ
ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	2.90 % ಭಾ/ಭಾ
ಸೋಡಿಯಂ ಡಯೋಕ್ಟೈಲ್ ಸಲ್ಫೋಸ್ಕ್ಯೂಸಿನೇಟ್ 85%	1.90 % ಭಾ/ಭಾ
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಯಿಲ್ ಎಮಲ್ಷನ್	0.30 % ಭಾ/ಭಾ
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	ಕ್ಯೂಎಸ್. %
ಒಟ್ಟು:	100.00% ಭಾ/ಭಾ

பம்பர்

ஃபிப்ரோனில் 80% எ/எ டபல்யுஜ்ஜி - பூச்சிக்கொல்லி

எச்சரிக்கை: இணைக்கப்பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்களிலிருந்து மட்டுமே இது மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். மற்ற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

ஃபிப்ரோனில் 80% எ/எ டபல்யுஜ்ஜி ஃபார்முலேஷன் ஒரு கிலோ சூத்திரத்தில் 800 கிராம் ஃபிப்ரோனில் செயல்பட உள்ள மூலப்பொருளைக் கொண்டுள்ளது, ஃபிப்ரோனில் என்பது நெற்பயிரில் தண்டு துளைப்பான் மற்றும் இலை அடைப்பு, திராட்சைகளில் த்ரிப்ஸ், வெங்காயம் மற்றும் பருத்தியில் உள்ள த்ரிப்ஸ் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்த இலைவழித் தெளிப்பாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பூச்சிக்கொல்லியாகும்.

பரிந்துரைகள்:

பயிர்	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு அளவு			கடைசித் தெளிப்பில் இருந்து அறுவடை வரை காத்திருப்புக் காலம் (நாட்களில்)
		தீ.மூ. (தி.)	மருந்து (மி.லி.)	கரைக்கும் நீர் அளவு (லிட்டர்)	
திராட்சை	த்ரிப்ஸ்	40-50	50-62	750-1000	20
பருத்தி	த்ரிப்ஸ்	60	75	375-500	14
அரிசி	தண்டு துளைப்பான், இலை அடைப்பு	40-50	50-62.5	375-500	15
முட்டைக்கோஸ்	வைர முதுகு அந்துப்பூச்சி	75	93.75	500	15
வெங்காயம்	த்ரிப்ஸ்	60	75	500	15

பயன்பாட்டின் திசை:

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்: தண்டு துளைப்பான் (இறந்த இதயங்களின் தோற்றம்) மற்றும் இலை அடைப்பு (இலைகளில் வெள்ளை கோடுகள் தோன்றுதல்) தொடங்கியவுடன் முதல் தெளிப்பு மற்றும் நிகழ்வின் தீவிரத்தை பொறுத்து மேலும் 1-2 தெளிக்கவும்.

முன்னெச்சரிக்கை:

எச்சரிக்கை: தேனீ வளர்ப்பு பகுதிகளுக்கு அருகில் தயாரிப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்: கையால் இயக்கப்படும் நாப்சாக் தெளிப்பான் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஹாலோ கூம்பு அல்லது டிரிபிள் ஆக்ஷன் முனையைப் பயன்படுத்தலாம்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: இந்த தயாரிப்பைக் கையாளும் போது புகைபிடிக்கவோ அல்லது பான் அல்லது புகையிலையை மெல்லவோ வேண்டாம். வெளிப்படும் உடல் பாகங்களை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும்

கையாளுதல் மற்றும் சாப்பிடுவதற்கு முன் மது அருந்துதல் மற்றும் புகைத்தல். புக்கும் வெங்காயத்தில் பூசுவதை தவிர்க்கவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: அறிகுறிகள்: முக்கியமாக எரிச்சல், சோம்பல், தசை நடுக்கம் மற்றும் தீவிர நிகழ்வுகளில் வலிப்பு ஏற்படலாம். ஃபிப்ரோனில் மீளக்கூடிய G A B A ஏற்பி தடுப்பானாகும், மேலும் இந்த அறிகுறிகள் வெளிப்பாடு நிறுத்தப்பட்ட பிறகு மீளக்கூடியவை.

முதலுதவி: ரசாயனம் உள்ளிழுக்கப்பட்டால், பாதிக்கப்பட்டவரை உடனடியாக புதிய காற்றில் கொண்டு செல்லவும், சுவாசம் நிறுத்தப்பட்டால் செயற்கை சுவாசத்தைப் பயன்படுத்தவும். விரலால் தொண்டையின் பின்பகுதியில் கூச வைத்து விழுங்கினால் வாந்தியை தூண்டும். ஏராளமான குளிர்ந்த நீரில் கண்ணை துடைக்கவும். அசுத்தமான தோலை நிறைய சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். மருத்துவ கவனிப்பைப் பெறுங்கள்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி: பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி பயன்படுத்தும் போது பைட்டோடாக்ஸிக் அல்லாதது

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சை கொடுங்கள்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அகற்றுதல்: 1. காலியான கொள்கலன் உடைக்கப்பட்டு, குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது எரிக்கப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. 3. சுற்றுப்சூழலையும் நீர் மாசுபாட்டையும் தடுக்கும் வகையில் பொதிகள் அல்லது உபரிப் பொருட்கள் மற்றும் கழுவதல் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லிகள் அடங்கிய பொட்டலங்கள் தனி அறை அல்லது வளாகத்தில் சேமிக்கப்படும், மற்ற பொருட்களை சேமிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து விலகி அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின் தன்மை மற்றும் தரத்தைப் பொறுத்து தனி அறைகள் / அல்மிராக்களில் பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் வைக்கப்படும்.

2. பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமித்து வைப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டு, நன்கு வெளிச்சம், உலர், நன்கு காற்றோட்டம் மற்றும் நீராவி/காற்றால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு இருக்க வேண்டும்.

3. புக்கும் வெங்காயத்தில் பூசுவதைத் தவிர்க்கவும்

ரஸாயநிக் கலவை:

Fipronil செயலில் உள்ள மூலப்பொருள்	80.00 % எ/எ
சோடியம் பாலிகார்பாக்சிலேட்	2.90 % எ/எ
சோடியம் டையோக்டைல் சல்போஸ்குசினேட் 85%	1.90 % எ/எ
சிலிக்கான் எண்ணெய் குழம்பு	0.30 % எ/எ
சோடியம் லிக்னோசல்போனேட்	கே.எஸ். %
மொத்தம்:	100.00% எ/எ

બમ્પર્

ફિપ્રોનિલ 80% % ભા/ભા ડબલ્યુ.જિ. - જંતુનાશક

ખબરદારી: સાથે આપેલ હસ્તપત્રિકામાં ઉલ્લેખ કરેલ. પાકોમાટેજ એનો પ્રયોગ કરવું જોઇએ અન્ય કોઈપણ પાકોમાટે નહી.

ફિપ્રોનિલ 80% % ભા/ભા ડબલ્યુ.જિ. ફોર્મ્યુલેશનમાં 800 ગ્રામ ફિપ્રોનિલ સક્રિય ઘટક પ્રતિ કિગ્રા ફોર્મ્યુલેશનનો સમાવેશ થાય છે, ફિપ્રોનિલ એ એક જંતુનાશક છે જેનો ઉપયોગ ચોખામાં સ્ટેમ બોરર અને લીફ ફોલ્ડરના નિયંત્રણ માટે, દ્રાક્ષમાં થ્રીપ્સ, દુંગળી અને કપાસમાં થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે થાય છે.

ભલામણો:

પાક	જિંતામણનું સામાન્ય નામ	હેક્ટર દીઠ માત્રા			છેલ્લા છંટકાવથી લણણી વચ્ચેનો અંતરલ (દિવસોમાં)
		સ.ઘ. (ગ્રામ)	સંયોજન (મિલી.)	પાણીમાં દ્રાવ્ય (લી.)	
દ્રાક્ષ	થ્રીપ્સ	40-50	50-62	750-1000	20
કપાસ	થ્રીપ્સ	60	75	375-500	14
ચોખા	સ્ટેમ બોરર, લીફ ફોલ્ડર	40-50	50-62.5	375-500	15
કોબી	ડાયમંડ બેક મોથ	75	93.75	500	15
દુંગળી	થ્રીપ્સ	60	75	500	15

ઉપયોગની દિશા:

અરજીનો સમય:

સ્ટેમ બોરર (મૃત હૃદયનો દેખાવ) અને પાંદડાના ફોલ્ડર (પાંદડા પર સફેદ પટ્ટાઓ દેખાવા) શરૂ થાય કે તરત જ પ્રથમ છંટકાવ કરો અને ઘટનાની ગંભીરતાને આધારે 1-2 વધુ છંટકાવ કરો.

સાવચેતી:

સાવધાન: મધમાખી-ઉછેરના વિસ્તારોની નજીક ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન ઇક્વિપમેન્ટ: હેન્ડ ઓપરેટેડ નેપસેક સ્પ્રેયરની ભલામણ કરવામાં આવે છે. હોલો કોન અથવા ટ્રિપલ એક્શન નોઝલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

સાવચેતીઓ: આ ઉત્પાદન સંભાળતી વખતે ધૂમ્રપાન કરશો નહીં અથવા પાન અથવા તમાકુ ચાવશો નહીં. શરીરના ખુલ્લા ભાગોને સાબુ અને પાણીથી ધોવા પછી

સંભાળવું અને ખાવું તે પહેલાં પીવું અને ધૂમ્રપાન કરવું. ખીલેલી દુંગળી પર લાગુ કરવાનું ટાળો.

ઝેરના લક્ષણો: લક્ષણો: મુખ્યત્વે ચીડિયાપણું, સુસ્તી, સ્નાયુઓના ધ્રુજારીનો સમાવેશ થાય છે અને આત્યંતિક કિસ્સામાં સંભવતઃ આંચકી આવી શકે છે. ફિપ્રોનિલ ઉલટાવી શકાય તેવું GABA રીસેપ્ટર અવરોધક છે અને આ લક્ષણો એક્સપોઝર સમાપ્ત થયા પછી ઉલટાવી શકાય તેવું છે.

પ્રાથમિક સારવાર: જો રસાયણ શ્વાસમાં લેવામાં આવે તો પીડિતને તાત્કાલિક તાજી હવામાં લઈ જાઓ, જો શ્વાસ બંધ થઈ જાય તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ લાગુ કરો. આંગળી વડે ગળાના પાછળના ભાગે ગલીપચી કરીને ગળી જાય તો ઉલ્ટી થાય છે. પુષ્કળ ઠંડા પાણીથી આંખને ફ્લશ કરો. દૂષિત ત્વચાને પુષ્કળ સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો. તબીબી ધ્યાન મેળવો.

ફાયટોટોક્સિસિટી: જ્યારે ભલામણ મુજબ ઉપયોગ થાય છે ત્યારે બિન-ફાઇટોટોક્સિક

મારણ: કોઈ ચોક્કસ મારણ જાણીતું નથી. લક્ષણોની સારવાર આપો.

વપરાયેલ કન્ટેનરનો નિકાલ: 1. ખાલી પાત્રને ભાંગી નાખવું જોઈએ અને રહેઠાણથી દૂર દફનાવવું જોઈએ અથવા બાળી નાખવું જોઈએ. 2. વપરાયેલ પેકેજો તેમના પુનઃઉપયોગને રોકવા માટે બહાર છોડવામાં આવશે નહીં. 3. પેકેજ અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવાનો સલામત રીતે નિકાલ કરવો જોઈએ જેથી પર્યાવરણ અને જળ પ્રદૂષણ અટકાવી શકાય.

સ્ટોરેજની શરતો: 1. જંતુનાશકો ધરાવતાં પેકેજો અન્ય વસ્તુઓના સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઓરડાઓ અથવા પરિસરથી દૂર અલગ રૂમ અથવા પરિસરમાં સંગ્રહિત કરવા જોઈએ અથવા જંતુનાશકની પ્રકૃતિ અને ગુણવત્તાના આધારે લોક અને ચાવી હેઠળ અલગ રૂમ/અલમીરાહમાં રાખવામાં આવશે. 2. જંતુનાશકોનો સંગ્રહ કરવા માટેના ઓરડાઓ અથવા જગ્યાઓ સારી રીતે બાંધેલી, સારી રીતે પ્રકાશિત, સૂકી, સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ અને વરાળ/હવા સાથેના દૂષણને ટાળવા માટે પૂરતા પરિમાણના હોવા જોઈએ. 3. બ્લોસમિંગ દુંગળી પર અરજી કરવાનું ટાળો

રસાયનિક સૂત્રિકરણ:

ફિપ્રોનિલ સક્રિય ઘટક	80.00 % ભા/ભા
સોડિયમ પોલીકાર્બોક્સિલેટ	2.90 % ભા/ભા
સોડિયમ ડાયોક્ટીલ સલ્ફોસ્કુસીનેટ 85%	1.90 % ભા/ભા
સિલિકોન એમલ્શન	0.30 % ભા/ભા
સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ	ક્યુ.એસ. %
કુલ:	100.00% ભા/ભા