AALTARA

THIAMETHOXAM 25% W. G.

BROAD SPECTRUM SYSTEMIC INSECTICIDE

CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET"

Thiamethoxam 25% WG is broad Systemic Insecticide Insecticide having quick stomach and contact activity and is recommended for the use too control Stem Boter, Gall Melldge. Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BPH), White Backed Plant) Hopper (WBPH), Green Leaf Hoppe (GUH), thrips in Rice as well as Aphids, Jassids, Thrips and whiteffiles in Cotton. It contains 250g Thriamethoxam as an active ingrediant in a kg of the product (w/w). Application & Recommendaction for use : Thiamethoxam 25% WG is recommended for the contral of tollowing pests in Rice well as Cotton.

Crop	Common Name of pest	Dosage per Hacture g a.i.	Formul-ation (g.)	Dilution in water (Ltr.)	Watting Perion from last spray to harvest
Rice	Stem borer Gall Midge, Leaf Folder BrownPlant, Hopper (BPH) White Backed Plant Hopper (WBPH) Green Leaf Hopper, Thrips (On spray at 25-30 DAT in the earty stage of crop for control of early rice pests such as Stem Borer, Gall Mldge and the other spray at the booting leaf (50 to 55 DAT) forthe control of late rice pests such as GLH, BPH, WBPH etc.)	25	100	500-750	14
Cotton	Jassids Aphids, Thrips Whilefiles 50 (First Spray at 25-30 DAS or at he time of first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15 days interval depending on the pest intenslty.)	25 200	100 500-750	500-750 21	14

Directions for use : Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. Storage : 1. The packages containing the insecticides should bestored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articlos of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well bulit, dry. well lit and ventillated and of sufficient dimensine to avoid contamination with vapour. Precautions : Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear prctective clothing, mask, goggles, boots, white spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensllls with water daily ofter use. Wash hands with soap and penty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminaated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc by disucharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc., in them. Dot not spray when bees are active. When used at recommended dosages. no adverse effect on wildlife is expected. In case of any sign of poisoning immediately consult the doctor. Disposal of empty containers : 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental & water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buned away from habitation. Poisoning Symptoms : Poisoning may cause symptoms of decrease in spontaneous movement, tonic convolsion and ptosis. First Aid : Romove the aftected person from the danger zone to a well ventilated room or to fresh air, and protect from undercoling. IN CASE OF SUSPECTED POISONING : Remove contaminated clothin and thorougnly wash the affected parts or the body with soap and water. IN CASE OF EYE CONTACT : Rinse eyes with clean water for sever..... IN CASE OF INGESTION : Repeatedly administer mediclal charcoal in a large quantity of water. NOTE : Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. Antidote : No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Chemical Compotion :

Thiamethoxam a.i.	: 25.00% w/w
Dispersing Agent : sodium Lignosulphate	: 5.00% w/w
Wetting Agent Sodium Lauryl Sulphate	: 3.75% w/
Plasticiser : Butylated polyvinyl pyrrolidione	: 1.25% w/w
Carrier Diatomaceous earth	: 5.00% w/w
Binder com starch	: 60.00% w/w
Total	: 100.00% w/w

అల్‌తార

థయోమిథాగ్జమ్ 25% డబ్ల్యు. జి.

విస్తృత వ్యాప్తి చర్యగల కీటకనాశని

హెచ్చరిక : ఈ కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

థయోమిథాగ్జమ్ 25% డబ్ల్యుజి వివిధ రకములైన చర్యగల కీటకనాశని. ఇది దీని స్పర్శ ద్వారాను మరియు పేరుగా కీటకములోని చొచ్చుకొని పోయి పని చేయుగల స్వభావముగలది. ఇది కాండము తొలుపుపురుగు, ఉల్లికోడు, ఆకుముడత, దోమపోటు (WBPH), పచ్చదోమ (GLH), పరిదోమ ప్రత్తిలో పచ్చ నేమటంక, పచ్చదోమ, (థ్రిప్స్ మరియు తెల్లదోమలను అరికట్టుటకు సిఫారసు చేయబడినది. ఒక కేజి యొక్క ఈ ఉత్పత్తి (డబ్ల్యు/డబ్ల్యు) 250 గ్రా. థయోమిథాగ్జమ్ పక్రియ పదార్థముగా ఉన్నది. వాడకము మరియు దాని సిఫారసులు : క్రింది తెలిపినటుల వంటి వరి, ప్రత్తి పంటలలో పచ్చ కీటకములను అరికట్టుటకు 25 డబ్ల్యుజి సిఫారసులు చేయబడినది.

పంట	కీటకమును సామాన్యముగా పిలిచే పేరు	హెక్టారుకు మోతాదు న.మ. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (గ్రా.)	కరిగించుటకు (లీటర్లు)	ఆఖరి స్ప్రేకు తర్వాత పంట నీరు కాలము వరకు వేచి వుండవలసిన సమయము
వరి	కాండము తొలుచు పురుగు ఉల్లికోడు, ఆకుముడత సుడిదోమ (BPH) తెల్లదోమ (WBPH), పచ్చదోమ వరినేమ (నారు నాటిన 25-30రోజుల తర్వాత తొలిదశ వరిలోపచ్చనుటువంటి కాండము తొలుచు, గాల్మిడ్జెలను అరికట్టుటకు స్ప్రేచేయవలెను. తర్వాత ఆకులు పచ్చనుటు వంటి దశలో (నాటిన 50 - 55 రోజుల తర్వాత) వరిలో పచ్చనుటువంటి ఆకుపచ్చని ఆకుపురుగు, గోధుమరంగు దోమపోటు, తెల్లమచ్చులు గల దోమపోటులను మొదటగు వాటిని నివారుంచుటకు సిఫారసు చేయబడినది.	25	100	500-750	14
ప్రత్తి	దీపపు పురుగు నేమ బంక థ్రిప్స్-ముడత పురుగు తెల్లదోమలు (మొక్క వాడిన 25 -30 రోజుల తర్వాత లేక కీటకములు కనబడిన వెంటనే స్ప్రే చేయవలెను మరియు తిరిగి 15రోజులవ్యవధినిస్తూ కీటకముల యొక్క తీవ్రతను బట్టి 2-3 సార్లు స్ప్రే చేయవలెను.	25 50	100 200	500-750 500-750	14 21

వాడువద్ధతి : సరియైనంత పరిమాణంలో మందు తీసుకొని కొద్దిపాటి నీటితో బాగా కలుపవలెను. ఆ తర్వాత పైన తెలిపిన విధంగా నీటిని తీసుకొని బాగా కరిపి పంట పూర్తిగా సమానంగా స్ప్రే చేయుటకు తగిన స్ప్రేయరును వాడి స్ప్రే చేయవలెను. నిలవ : 1 ఈ కీటకనాశనిగల ప్యాకేజీలను వాటి యొక్క అసలైన ప్యాకులందు మాత్రమే వుంచి యితర పదార్థములకు అంటే మరి ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థములకు లేదా పశువుల దాణా నిల్వచేసే గదులు లేదా అవరణాలల్లో గాకుండా వేరయేరు గదులు లేదా అవరణాలల్లో పెట్టి తాళంచేసి ఉంచి మాత్రమే ఉంచాలి. 2. వీటిని నిల్వచేసే గదులు లేదా అవరణాలు నుంచి గట్టి కట్టడములైన, విశాలంగా, పొడిగా, మంచిగాలీ, వెలుతురు ప్రవరించేలా వుండాలి, తద్వారా దీని అవిరివల్ల పరిసరాలు, నీరు కలుషితం కాకుండా కాపాడుగోవచ్చు. మందు జాగ్రత్తలు : స్ప్రే ద్రావణమును తయారు చేయుటకు వంటపాత్రలు వాడరాదు. స్ప్రే ద్రావణమును కలుపుటకు కర్రను వాడవలెను. చర్మమునకు అంటుకొనకుండా చేతి తొడుగులు వేసుకొనవలెను. రక్షణవిచ్చు దుస్తులు, మూతిమసుగును, కళ్ళద్దాలు, బూట్లు ధరించవలెను. స్ప్రే తుంపరలు మీద పడకుండా జాగ్రత్త వహించ వలెను. స్ప్రేయరు యొక్క నాజిల్‌ను నోటితోఊదరాదు. దీనిని వాడునప్పుడు ఏదైన తినడం, త్రాగడం లేక పొగత్రాగడం చేయరాదు. మిగిలిపోయిన పదార్థమును నిల్వ యుంచ రాదు. వాడిన తర్వాత స్ప్రేయర్లను, బకెట్లను మరియు ఇతర సామాన్లను నీటితో శుభ్రం చేయవలెను. చేతులను సబ్బురుదుల్ల ఎక్కువ నీటితో శుభ్రంచేయవలెను. మరియు స్ప్రే చేసిన వెంటనే దుస్తులను మార్చుకొనవలెను. ఇంకను కలుషితమైన బట్టలను శుభ్రం చేయవలెను. మిగిలిపోయిన స్ప్రే ద్రావణమును లేక స్ప్రేయర్లను, శుభ్రంచేసే వాటిని కలుషితము చేయరాదు. తేనెటీగలు తిరుగు ప్రదేశములందు స్ప్రే చేయరాదు. సిఫారసు చేయబడిన మోతాదులలో వాడిన యెడల వన్యప్రాణులకు ఎటువంటి హాని కలుగదు. ఒకవేళ ఏదైన విషలక్షణాలు కనబడిన తెలిసి వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి. ఖాళీ డబ్బాల పారవేయుట : 1. ప్యాకేజీలు లేక మిగిలిపోయిన మందు పదార్థములు మరియు యంత్రములు, మందుడబ్బాల యొక్క కడుగునీరు పరిసరములు లేక నీటివనరులు కలుషితము కాకుండా నివారించుటకై ఒక సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలెను. 2. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏవిధంగాను వాడరాదు. కనుక వాటిని బయట వదిలి పెట్టారాదు. 3.ఖాళీ డబ్బాలను ధ్వంసంచేసి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టవలెను. విష లక్షణాలు : దీని వలన కళ్లే విషలక్షణాలు లేమంటే తనమంతటతను సరిగ్గా కదల లేక పోవడం, తండాలా ఉగట్టిగా చిగు సుకుపోవడం, పై కనురెప్పు మూసుకుపోవడం. ప్రథమ చికిత్స : రోగిని అపాయకరమైన స్థలమునుండి బాగా గాలి వెలుతురుగల చోటికి లేక ఆరు బయటకు తరలించి రక్షణ కల్పించండి. ఒకవేళ విషలక్షణాలు కనబడినయెడల వెంటనే వైద్యుని సలహాంచండి. ఒకవేళ పర్యవసునకు అంటుకొనిన యెడలు ధూళితమైన బట్టలను తీసివేసి మరియు ఆ శరీర భాగములను సబ్బు రుద్దుతు నీటితో శుభ్రం చేయండి. ఒక వేళ కండ్లకు అంటుకొనిన యెడల మంచి నీటితో ఎక్కువసేపు కండ్లను కడగండి. ఒక వేళ మింగినట్లయితే మెడిసినల్ చార్‌కోల్‌ను ఎక్కువ నీటితో కరిపి ఇవ్వండి. గమనిక : మనిషిస్పృహలో లేని యెడల ఎటువంటి పరిస్థితులలోను నోటి ద్వారా ఏమి ఇవ్వరాదు. వాంతి అగుటకు ప్రేరేపించరాదు. విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన విరుగుడు కనుగొనబడలేదు విషలక్షణాలు బట్టి చికిత్స ఇవ్వవలెను.

రసాయన మిశ్రణము :

థయోమెథాక్సమ్ స.ప.	: 25.00% భా/భా
డస్పర్సింగ్ ఏజంట్ : సొడియం లిగ్నిసల్ఫేట్	: 5.00% భా/భా
వెటింగ్ ఏజంట్ : సొడియం లారిల్ సల్ఫేట్	: 3.75% భా/భా
ప్లాస్టిసైజర్ : బుటిలేటెడ్ పాలివినిల్ పిరోలిడిన్	: 1.25% భా/భా
క్యారియర్ : డయటామెషియస్ ఎర్త్	: 5.00% భా/భా
బైండర్ కం స్టార్చ్	: 60.00.% భా/భా
మొత్తం	: 100.00% భా/భా

अलतार

थायामेथोक्साम २५%डब्ल्यू.जी.

बहुपयोगी अंतर्प्रवाही कीटनाशक

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

थायोमेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी थियामेक्स एक बहुपयोगी अंतर्प्रवाही कीटनाशक है जो तीव्र उदरीय तथा संस्पर्शी क्रियाशील रखता है तथा इसकी सिफारिश धान की फसल पर लगने वाले तना छेदक, माजू मक्खी, पत्ती मोडक, भूरा पौध टिड्डा, सफेद पीट वाला पौध टिड्डा, हरा पौध टिड्डा,चुरदा एवं कपास की फसल के माहू, तेला, चुरदा तथा सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए किया जाता है । इसमें उत्पादन के प्रति किलो (व/व) में २५० ग्राम थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व के रूप में है ।

इस्तेमाल का तरीका तथा सिफारिश की गयी मात्राएं: थियामेक्स की सिफारिश धान तथा कपास के निम्नलिखित कीटों की रोकथाम के लिए की जाती है ।

फसल	कीटों का सामान्य नाम	प्रति हेक्टर मात्रा सक्रिय तत्व (ग्राम)	दवा की मात्रा (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिडकाव और फसल कटाई के बीच की प्रतीक्षा अवधि
धान	तना छेदक माजू मक्खी, पत्ती मोडक भूरा पौध टिड्डा सफेद पीट वाला पौध टिड्डा हरा पौध टिड्डा, चुरदा (रोपाई के २५ - ३० दिनों बाद एक छिडकाव फसल पर आने वाले धान के शुरुआती कीटों जेसे कि तनाछेदक, माजू मक्खी आदि की रोकथाम के लिए तथा दूसरा छिडकाव छोटी पत्ती अवस्था (रोपाई के ५० से ५५ दिनों बाद) धान की फसल पर बाद की अवस्था में आनेवाले कीटों जेसे कि हरा पत्ती टिड्डा, भूरा पौध टिड्डा, सफेद पीट वाला पौध टिड्डा इत्यादि की रोकथाम के लिए करें ।)	२५	१००	५००-७५०	१४
कपास	तेला माहो, चुरदा सफेद मक्खी	२५ ५०	१०० २००	५००-७५० ५००-७५०	२१ २१

(पहला छिडकाव बुआई के २५ - ३० दिनों के बाद पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद २ - ३ छिडकाव १५ दिनों के अंतर से कीटों की मौजुदगी के आधारपर ।)

इस्तेमाल हेतु निर्देश : कीटनाशक की आवश्यक मात्रा को माप कर पहले थोडे से पानी में मिलाएं । उसके बाद पानी की निर्धारित मात्रा मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल लें तथा किसी उपयुक्त स्प्रेयर की मदद से पूरी फसल पर छिडकाव करें । सावधानियाँ : स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए । स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकडी का प्रयोग करें । त्वचा को स्पर्श से बचाने के लिए दस्ताने पहने । सांस के साथ अंदर लेने और आंखों के सम्पर्क से भी बचे । स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपडे, मास्क, चश्मा, जूते आदि पहने, तथा स्वयंको स्प्रे की फुहार के सामने न आएं । नोजल में मुंह से फूक न मारे । उत्पाद को उठाते, रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नही करना चाहिए । इस्तेमाल न किए गए स्प्रे घोल का संग्रहण मत कीजिए । प्रतिदिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर, बाल्टियों तथा अन्य वर्तनों को पानी से धोएं । कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ढेर सारे पानी से धोइए । बची हुई स्प्रे सामग्री को झरनों, तालाबों, नहरों आदि में बहाकर या स्प्रेयर्स, दूषित बाल्टियों आदि को उनमें धोकर उनको दूषित मत कीजिए । यदि मधुमक्खियां सक्रिय हों तो स्प्रे मत कीजिए । सिफारिश की गई मात्रा में प्रयोग किये जाने पर वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नही है । यदि विष चढने का कोई भी चिन्ह दिखआई दे तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें । जहर चढने के लक्षण : विष के लक्षण से शरीर में ढीलापन, मिर्गी जेसेबझटके और पुटोसिस हो सकते हैं । प्राथमिक उपचार : प्रभावित व्यक्ति को खतरे की जगह से हटाकर किसी हवादार कमरे या ताजी हवा में ले जाएं तथा अधिक ठंडे पडने से बचाएं । जहर चढने का शक होने पर : तुरन्त डॉक्टर को बुलाएं । त्वचा में लगने पर :प्रदूषित कपडों को उतार दें तथा शरीर के जिन हिस्सों पर लग गया हो, उन्हें साबुन और खूब पानी से अचछी तरह धोएं । आंखों में चले जाने पर : आंखों को स्वचछ पानी से कई मिनटों तक छपछपाइए । पेट में चले जाने पर : मेडिसिनल चारकोल को खूड पानी के साथ बार - बार दें । नोट : बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ न दें । उल्टी कराने की कोशिश न करें । प्रतिविष : कोई विशेष प्रतिविष ज्ञात नही । लक्षणों के अनुसार उपचार करें । भण्डारण : १. कीटनाशक के डिब्बे अलग जगह रखें जहाँ पर कोई और वस्तु खास तौर पर खाने की वस्तु न रखी हो या कीटनाशक की मात्रा (परिमाण) या प्रकार के अनुसार किसी अलगअलमारी में ताले के अंदर रखिये । २. भण्डारण की जगह मजबुत बनावट की, खुष्क, रोशनी और हवादार होने के साथ साथ काफी खुली होनी चाहिए ताकि जहरीली हवा असर न कर सके । खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बे बचा हुआ घोल तथा स्प्रे आदि की धुलाई का पानी सुरक्षित तरीके से नष्ट करें ताकि वातावरण दूषित न हों । २. खाली डिब्बे बाहर न फेंके ताकि उसका दुबारा उपयोग न हो सके । ३. खाली डिब्बों को जलाकर, काटकर, या बस्ती से दूर जमीन में गाड कर नष्ट कर दें । जिम्मेदारी अस्वीकार : इस दवाई के उपयोग के तरीके उत्पादक के तत्कालीन प्रयोगों पर आधारित है । कई बातें जेसे कि मोसम, भूमि का आकार, पोधे की किस्म, उनकी विरोधात्मक शक्ति, छिडकाव विधि आदि दवाई के असर पर प्रभाव डाल सकती है । चूंकि इस उत्पादन के इस्तेमाल पर हमारा नियंत्रण नही है इसलिए उत्पादन में एकरुप गुणवत्ता कायम रखने की जिम्मेदारी के अतिरिक्त और कोई भई जिम्मेदारी स्वीकार करने में असमर्थ है । हमारी कीटनाशक दवा हमारी सीलबन्द पैकिंग में खरीदने पर ही निर्माता की ओर से उसकी गुणवत्ता की गारंटी है ।

रासायनिक संरचना :

थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व	: २५.००% भार/भार
छितरानेवाले तत्व-सोडियम लिग्नोसलफोनेट	: ५.००% भार/भार
गीले होने वाले तत्व सोडियम लॉरिल सल्फेट	: ३.७५% भार/भार
प्लास्टिसायजर ब्यूटीलेटेड पॉल विनाइल पायरोलिडॉन	: १.२५% भार/भार
संवाहक डायएटोओमेशिअस मिट्टी	: ५.००% भार/भार
बाईन्डर कॉर्न स्टार्च	: ६०.००% भार/भार
कुल	: १००.०००% भार/भार

AGASTYA

AALTARA

THIAMETHOXAM 25% W. G.

BROAD SPECTRUM SYSTEMIC INSECTICIDE

అల్‌తార

థయోమిథాగ్జమ్ 25% డబ్ల్యు. జి.

విస్తృత వ్యాప్తి చర్యగల కీటకనాశని

अलतार

थायामेथोक्साम २५%डब्ल्यू.जी.

बहुपयोगी अंतर्प्रवाही कीटनाशक

ಅಲ್‌ತಾರ

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಜಿ.

ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೀಟನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಜಾಗ್ರತೆ ಅಪಾಯ DANGER

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured by :

AGASTYA AGRO LIMITED

UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally -501 401 Medchal Dist.,Telangana State.

Mfg No: 027/TS-IML/2017 (Old Lic. no:220/1997-98, Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Tooprapet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.

Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company

Customer Care Manager No.: 040-64576958

E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Regd. No. CIR-48,152/2004-Thiamethoxam (WG)(242)-100

अलतार

थायामेथॅक्झाम २५% डब्ल्यू जी

बहुगुणपर्मीय आंतरप्रवाही कीटकनाशक

खबरदारी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर वापरा उपयोग करू नये.

थायामेथॅक्झाम २५% डब्ल्यू जी हे बहुगुणपर्मीय आंतरप्रवाही कीटकनाशक असून, तात्काळ पोटविष व स्पर्शसन्य क्रिया करते. भातावरील स्पशेडकिडा, गाटमाशी, पाने गुंडाळणारी अळी, तपकिरी, पाढऱ्यापाठीचे च हिरवे तुडतुडे, फुलकिडे तसेच कपासीवरील मावा, तुडतुडे फुलकिडे च पांढरी माशी वा ताठी शिफारस केली आहे. एक किलोग्रॅम उत्पदनामध्ये २५० ग्रॅम (डब्ल्यू/डब्ल्यू) इतक्या प्रमाणात थ्रामामेथक्झाम हा क्रियाशील घटक असतो. फवारणी आणि वापरासंबंधीने सूचना : थायामेथॅक्झाम २५% डब्ल्यू जी बी ची भात व कपाशीच्या पिकांवरील खालील कीटकांना आळा घालण्यासाठी शिफारस कारण्यात येते.

पीक	कीटकाचे नेहमीचे नाव	क्रि.घ. ग्रॅ.	द्रावण ग्रॅ.	द्राचक पाणी (लिटर्म)	शेचटच्या फवारणीपासून कापणईपर्यतचा कालावधी (दिवस)
		दर हेक्टरी मात्रा			
भात	खोडकिडा	२५	१००	५००-७५०	१४
	गादमाशई				
	पाने गुंडाळपाणी अळी				
	तपकिरी तुडतुडे				
	पांढऱ्या पाठीचा तुडतुडे				
	हिरवा तुडतुडे				
	फुलकिडे				
	पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत आढळणाऱ्या खोडकिडा, गादमाशी वगैरे कीटकाना आळा घालण्या साठी रोपणीनंतरच्या २५-३० दिवसांनी एक फवारणी व पिकाच्या नंतरच्या अवस्थेत (फुटवे फुटताना) दुमरी फवारणई (रोपणी नंतरच्या ५०-५५ दिवसांनी) हिरवे, तपकिरी व पांढऱ्या पाठीचे तुडतुडे यांना आळा घालण्यासाठी करावी.				
कापाशी	तुडतुडे	२५	१००	५००-७५०	१४
	मावे				
	फुलकिडे				
	पांदरी माशी	५०	२००	५००-७५०	२१
	(पेरणी नतरच्या २५-३० दिवसांनी पहिली फवारणी कीटक प्रभव दिसू लागल्यानंतर व नंतरच्या २-३ फवारण्या २५ टिक्सांस्या अंतगने कीटकांच्या प्रमाणाचर)				

**वापारासंबंधी सूचना : आवश्याक तितकी कीटकनाशकाची मात्रा मोचून घ्या व ती थोडच्या पाण्यात नीट मिमळा. उरलेले पाणी नंतर घालून व्यवस्थित ढवळा. सेयिस्कर फवारणी यंत्राने पिकावर संपूर्ण आच्छादक फवारणी करा. साठवण : १. कीटकानाशकाची पॅकेजिस् मूळ कंटेनर्ससध्ये स्वतंत्र खोल्या अगर वास्तूंमध्ये, इतर वस्तू विशेषत: खद्य-पदार्थ साठविण्याच्या खोल्या अगर वस्तूंपासून दूर, अगर स्वतंत्र कपाटांमधून कडीकुलुपात ठेववीत. २. कीटकनाशके साठवण्यारच्या खोल्या अगर वास्तू पक्क्या बांधणीच्या, कोरड्या, भारपूर प्रकाशाच्या वखेळत्या हचेच्या तसेच कीटकनाशकाच्या वापेचा संसर्ग होऊ नये म्हणून पुरेश मोजमापाच्या असाव्यात. सावधगिरी : फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वायरू नयेत. फवारणीचे द्रावण ढवळण्यासाठी काठी वापरावी. त्वचेशी संपर्क टाळण्यामाठी हातमोजे वापरावेत. श्वासावाटे हुंगणे व डोळ्यांशी संपर्क टाळावा. मुखवटा, गॉगल्स, बूट आणि संरक्षक कपडे फवारणी करताना वापरावे व फवारणीचे तुषार अंगावर यऊ देऊ नये. नोझल तोंडने फुंकू नये. उत्पादन हाताळताना अगर वापरताना खाऊ, पिऊ किंवा धूम्रपान करू नये. न वापरलेले फवरणीचे द्रावण साठवून ठेवू नये. फवारणी यंत्रे, वादल्या व इतर भांडी वापरल्यानंतर रोज पाराने स्वच्छ धुववीत. काम संपल्यावर हात सावण व भरपूर पाण्याने धुवावंत आणि कपडे बदलावेत. संसर्ग झालेले कपडे. देखील धुवाचेत . तळी, डबकी अगर जलप्रवाहांमध्ये फवारणीचे उरलेले द्रावण टाकून अगर त्यात फवालीयंत्रे वादल्या वगैरे धुवून पाणी प्रदूषित करू नये मधमाशा क्रियाशील असताना फवारणी करू नये. शिफारस केलेल्या मात्रेत वापर केलाअसता वन्य जीवांवर / प्राण्यांदर घातक परिणाम अपेक्षित नाही. विषबाधेची चिन्हे आढळल्यास ताबडतोच डॉक्टारंचा सल्ला घ्या. रिकाम्या डब्यॉची विल्हेवाट : १. पॅकेजेस किंला जादा साहित्य आणि मशीन्स धुतलेलं पाणी आणि डबे यांची विलेहेवाट पर्यावरण किंण पाण्याचं प्रदूषण होणार नही अशा प्रकारे केली पाहिजे. २. पुनर्वापर टळावा महणून वापरलेली पॅकेजिस् उघड्यावर टाकू मयेत. ३. पॅकेजिस् मोडून-तोडून चस्तीपासून दूर पुरावीत. विषबाधेनी लक्षणे : विषबाधेमुळे उत्स्फूर्त हालचालीमध्ये घट, स्नायूंना झटके व अवयवची स्थानभ्रष्टता वगैरे लक्षणे उद्‌भवू शकतात. प्रथमोपचार : संसर्ग वालेल्या व्यक्तीस धोकादाराक क्षेत्रायासून दूर मोकळ्या हकेशीर खोलीत अगर मोकळ्या हकेत न्यावे आणि सरीर गार पहू देउ नये विषपायेग संशय आल्यास : ताबडतोब डॉक्टरना बोलवावे. त्वचेशी संपर्क झाल्यास : संसर्ग झालेले कपडे काढून शरीराचा संसर्ग झालेला भाग साबण व पाणी यांनी धुवावा. डोळ्यांशी संपर्क आल्यास : कित्यंक मिनिटे डोळं पाण्याने खळखळून धुवावेत. गिळले गेल्यास : औषधी कोळसा भरपूर पाणयातून पुन्हा पुन्हा द्यावा. सूचना : शुद्ध हरपलेल्या व्यक्तीस तोंडायाटे काहीही कधीही देऊ नयें. उलटी काढू नये.

रासायनिक संरचना :

थियामेथोक्झॅम ए.आय.	: २५.००% व/व
विखरावकारक : सोडीयम लिग्नोसल्फेट	: ५.००% व/व
आर्द्रताकारक-सोडीयम लॉरिल सल्फेट	: ३.७५% व/व
ल्यॉस्टी-सायझर-बुटीलेटेड पॉलीविनिल पायरोलिडीओन	: १.२५% व/व
वाहक डायाटोमॅशियस माती	: ५.००% व/व
बंधक वजाखळ	: ६०.००% व/व
एकूण	:१००.००% व/व

ஆல்டாரா

தியாமெத்தோக்ஸாம் 25% WG

பிராட்ஸ்பெக்ட்ரம் பூச்சிக்கொல்லி

எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பயிர்களிலிது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

தியாமெத்தோக்ஸாம் 25% WG என்பது ஒரு பிராட்ஸ்பெக்ட்ரம் சிஸ்டமிக் பூச்சிக்கொல்லி ஆகும், இது விரைவாக பூச்சிகளின் இரைப்பையை அடைந்து தொடுசெயல் மூலம் செயல்படுகிறது மற்றும் இது நெல் பயிரில் காணப்படும் தண்டு துளைப்பான், கால் மிட்ஜ், இலை மடிப்பான், பழுப்பு நிற தத்தும் பூச்சிகள் (பிபிஎச்)(BPH), ஒயிட் பேக்ட் பிளாண்ட் ஹோப்பர் (WBPH), கரீன் லீஃப் ஹோப்பர் (GLH), அசுவினிகள் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இதன் 1 கிலோ பொருளில் (W/W) 250கிராம் தியாமெத்தோக்ஸாம் ஆக்டிவ் மூலகப் பொருளாகக் கொண்டுள்ளது.

பரிந்துரை

பயிர் (பயிர்கள்)	பூச்சியின் பொதுவான	பெயர் A.I.(gm)	டோஸேஜ்/ஹெக்டே ∴பார்முலேசன் செய்வது காத்திருக்கும்	(gm) (லிட்டர்) முதல்	நீர்க்கச் கடைசி ஸ்ப்ரே அறுவடைவரை காலம்	(நாட்களில்)
நெல்	நெல் பயிரில் முதலில் தோன்றும் தண்டு துளைப்பான், கால் மிட்ஜ், இலை மடிப்பான், ஒயிட் பேக்ட் பிளாண்ட் ஹோப்பர்,	25	100	500-750	14	
கரீன்	லீஃப்ஹோப்பர், அசுவினிகள் (உழுத 25-30 நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு ஸ்ப்ரே) இலை துளிர் விடும் காலத்தில் (உழுத 55 நாட்களுக்குப் பிறகு) GLH, BPH, WBPH போன்ற பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு)					

உபயோகிப்பதற்கான குறிப்பு தேவைப்படும் மருந்தினை அளந்து எடுத்துக் கொள்ளவும் மற்றும் அதைச் சிறிதளவு தண்ணீருடன் நன்கு கலக்கவும். மீதமுள்ள தண்ணீரைக் குறிப்பிட்டபடி நன்கு கலக்கிச் சேருங்கள். உரிய ஸ்ப்ரேயர் கொண்டு மொத்தப் பயிர் முழுவதையும் கவர் செய்யும் வகையில் ஸ்ப்ரே செய்யுங்கள். ஸ்ப்ரே கருவி: நாப்சேக் ஸ்ப்ரேயர், ∴புட் ஸ்ப்ரேயர், கம்ப்ரஷன் நாப்சேக் ஸ்ப்ரேயர், கம்ப்ரஷன் நாப்சேக் பேட்டரி ஸ்ப்ரேயர், பேட்டரியினால் இயங்கும் Kuvar ஸ்ப்ரேயர் மற்றும் ASPEE-HTP பவர் ஸ்ப்ரேயர் ஆகியவை. முன்னெச்சரிக்கை 1. உணவுப் பொருட்கள், கால்யான உணவுப் பொருள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவுகளில் இருந்து இந்த மருந்துகளை எட்டாத இடத்தில் வைப்புங்கள். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலில் மருந்து படாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் 3. ஸ்ப்ரே துகளை சுவாசிக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். காற்றின் திசையோடு ஸ்ப்ரே செய்யுங்கள். 4. மருந்து தெளித்த பிறகு மருந்து பட்ட துணிமணிகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு கழுவுங்கள். 5. ஸ்ப்ரே செய்யும் பொழுது புகை பிடிக்காதீர்கள், சாப்பிடாதீர்கள் மற்றும் எதையும் மெல்லாதீர்கள். 6. மருந்தினைக் கலக்கும் பொழுது மற்றும் ஸ்ப்ரே செய்யும் பொழுது உடலை முழுவதுமாகப் கவர் செய்து, பாதுகாக்கின்ற உடையை அணிந்திருங்கள். விஷ அறிகுறிகள் உடனடி அசைவில் குறைவு, டோனிக் கன்வெல்சன், டோசிஸ் நேர்ந்திருக்கலாம். முதல் உதவி 1. மருந்தை விழுங்கியிருந்தால், தொண்டையின் உட்பறுதத்தை விரல்களால் வருடி வாந்தி எடுக்கத் தூண்டுங்கள். எடுக்கும் வாந்தி தெளிவாக இருக்கும் வரை திரும்பத் திரும்ப அதைச் செய்யுங்கள். நோயாளி சுயஉணர்வு இல்லாதிருந்தால், வாந்தி எடுக்கச் செய்ய வேண்டாம். 2. உடை மற்றும் தோலில் மருந்து பட்டிருந்தால், உடைகளை அகற்றவும் மற்றும் தோலில் மருந்து பட்ட இடத்தை நன்கு சோப் போட்டு நிறைய தண்ணீர் கொண்டு கழுவுங்கள். 3. கண்களில் மருந்து பட்டிருந்தால், நிறைய உப்புக்கரைசலால்/சுத்தமான தண்ணீரால் சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு கண்களைக் கழுவுங்கள். 4. மருந்துத் துகளை சுவாசித்து விட்டால், நல்ல காற்றோட்டமான இடத்திற்கு அவரை அகற்றுங்கள். விஷமுறிவு மருந்து விஷமுறிவு மருந்து எதுவும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சை செய்யுங்கள். உபயோகப்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துவது 1. சுற்றுச் சூழல் மாசுபடாமலும் நிலத்துடி தண்ணீர் மாசுபடாமலும் ஒரு பாதுகாப்பான முறையில் அந்த காலியான மருந்துப் பொட்டலங்களையும் அல்லது தேவைக்கு மேல் இருக்கும் மருந்தையும் மற்றும் ஸ்ப்ரே மெஷின்கள் மற்றும் கொள்கலன்களைக் கழுவிய நீரையும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய பொட்டலங்களை மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும் வகையில் அப்படியே வெளியில் போட்டு விடக் கூடாது. 3. அந்த காலியான மருந்துப் பொட்டலங்களை நசுக்கி, குடியிருப்புப் பகுதிக்கு அப்பால் புதைக்க வேண்டும். சேமிப்பு நிலைகள் 1. பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கொண்ட பொட்டலங்களை அதன் ஒரிஜினல் கொள்கலன்களில், தனி அறைகளில் அல்லது பிற பொருட்கள் உள்ள இடங்களுக்கு அப்பால், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்களைச் சேமிக்கும் அறைகளுக்கு அப்பால், பூட்டு சாவி வசதி உள்ள தனி அலமாரிகளில் வைத்து சேமிக்கப்பட வேண்டும். 2. இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளைச் சேமிக்கும் அறைகள் அல்லது இடங்களாவைவை நன்கு கட்டப்பட்டதாக, ஈரப்பதமில்லாமல் வறட்சியான, நன்கு வெளிச்சமுள்ள மற்றும் காற்றோட்டமான இடமாகவும், காற்றில் மருந்தின் ஆவி பரவாமல் இருக்கும் வகையில் போதிய இட வசதி உள்ளதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயனக் கலவை :

தியாமெதாக்ஸம் ஏ.ஐ.	: 25.00% எ/எ
பாவுப்பொருள் : சோடியம் லீக்னோ சல்பேட்	: 5.00% எ/எ
நனைப்புப் பொருள் : சோடியம் லாரைல் சல்பேட்	: 3.75% எ/எ
பூசுபொருள் : பூடிலேடட் பாலிவினைல் பிரோலிடையோன்	: 1.25% எ/எ
கடத்துப்பொருள் : டயாடோமேசியஸ் எர்த்	: 5.00% எ/எ
மாவுப்பொருள் மற்றும் பசைப்பொருள்	: 60.00% எ/எ
மொத்தம்	: 100.00% எ/எ

અલતાર

થાયૉમીથૉક્ઝામ ૨૫% ડબ્લ્યુ. જી. તીવ

આસર ધરાવતું આંતરપ્રવાહી જંતુનાશક

ખબરંદારી: સાથે આપેલ હસ્તપત્રિકામાં ઉલ્લેખ કરેલ. પાકોમાટેજ એનો પ્રયોગ કરવું જોઈએ અન્ય કોઈપણ પાકોમાટે નહી.

થાયૉમીથૉક્ઝામ ૨૫% ટબ્લુજી જેસર અને સ્પર્શજન્ય આસર ધરાવતુ આતરપ્રવાહી જંતુનાશક છે અને તેની મલામણ ગ્રામભારાની ઇપળ, ગાંઠિયા માખી, પાનળતી ઇપળ, લૂએચા ચૂમિયા, સફેદ પીક ધરાવતા મૂસિયા, લીલી પાનવાળતી ઇયળ, થ્રિસિપ, થ્રિપ્સ અને સફેદમાખીના ભિયંત્રણ માટે કરાપ છે. તે એક કિલો ઉત્પાદનમાં (ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) ૨૫૦ ગ્રામ થાઅૉમીથૉક્ઝામ સક્રિય ઘટક તરીકે ધસાવે છે. વપરાશ અને તે સંબંધી સૂચનો : થાયૉમીથૉક્ઝામ ૨૫% ડબ્લ્યુ. જી ની ભલામણ ચોખા અને કપાસમાં થતી નીચે જણાવેલી જીવાતોના નિયંત્રણ માટે કરાય છે.

પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	સ.ઘ. (ગ્રામ)	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા છેહાં દ્રાવસ પાણીયાં (ગ્રામ)	દ્રાવ્ય લણણી (લીટર)	છંટકાવથી વટ્યેનો પ્રતિક્ષાગાળો
ચોખા	ગ્રામભારાની ઇયળ	૨૫	૧૦૦	૫૦૦-૭૫૦	૧૪
	ગાઠિયા માખી				
	પાનવાળતી ઇયળ				
	કથ્થઈ તીતીઘોડા (બીપીએચ)				
	લફેદ પીઠ ધરાવતા તીતીઘોડા (ડબ્લ્યુબી પીએચ)				
	લીલી પાનવળતી ઇયળ				
	થ્રિપ્ત				
	(એક છેટકાવ રોપણી કર્યા પછી ૨૫-૩૦ દિવસે છોડના પ્રાથમિક સ્તરે ચોખામાં ઘતી રારૂઆતની જીવાતો ગ્રામભારાની ઇયળ, સાંઠિયા માખીના નિયંત્રના નિયંત્રણ માટે અને બીજે છેટકાવ પાન આવે ને સમયે (રોપણી કર્યાના ૫૦ થી ૫૫ દિવસે) ચોખામાં થતી જીવાતો લીલી પાનવાળતી ઇયળ, કથ્થઇ તીતીઘોડા, સફેદ, પાઠી ધરાવતા તીતીઘોડા ઇત્યાદીના નિયંત્રણ માટે ક્સાઅ છે.)				
કપાસ	લીલાં ચૂસિયા	૨૫	૧૦૦	૫૦૦-૭૫૦	૧૪
	ષનોમશી, થ્રેપ્સ				
	સફેદ માખી	૫૦	૨૦૦	૫૦૦-૭૫૦	૧૨
	પથમ છંટકાવ ચાવાણર્ડિયં પછી ૨૫-૩૦ દિવસે અધવા સૌ પ્રથમ જીવાત દેખાય ત્યારે અને ત્યારબાદ જીવાતના ઉકપદ્રવ આધીરે ૧૫ દિવસના અંતરાળે ૨-૩ છંટકાવ કરો.)				

વપરાશ પાટેના સૂચનો : ઉત્પાદનની જોઈતી માત્રા લઈ તેને થાડા પાણીમાં ભેળવો. બાડી સ્હેલું પાતી ર્ઇાવ્યા મુજબ બરોબર હલાવી ઉમેરો જેથી યોગ્ય સ્રપર્ણ પાડ પર છંટકત્વ કરી શકાય. સંગ્રહ : ૧. જંતુનાશક ધરાવતા પાત્રોને તેના મૂળ પાત્રમાં અલગ ઓરડી કે જગ્યામાં અન્ય વસ્તુઓ પાસ કરીને ખાધપદાથૉ સંગ્રહ કરાતા હોય તેવા જગ્યાથી દૂર અથવા અલગ કબાટમાં તાળું-ચાવી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઈએ. ૨. જંતુનાશકના સંગ્રહ માટેની જગ્યા કે ઓરડી યોગ્ય બોધકામ ધરાવતી, સૂકી, યોગ્ય કવા ઉજસવાળી અને પૂરતા વિસ્તારવાળી હોવી જોઈએ જેથી વરાળનો ભરાવો ન થાય. સાવચેતી : છંટકાવ માટેનું દ્રાવણ બનાવવા ચસોઇના વાસણોનો ઉપયોગ ન કરો. છંટકાવનું દ્રાવણ હતાવવા લાડડીનો ઉપયોગ કરો. ત્વચાનો સંપર્ક ટાળવા હાથમોજા પહેરો. શ્વસમાં કે આંખના સંપર્કમાં પણ ન આવવા દો. ચુરક્ષાત્યક વસ્ત્રો, મુખ આવરણ, ગોગલ્સ, બૂટ, ઊત્પાદી છંટકાવ કરતી વખતે પહેરો અને તમારી જાતને છાંટ તરફ ન દ્રાળો. બોઝતમાં મોં વાટે ફૂક ન મારો. ઉત્પાદનનો વપરાશ કરતી વખતે ખાવું-પીવું કે ધૂમ્રપાન કરવું નહી. ન વપરાયેલા દ્રાવણનો સંગ્રહ ન કરો. સ્પ્રેહ ન કરો. સ્પ્રેયર્સ, બકેટ અને અન્ય વાસણો વપરાશ કર્યા પછી દરસોજ પાણીથી ભરોબર સાફ કરો. કામ થઈ ગયા પછી દૂષિત વસ્ત્રો બદલી તો અને હાથને સાબુ અને પાણીથી બરોબર સાફ કરો. દૂષિત વસ્ત્રો પણ ધોઈ નાખો. જળમાર્ગ, તળાવ કે ઝરણાંમાં વધારાનું દ્રાવણ ઢોળો અથવા સ્પ્રેયર્સ કે પાત્રો સાફ કરી તેને દૂષિત ન કરો. મધમાખી સક્રિય હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો નહી. ભણામણ દરાયેણ માત્રામાં ઉપયોગ કરાત્ય તો વળ્યજીવો પર અવળી અસર કસ્તું નથી. ઝેર ચઢયાના કોઈપણ દેખાય તો તસ્ત ડૉક્ટરની સલાહ લો. ખાલી પાત્રોનો નિકાલ :૧. પાત્રો અથવા વધેલું દ્રાવ્ય અને પાત્રો તેમ જ મશીનમાંથી ધોવાણ રીતે કરવું જંથી વાતાવરણ અને જળ પ્રદૂષણ રોકી શકાય. ૨. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતા ન રાખો. ૩. પાત્રોને તોડી વસ્તી ધરાવતા ત્રેટ્શથી દૂર જમીનામાં ઢાંટી દો. ઝેર અઢાપ્ય લક્ષણો : ઝેરની અસર થવાથી સ્વયંસ્કસ્રિત હલનચલનમાં ઘટાડો થવો, આરડી આવવી અને પ્રોસિસ. પ્રાથમિક ઉપચાર: અસર પામેલ વ્યક્તિને જોખમી જગ્યાએથી દૂર તાજી હવામાં કે હવાની યોગ્ય અવજવર ધરાવતી ઓરડીમાં લઈ જાવ અને ઠંડા પડવાથી રક્ષણ કરો. ઝેર ચઢયાની શંકા જણાત્ય તો : તરત ચિકિત્સકને બોલાવો. ત્વચાનો સંપર્ક થાય તો : દૂષિત વસ્ત્રો કાઢી શરીરના દૂષિત ભાગોને સાબુ અને પાણીથી બરોબર ધુઓ. આંખમાં જાય તો : આંખોને થોડી મિનિટ સુધી સ્વચ્છ પાણીથી સાફ કરો. ગળી જણાય તો : પુષ્કળ પાણીમાં ઓષધિય ચારકોલ થાડી થોડી વારે આપતા રહો. બોધ : બેહોશ વ્યક્તિને મો વાટેકોઈ પદાર્થ ન આપશો. ઉલટી કરાવવ પ્રયત્ન ન કરો. વિષનાશક : કોઈ વિશેષ વિષનાશક જણાનું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

રાસાયનિક સંરચના :

થિયામેથોકઝૅમ એ.આય.	: 25.00%વ/વ
વિખરાવકારક : સોડીયમ લિગ્નોસલ્ફેટ	: 5.00%વ/વ
આર્દ્રતાકારક સોડીયમ લૉરિલ સલ્ફેટ	: 3.75%વ/વ
પ્લાસ્ટીસૌઝર: બુટીલેટેડ પાલીવિનિલ પિરોલીડીસ	: 1.25%વ/વ
વાહક ડાયાટોમૅશિયસ માટી	: 5.00%વ/વ
બધક જેમ પિષ્ટમય પદાર્થ	: 60.00%વ/વ
કુલ	: 100.00%વ/વ