CASCADE

FENPYROXIMATE 5% EC

(Insecticide/Acaricide)

Fenpyroximate is a highly active pyrazole acaricide with contact and stomach poison action. Fenpyroximate is very effective in controlling red spider mites, pink mites and purple mites of tea, yellow mite of chilli and Eriophyid mite of coconut, Jassid & Mites of Cotton.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gram)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in water (Litre)	Waiting period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
(b) Spraying over developing nuts or young buttons	Eriophyid mite	0.056-0.075g per tree	1.12-1.5ml per tree	1.5 lit. per tree	7	-
Cotton	Jassid & Mites	37.5	750	500	15	-
Tea	Red spider mite Pink mite Purple mite	15-30	300-600	400-500	7	-
Coconut (a) Root feeding method	Eriophid mite	0.5 g per tree	10 ml. per tree	10 ml of 1% urea solution per tree	7	-
Chilli	Yellow mite	15-30	300-600	300-500		

Direction of use:

Equipments used in application : Knapsack sprayer, foot sprayer, rocking sprayer and battery operated power sprayer for high volume spraying.

Preparation of spray solution : Measure out of the required quantity of Fenpyroximate 5% EC and mix well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as per the spray volume required with thorough agitation.

Time of Application : -

Precaution : Avoid inhalation skin, eye or oral contact. Wear protective clothing, gloves, boots and goggles while using. Do not drink, eat, chew or smoke while handling. Do not spray against the wind. Change clothes after application and wash yourself thoroughly with soap and water. Wash contaminated clothes thoroughly. At the end of spray operation, bucket/drum and spray pump should be washed with detergent powder/soap and rinsed with plenty of water. Do not contaminate streams, ponds, waterways, etc. by discharging leftover spray material into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them.

Symptoms of poisoning : Nasal irritation, troubled breathing, piloerection, prostration, dullness, lethargy, diarrhoea and paralysis.

First Aid : If inhaled bring the patient to fresh air immediately. Keep him warm and at rest. In case of skin contact, remove contaminated clothing and shoes and wash with soap and plenty of water. If case of eyes contamination irrigate eyes immediately with clean water at least for 15 minutes. If ingested carry out gastric lavage with care to prevent aspiration. Call the physician immediately. .

Antidote: There is no specific antidote. Treat symptomatically and supportively.

Disposal of Used container : Packages, surplus materials and washings from the machine, etc. should be disposed of the safe manner so as to prevent environmental or water pollution. The packages shall not be left outside to prevent their re-use. Never use containers for storing food or water. The packages should be broken and buried away from vegetation and human habitation.

Storage conditions : The packages containing the pesticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing feed, food, drink, seeds or shall be kept in separate almirah under lock and key, depending upon the quantity and nature of the pesticide. The rooms or premises meant for storing the pesticide shall be dry, well built, well lit, well ventilated and of sufficient dimensions to prevent pollution with the vapours.

Chemical Composition :

Active Ingredient : Fenpyroximate	5.00% w/w
Emulsifier : Blend of calcium alkyl benezene sulphonate & ethoxylated vegetable oil or equivalent	10.00 % w/w
C-IX/Aromex or equivalent	QS% w/w
Total	100.000% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

कासकेड

फेनपायरोक्सिमेट ५ प्रतिशत ई सी

(कीटनाशक/मितेनाशक)

फेनपायरोक्सिमेट ५ प्रतिशत ई सी एक पायराजोल कुटकीनाशक है। जो स्पर्श व उदर विष प्रभाव से असर करता है। फेनपायरोक्सिमेट ५ प्रतिशत ई सी. की सिफारिश चाय की लाल स्पाइडर कुटकी, गुलाबी कुटकी, बैंगनी कुटकी, मिर्च की पीली कुटकी तथा नारियल की एरीयोफाइड कुटकी की रोकथाम के लिए किया जाता है।

उपयोग

फसल	कीटों के नाम	प्रति हेक्टयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति हेक्टयर मात्रा संरचन (मि.ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन मे)	पुन :प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिडकाव के बाद (घंटे)
(ख) वर्धमान फल और बटन पर छिडकाव	एरीयोफाइड कुटकी	०.०५६-०.०७५ ग्राम/पेड	१.१२-१.५ मि.ली./पेड	१.५ लीटर/पेड	७	-
कपास	तेला और घुन	३७.५	७५०	५००	१५	-
चाय	लाल स्पाइडर कुटकी गुलाबी कुटकी बैंगनी कुटकी	१५-३०	३००-६००	४००-५००	७	
नारियल (क) जड शोषण के द्वारा	एरीयोफाइड कुटकी	०.५ ग्राम/पेड	१० मि.ली./पेड	१० मि.ली. १प्रतिशत यूरिया घोल/पेड	७	
मिर्ची	पीली कुटकी	१५-३०	३००-६००	३००-५००	७	

उपयोग के लिए निर्देश:

उपयोग में आनेवाले यंत्र : नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, बैटरी से चलनेवाला पदर स्प्रेयर आदि छिड़काव यंत्र बडी मात्रा में छिड़काव के लिए। छिड़काव के घोल बनाना: फेनपायरोक्सिमेट ५ प्रतिशत ई सी की आवश्यक मात्रा लीजिए, और उसे थोडे से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाईए। फिर, छिड़काव घोल की आवश्यक मात्रा के अनुसार बाकी पानी की मात्रा को अच्छी तरह हिलाकर घोल बनाईए।

प्रयोग का समय : -

प्रयोरकर्ताओं के लिए सावधानियां: कीटनाशक को श्वास द्वारा न लीजिए और त्वचा, आँखों या मुँह का संपर्क में न आने दीजिए। उपयोग करते समय बचावकारी कपडे, ग्लेब्डस, जूते और चश्मे का इस्तेमाल कीजिए। छिड़काव करते समय खाना, पीना, धूम्रपान करना या तम्बाकू चबाना मना हैं। हवा की विपरित दिशा में छिड़काव मत कीजिए। छिड़काव के बाद दूषित कपडे को बदलिए और शरीर को काफी पानी और साबून से धोइए । दूषित कपडे को अच्छी तरह धोइए। छिड़काव के बाद बाल्टियाँ, ड्रम एवं छिड़काव यंत्र को डिटरजेन्ट/साबुन से साफ करे और बहूत पानी से धोइए। बची हुई छिड़काव सामग्रि को झरनों, तालाबों आदि में बहाकर या स्प्रयर, दूषित बाल्टियों आदि को उनमें धोकर उनकों दूषित मत कीजिए।

विष के लक्षण: नाक मे जलन, रोंगटे खडे होना, श्वास लेने मे कठिनाई, निष्क्रियता, क्रान्ति, मतिमंदता, अतिसार और लकवा ।

प्राथमिक चिकित्सा: अगर श्वास द्वारा लिया गया हो तो मरीज को तुरंत खुली हवा मे ले आईए। मरीज को गरम रखिए और आराम करने दीजिए। त्वचा दूषित हो गयी तो दूषित कपडे और जूते को निकाल दीजिए और दूषित त्वचा को साबुन और खुब पानी से धोइए । आँखों में जाने से कम से कम १५ मिनट तक स्वच्छ पानी से छपछपाए। निगलने पर गास्ट्रिक लेवेज कराइए। ऐसा करते समय दम घुटने से बचाए तुरंत डाक्टर को बुलाइए।

विष नाशक : कोई खास विषनिवारक नहीं हैं। लक्षणों के अनुसार उपचार कीजिए।

खाली डिब्बों का निपटारा : डिब्बों या बची हुई सामग्री मशीनों की धोवन का निपटारा सुरक्षित तरीके से इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो । खाली डिब्बों को बाहर न छोडे ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो । खाली डिब्बों का पानी और खाद्य संग्रगण के लिए उपयोग न करें । खाली डिब्बों को तोड के वनस्पति और वास स्थान से दूर जमीन में गाड देना चाहिए ।

संग्रहण की शर्तें : कीटनाशकों के डिब्बों का भंडारण खाद्य पदार्थ, आहार, पेय, बीज भंडारण हेतू प्रयुक्त किए जानेवाले कमरों या परिसरों से अलग कमरों वा परिसर में किया जाना चाहिए अथवा कीटनाशकों की मात्रा एवं प्रकृति के अनुसार इन्हें अलग अलमारियों में ताला बंद करके रखना चाहिए। कीटनाशकों के भंडारण के कमरे या परिसर अच्छितरह बने हुए, सूखे, अच्छि रोशनी व हवा वाले तथा पर्याप्त बडे आकार के होने चाहिए ताकि कीटनाशक का भाप से प्रदूषण न हो ।

रासायनिक संरचना :

सक्रिय तत्व : फेनपायरोक्सिमेट	५.००% भार/भार
इमलसिफायर: केलशियम अलकाइल बेनजीन सलफोनेट और ईथोक्सिलेटिड वनस्पति तेल अथवा समतुल्य का मिश्रण	१०.००% भार/भार
सि-९/अरोमेक्स और समतुल्य	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
योग	१००.०००% भार/भार

चेतावनी : इस लेबल हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

క్యాస్‌కేడ్

ఫెన్‌పైరొక్సిమేట్ 5% ఇసి

(కీటకనాశిని / నల్లినాశిని)

ఫెన్‌పైరొక్సిమేట్ అనేది అత్యంత ప్రభావవంతమైన పైరజోల్ సమూహమునకు చెందిన స్పర్శ మరియు ఉదర చర్యలు కలిగిన నల్లినాశిని. తేయాకు తోటలను ఆశించు ఎర్రసాలీడు నల్లి, గులాబి నల్లి మరియు ఊదా నల్లి, మిరపలోని పసుపుపచ్చ నల్లి, కొబ్బరితోటలను ఆశించు ఇరియోఫిడ్ నల్లి మరియు ప్రత్తి పంటను ఆశించు పచ్చదోమలు మరియు నల్లులను అరికట్టును.

సిఫారసు

పంటలు	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు/హె. స.పి. (గ్రా.)	మోతాదు/హె. సూత్రీకరణ (మిలీ)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు, కోత మధ్య విరామ సమయం (రోజులు)	పున:ప్రవేశం పిచికారీ తదుపరి (గంటలు)
బి)కాయలపై లేదా పిందెల మీద పిచికారీ	ఇరియోఫిడ్ నల్లి	0.056-0.075 గ్రా./చెట్టు	1.12-1.5 మిలీ/చెట్టు	1.5 లీ/చెట్టు	7	-
ప్రత్తి	పచ్చదోమలు & నల్లులు	37.5	750	500	15	-
తేయాకు	ఎర్ర సాలీడు నల్లి గులాబిరంగు నల్లి ఊదా నల్లి	15-30	300-600	400-500	7	
కొబ్బరి (ఎ) వేరు ఫీడింగ్ పద్ధతి	ఇరియోఫిడ్ నల్లి	0.5 గ్రా./చెట్టు	10 మిలీ/చెట్టు	10 మిలీ 1% యూరియా ద్రావణం/చెట్టు	7	-
మిరప	పసుపుపచ్చ నల్లి	15-30	300-600	300-500	7	

ఉపయోగించుటకు సూచన :

యంత్ర పరికరం: అధిక నీటి పరిమాణం గల నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయరు, రాకింగ్ స్ప్రేయరు మరియు బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ పవర్ స్ప్రేయర్ వంటివి పిచికారీకి ఉపయోగకరం.

పిచికారీ ద్రావణం తయారీ : ఫెన్‌పైరొక్సిమేట్ 5% ఇసి ను కావల్సినంత పరిమాణంలో తీసుకొని దాన్ని కొద్దిపాటినీటిలో కలిపి బాగా కలియతిప్పవలెను. దానికి మిగిలిన నీటిని కలిపి కలియబెడుతూ పిచికారీ ద్రావణమును తయారుచేసుకోవాలి.

ఉపయోగించు సమయం : -

ముందు జాగ్రత్తలు : మందును పీల్చరాదు. చర్మము, కళ్ళు లేదా నోటికి అంటనీయరాదు. ఉపయోగించునపుడు సురక్షిత దుస్తులైన చేతి తొడుగులు, మరియు కళ్ళజోడు వంటివి ధరించాలి. ఉపయోగించునపుడు త్రాగుట, తినుట, నమలుట లేదా పొగత్రాగుట వంటివి చేయరాదు. గాలికి ఎదురుగా పిచికారి చేయరాదు. పని పూర్తి కాగానే దుస్తులను మార్చుకొని సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకొనండి. కలుషిత దుస్తులను బాగా శుభ్రపరచుకొనండి. పిచికారీ తదుపరి బక్కెట్/డ్రమ్ మరియు స్ప్రే పంపులను డిటర్జెంట్ పొడరు, సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. మిగిలిన పిచికారీ ద్రావణంను బక్కెట్లు కడిగిన నీరు, స్ప్రేయర్లను కడిగిన నీటిని చెరువులు, కుంటలు,నీటి కాలువలు మరియు నీటి వనరులలో పోసి కలుషితం చేయరాదు.

విషలక్షణములు : ముక్కుదురద, శ్వాసలో ఇబ్బంది, అర్మమొలలు, సాగిలపడుట, నీరసం, బద్ధకం, అతిసారం మరియు పక్షవాతం వంటివి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : మందును పీల్చినచో వెంటనే రోగిని తాజా గాలిలోనికి తరలించాలి. రోగి శరీరం చల్లబడకుండా రక్షించి, విశ్రాంతినివ్వండి. చర్మమునకు అంటినచో, కలుషిత దుస్తులు మరియు బూట్లు తొలగించి సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచండి. కళ్ళలో పడినచో, శుభ్రమైన నీటితో 15 నిమిషాల వరకూ ధారగాకడగండి. మింగినచో, వెంటనే గ్యాస్ట్రిక్ లావేజిని శ్వాసకు ఇబ్బంది లేకుండా ఇవ్వండి. వెంటనే వైద్యుని పిలవండి.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు ఏమీలేదు. విషలక్షణాలను బట్టి సహాయక చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ కంటైనర్ విసర్జన : ప్యాకేజీలు, మిగిలిపోయిన మందు లేదా పరికరాలను కడుగుగా వచ్చిన నీటిని కడుజాగ్రత్త వహిస్తూ అంటే పరిసరాలు, నీరు, నీటివనరులు కలుషితం కానీయని రీతిలో సురక్షితంగా విసర్జించాలి. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగాన్ని నిరోధించుటకు బయట వదలివేయరాదు. ఉపయోగించిన కంటైనర్లను ఆహారపదార్థము లేదా నీరు నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించకండి.ప్యాకేజీలను విరగ్గొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ: పురుగుమందు నిల్వ చేయు ప్యాకేజీలను పసుగ్రాసం, త్రాగు పానీయం, విత్తనములకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంతంలో ప్రత్యేక అల్మారీలో వాటి స్వభావం మరియు పరిమాణాన్ని బట్టి తాళం వేసి భద్రపరచుకొనవలెను. పురుగుమందును నిల్వచేయు గదులు పొడిగా, గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో నీటి ఆవిరి కాలుష్యం నిరోధించేలా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

సక్రియ పదార్థం :ఫెన్‌పైరొక్సిమేట్	5.00% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్: బ్లెండ్ ఆఫ్ కాల్షియంఅల్కిల్ బెంజిన్ సల్ఫోనేట్ & ఇథాక్సిలేటెడ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్ లేదా తత్సమాసము	10.00% భా/భా
సి-9/ఆరోమేక్స్ లేదా తత్సమాసం	క్యు.యస్.%భా/భా
మొత్తం	100.000% భా/భా

హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్/ కరపత్రంలో తెలియజేసిన వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.

AGASTYA

CASCADE

FENPYROXIMATE 5% EC

(Insecticide/Acaricide)

कासकेड

फेनपायरोक्सिमेट ५ प्रतिशत ई सी

(कीटनाशक/मितेनाशक)

క్యాస్‌కేడ్

ఫెన్‌పైరొక్సిమేట్ 5% ఇసి

(కీటకనాశిని / నల్లినాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగి సిగదంతే దూరవిడి.

विष
విషము విష
POISON
Yellow

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

Manufactured & Marketed by :

AGASTYA AGRO LIMITED

Survey No. 47, Murahari Pally-501 401
Medchal (M), Medchal-Malkajgiri Dist.,
Telangana State, INDIA

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S

For Consumer Complaints / Feedback: Customer Care Manager
No.: 040 - 6457 6958 E-mail : agastyaagro@yahoo.com
उपभोक्ता शिकायतों / प्रतिक्रिया के लिए:कस्टमर केर मेनेजर नं.:
०४०-६४५७६९५८ ई-मेइल : agastyaagro@yahoo.com

027/TS-IML/2017

(Old Mfg.Lic.No.:220/1997-98, Dt.06-07-1997)

Reg.CIR-186841/2021-Fenpyroximate (EC) (429)-158

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

कासकेड

फेनपायरोक्सिमेट 5% ई.सी. (कीटनाशक/मितेनाशक)

फेनपायरोक्सिमेट एक उच्च क्रियाशील पयरजोल कोळीनाशक आहे आणि हे स्पर्श व पोट विषनाशक आहे. चहा, नारळ आणि मिरची वरील फायटोफोगस कोल्यांच्या नियंत्रणासाठी फेनपायरोक्सिमेट खूपच परिणामकारक आहे.

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा			अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	
चहा	लाल स्याइडर	१५-३०	३००-६००	४००-५००	७
	गुलाबी कोळी				
	जांभळा कोळी				
कपास	तेला और घुन	३७.५	७५०	५००	१५
मिरची	पिवळा कोळी	१५-३०	३००-६००	३००-५००	७
नारळ	इरियोफिड कोळी				७
क) मूळ शोक्ति किया		०.५ ग्रॅ	१० मिली प्रति झाड	१० मिली १% यूरिया द्रावण प्रति झाड	
ख) वाढणाऱ्या नटस्र या लहान बटनावर फवारणी		०.०१६-०.०७५ ग्रॅ	१.१२-१.५ मि.ली. प्रति झाड प्रति झाड	१.५ लीटर प्रति झाड	

वापरणण्याची दिशा:

फवारणीसाठी वापरात येणारी उपकरणी: नॅपसॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रयर, रॉकींग स्प्रेयर आणि उच्च वॉल्यूम स्प्रेयरस्साठी बॅटरी ऑपरेटेड पॉटर स्प्रेयर.

फवारणीचे द्रावण बननिणे: फेनपायरोक्सिमेट 5% ईसी चे पूरेसे प्रमाण ध्या: आणि ते थोड्याशा पाण्यात व्यवस्थित मिसळा. नंतर फवारणी द्रावणात पूरेश्या प्रमाणात बाकी पाण्याचे प्रमाण व्यवस्थित हलवून द्रावण बनवा.

अर्ज करणण्याची वेळ:—

खबरदारी: श्वासाद्वारे आत घेवू नका, त्वचा, डोळे अथवा तोंडादारे संपर्क होवू देवू नका, हगाचा वापर करताना सुरक्षित कपडे जसे हातमोजे, बूट आणि गॉगल वापसवेत, हगाची फवारणी करताना खाणे, पीणे चघळू अथवा धुम्रपान करु नये, वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेला फवारणी करु नये. फवारणी नतंर कपडे बदला आणि शरीर साबण व पाण्याने स्वच्छ धुवा . दूषित कपडे स्वच्छ धुवा. फवारणी नंतर बादली/डम आणि फवारणी पंप डिटरजंट पायडर/साबणाने स्वच्छ करा आणि भरपूर पाण्याने धुवा. उरलेले फवारणी द्रवाण झरे, तलाब इ. मधे सोडून वा स्प्रेयर, दूषित बादल्या इ. त्यात धुवून त्याला दूषित करु नका.

विषबाधेची लक्षणे: नाकात जळजळ, श्वास घेण्यास त्रास, पाइलोइरेक्शन, क्षीणशक्ति, सुस्ति, आळास अतिसार आणि पॅरालेसिस.

प्रथमोपचार : जर गिळले गेले तर रुग्णास त्वरित मोकळ्या हवेत आणा. रुग्णास गरम ठेवा आणि आराम करु द्या. जर त्वचेशी संपर्क झाल्यास, दूषित कपडे आणि बूट काढा आणि साबण व भरपूर पाण्याने धुवा. जर डोळ्यात गेले तर जवळ-जवळ १५ मिनिट स्वच्छ पाण्याने धुवा. गिळले गेल्यास गॅस्ट्रिक तवेज द्या. त्वरित डॉक्टरला बोलवा.

विषोपचार: कोणताही खास विषोपचार नाही. लक्षणानुसार आणि सहाय्यक उपचार करा.

साठवण: हे कीटनाशक असणारी पॅकेजिस ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा वा खोल्या यापासून, विशेषत, अन्नपदार्थ, खाद्यान्न, पेय, बियाणे ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा वा खोल्या यापासून, दूर जागी वा खोल्यात किंवा कीटनाशकाचा दर्जा व स्वरूप यांचा विचार करून कपाटात कडीकुलपात देवावीत. हे. कीटनाशक साठा करुन ठेवण्याची जागा, उत्तम बांधणीची, कोरडी, भरपूर उजेडाची व पूरेशी मोठीअसादी, त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदूषण टळेल.

पिराम्या डब्यांची विल्हेवाट: पॅकेजिस किंदा उरलेल द्रावण किंवा फवारणीची उपकरणी धुतलेले पाणी यांची दिल्हेवाट पयेविरण किंवा प्रदुषीत होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावानी. पुनः कामासाठी वापरली जावू नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उघड्यावर टाकू नयेत. रिकाम्या डब्यांत पाणी वा अन्नपदार्थ साठवणीसाठी वापरु नये. रिकामी पॅकेजिस मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत.

रासायनिक संरचना :

फेनपायरोक्सिमेट (स.त.)	५.००% व/व
इमल्सिफायर : ब्लेंण्ड ऑफ कॅल्शीयम अल्केल बेंढीन सल्फोनेट आणि इथॉक्सिलेटेड वेजीटेबल ओईल अथवा त्या समान	१०.००% व/व
सॉलवंट:	
सी-९/एरोमेक्स/समान	१००% बनाविण्यासाठी पुरेसे प्रमाण
एकूण	१००.००% व/व

खबरदारी: या लेबल-पत्रकावर नमूद के लल्याशिवाय इतर पिकांवर वापररु नये.

ક્યાસ્કેડ્

ફેન્પ્રૈરોક્સિમેટ 5% ઇ.સિ. (કીટનાશક/અકારૈસિડ)

ફેનિપ્રૈરોક્સિમેટ સંપર્કર મતુ હોટ્ટુ વિષદ ક્રિયેયોંદિગે હેંચ્ચુ સક્રિયવાદ પ્રૈકોજોલ્લ્ અકાર્ડાસ્યૈડ્ આગિદે. ચકા, તેંગિનકાયિગળુ મતુ વેંણસિનકાયેયલ્લિ પ્રૈટોફોગસ્ હુચગળન્નુ નિયંત્રિસુવલ્લિ ફેનિપ્રૈરોક્સિમેટ્ બહુ પરિણામકારિયાગિદે.

શિફારસુગળુ:

બેળે (ગળુ)	કીટગળ સામાન્ય હેસરુ	હોડવેંજ્ / હેક્ટેરિગે એ.આ. (ગ્રામ)	ફાર્મુલેશન	નીરિનલ્લિ મિશ્રણ (લિ)	હિંદિન સિંપરણે મતુ ફાસલુ કોયુવુદેક નડુવે કાયુવિકે અવધિ (દિનગળલ્લિ)
ક)	એરોયોફ્રૈડ્ મિટે અભિવૃદ્ધિશીલ બીજગળુ પ્રત્રે મરક્કે	0.056–0.075 ગ્રામ	1.12–1.5મિ.લિ. અથવા મરક્કે	1.5 લિટર મેલે સિંપડિસુવુદુ. એళેય ગુંડિગળુ	7
હત્તિ	જાસ્મિડ્ મતુ હુચગળુ	37.5	750	500	15
ટિ	કેંપુ સ્પૈડર્ મિટે	15–30	300–600	400–500	7
	ગુલાબિ મિટે નેરળે				
	મિટે તેંગિન એરોયોફ્રિડ્ મિટે	0.5ગ્રામ.	10મિ.લિ.	10મિ.લિ.	1%
(જ)઒ંદુ મરક્કે રૂપાન્ર પ્રત્રે મરક્કે મંણસિનકાયિ હચદિ મિટે		15–30	300–600	યૂરિયા દ્રાવણ આહાર વિધાન 300–500	7

બળકેયિ નિર્દેશનગળુ:

અપ્લિકેશન્નલ્લિ બળસુવ ઉપકરણગળુ : ન્યાપ્સાક્ સ્પ્રૈયર્, ફૂટ્ સ્પ્રૈયર્, રાકેંગ્ સ્પ્રૈયર્ મતુ બ્યાટરિ ચાલિત હેચ્ચિન પ્રમાણદ સિંપરણેગાગિ પવર્ સ્પ્રૈયર્. સ્પ્રૈ દ્રાવણવન્નુ તયારિસુવુદુ : અગત્યવિરુવ પ્રમાણદલ્લિ ફેન્પ્રૈરોક્સિમેટ્ 5% ઇસિયન્નુ અళેયિરિ મતુ સ્વલ્પ પ્રમાણદ નીરિનોંદિગે ચેન્નાગિ મિશ્રણ માડિ. સંપૂર્ણ આંદોલનદોંદિગે અગત્યવિરુવ સ્પ્રૈ પરિમાણદ પ્રકાર ઉળિદ પ્રમાણદ નીરન્નુ સેરિસિ.

મુંસ્નેચ્ચરિકેગળુ : ઇન્હલેશન્ તપ્પિસિ : ચર્મ, કણ્ણુ અથવા મૌખિક સંપર્કર. બળસુવાગ રક્ષણાત્મક બટ્ટે, કૈગવસુગળુ, બૂટુગળુ મતુ કન્નડકગળન્નુ ધરિસિ. નિર્વહિસુવાગ કુડિયબેંદિદે. તિન્નબેંદિદે, અગિયબેંદિદે અથવા ધૂમપાન માડબેંદિદે. વૈર્ડ્ વિરુદ્ધ સિંપડિસબેંદિદે. અન્નુળુસિદ નંતર બટ્ટેગળન્નુ બદલાયિસિ મતુ સોપ્ મતુ નીરિનિંદ ચેન્નાગિ તોળેયિરિ. કલુશિત બટ્ટેગળન્નુ ચેન્નાગિ તોળેયિરિ. સ્પ્રૈ કાર્યાચરણેયિ કોનેયલ્લિ, બકેટ્/ડ્રમ્ મતુ સ્પ્રૈ પપ્ અન્નુ ડિટર્જેંટ્ પૌડર્/સાબૂનિનિંદ તોળેયબેંકુ મતુ સાકક્કુ નીરિનિંદ તોળેયબેંકુ. તોરેગળુ, કોળગળુ, જલમાર્ગગળુ ઇત્યાદિગળન્નુ અવુગળલ્લિ ઉળિદિરુવ સ્પ્રૈપ્ વસ્તુગળન્નુ બિડુવ મૂલક અથવા અવુગળલ્લિ સ્પ્રૈયર્ગળુ, કલુશિત બકેટ્ગળુ ઇત્યાદિગળન્નુ સ્વચ્છગોળિસુવ મૂલક કલુશિતગોળિસબેંદિદે.

વિષદ લક્ષણગળુ : મૂગિન કેરળિકે, તોંદરેગોંબళગાદ ઉસિરાટ, પૈલોરેક્ટ્સન્, સાસ્ત્રાંગ, મંદતે, અલસ્ય, અતિસાર મતુ પાર્શ્વવાયુ.

પ્રથમ ચિકિત્સે : ઇન્હેલ્લ્ માડિદરે રોગિયન્નુ કક્ષણ તાજા ગાળિગે તન્નિ. અવનન્નુ બેચ્ચુગાગિસિ મતુ વિશ્રાંતિ કોડેયિરિ. ચર્મદ સંપર્કદ સંદર્ભદલ્લિ, કલુશિત બટ્ટે મતુ બૂટુગળન્નુ તેગેદુહાકે મતુ સાબૂનુ મતુ સાકક્કુ નીરિનિંદ તોળેયિરિ. કણ્ણુગળુ કલુશિતગોંડરે કક્ષણવે કનિષ્ઠ 15 નિમિશગળ કાલ શુદ્ધ નીરિનિંદ કણ્ણુગળિગે નીરુનિસબેંદુ. સેવિસિદરે આકારુક્ષેયન્નુ કડેગટ્ટલુ એચ્ચિરિકેયિંદ ગ્યાસ્ટ્રિક્ લ્યાવેજ્ અન્નુ કૈગોળ્હે. કક્ષણ વૈદ્યરન્નુ કરે માડિ.

પ્રતિવિષ: યાવુદેરે નિર્દિષ્ટ પ્રતિવિષવિલ્લ. રોગલક્ષણવાગિ મતુ બેંબલવાગિ ચિકિત્સે નીડિ.

ઝાલી પાત્રેયિ વિલેવારિ : પરિસર અથવા જલ માલિન્યવન્નુ કડેગટ્ટલુ પ્યાકેજુગળુ, હેચ્ચુવરિ વસ્તુગળુ મતુ યંત્રદિંદિંદ તોળેયિયુવુદુ ઇત્યાદિગળન્નુ સુરક્ષિત રીતિયલ્લિ વિલેવારિ માડબેંદુ. અવુગળ મરુ-બળકેયિયન્નુ કડેયલુ પ્યાકેજ્ગળન્નુ હોરગે બિડબારદુ. આહાર અથવા નિરન્નુ સંગ્રહિસલુ પાત્રેગળન્નુ એંદિગૂ બળસબેંદુ. પ્યાકેજુગળન્નુ મુરિયબેંકુ મતુ સસ્યવર્ગ મતુ માનવ વસતિગળિંદ દૂર હૂળબેંકુ.

શેંખરણા પરિસ્થિતિગળુ: કીટનાશકવન્નુ હોંદિરુવ પ્યાકેજુગળન્નુ આહાર, આહાર, પાનીય, બીજગળન્નુ સંગ્રહિસલુ બળસુવ કોઠડિગળુ અથવા આવરણગળિંદ દૂરવિરુવ પ્રત્રેક કોઠડિગળુ અથવા આવરણદલ્લિ શેંખરિસિદબેંકુ અથવા પ્રમાણ મતુ સ્વભાવવન્નુ અવલંબિસિ લાક્ મતુ કીં અડિયલ્લિ પ્રત્રેક અલ્લિરબેંદુ ઇદબેંકુ. કીટનાશકદ. કીટનાશકવન્નુ સંગ્રહિસલુ ઉદ્દેશિસલાદ કોઠડિગળુ અથવા આવરણગળુ શુદ્ધવાગિરબેંકુ. ચેન્નાગિ બેંકાગિરબેંકુ મતુ અવિયુંદ માલિન્યવન્નુ તડેગટ્ટલુ સાકક્કુ અયામગળન્નુ હોંદિરબેંકુ.

રાસાયનિક સંયોજનેગળુ:

ફેન્પ્રૈરોક્સિમેટ્ વિષય (સ.પ.)	5.00% તૂક/તૂક
એમલ્સિફ્યૈયરુર્: ક્યાલ્સિય� અલ્કૈલ્ બેંનેજીન્	10.00% તૂક/તૂક
સલ્ફોનેટ્ મતુ એથાક્સિલેટેડ્ સસ્યજન્ય એન્હૈ અથવા સમાનવાદ	
સિ-9/એરૉમૈક્સ્ અથવા સમાનવાદ	ક્યુયસ્% તૂક/તૂક
઒ટ્ટુ	100.000% તૂક/તૂક

એચ્ચરિકે: ઈ લેબલ્/કરપત્રદલ્લિ નિર્દિષ્ટપડિસિદ હોરતુપડિસિ બેરે બેళેગళલ્લિ બળસબારદુ.

சாஸசாடெ

ஃபென்பைராக்சிமேட் 5% இசி (பூச்சிக்கொல்லி/அகாரிசைடு)

: ஃபென்பைராக்சிமேட் என்பது மிகவும் செயலில் உள்ள பைரசோல் அக்காரைசைடு ஆகும், இது தொடர்பு மற்றும் வயிற்று நச்சு விளைவைக் கொண்டுள்ளது. ஃபென்பைராக்சிமேட் சிவப்பு சிலந்திப் பூச்சிகள், இளஞ்சிவப்புப் பூச்சிகள் மற்றும் தேயிலையின் ஊதா நிறப் பூச்சிகள், மிளகாயின் மஞ்சள் பூச்சி மற்றும் தென்னையின் எரியோஃபைட் பூச்சிகள், ஜாசிட் மற்றும் பருத்திப் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

பரிந்துரை:

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gram)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in water (Litre)	Waiting periodRe-entry between lastafter each spray to application harvest(Days) (in hours)
(ஆ) எரியோபிட் மைட் மீது தெளித்தல் ஒரு மரத்திற்கு ஒரு மரத்திற்கு அல்லது ஒரு மரத்திற்கு இளம் பொத்தான்கள்		0.056-0.075 கிராம் கொட்டைகள் வளரும்	1.12-1.5 மிலி	1.5 லிட்டர்.	7
தேயிலை சிவப்பு சிலந்திபூச்சி பிங்க் மைட் ஊதா பூச்சி		15-30	300-600	400-500	15
தேங்காய் எரியோபிட் மைட்		0.5 ப.	10 மிலி.	10. லி. 1%	7
(அ) ஒரு மரத்தின் யூரியா கரைசலுக்கு ஒரு மரத்திற்கு வேர் ஒரு மரத்திற்கு உணவளிக்கும் முறை					
மிளகாய் மஞ்சள் பூச்சி		15-30	300-600	300-500	7

பயன்பாட்டின் திசை:

பயன்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள்: அதிக அளவு தெளிப்பதற்காக நாப்சாக் தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், ராக்கிங் தெளிப்பான் மற்றும் பேட்டரி இயக்கப்படும் பவர் தெளிப்பான்.

தெளிப்பு கரைசலைத் தயாரித்தல்: தேவையான அளவு ஃபென்பிராக்சிமேட் 5% ஈ.சி.யிலிருந்து அளவிட்டு, ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரில் நன்கு கலக்கவும். முழுமையான கிளர்ச்சியுடன் தேவையான தெளிப்பு அளவிற்கு ஏற்ப மீதமுள்ள நீரைச் சேர்க்கவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும்: தோல், கண் அல்லது வாய்வழி தொடர்பு. பயன்படுத்தும் போது பாதுகாப்பு உடைகள், கையுறைகள், பூட்ஸ் மற்றும் கண்ணாடிகளை அணியுங்கள். கையாளும் போது குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ, புகைக்கவோ கூடாது. விர்டுக்கு எதிராக தெளிக்க வேண்டாம். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு துணிகளை மாற்றி, சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் உங்களை நன்கு கழுவுங்கள். அசுத்தமான துணிகளை நன்கு கழுவுங்கள். ஸ்ப்ரே செயல்பாட்டின் முடிவில், வாளி / டிரம் மற்றும் ஸ்ப்ரே நாய்க்குட்டி சோப்பு னள் / சோப்புடன் கழுவப்பட்டு ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும். நீரோடைகள், குளங்கள், நீர் வழிகள் போன்றவற்றை அவற்றில் தெளிக்கும் பொருட்களை வெளியேற்றுவதன் மூலமோ அல்லது அவற்றில் உள்ள தெளிப்பான்கள், அசுத்தமான வாளிகள் போன்றவற்றை சுத்தம் **செய்வதன் மூலமோ மாசுபடுத்த வேண்டாம்.**

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: நாசி எரிச்சல், சிக்கலான சுவாசம், பைலோரெக்ஷன், சிரம் பணிதல், மந்தமான தன்மை, சோம்பல், வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் பக்கவாதம்.

முதலுதவி: உள்ளிழுத்தால் நோயாளியை உடனடியாக புதிய காற்றிற்கு கொண்டு வாருங்கள். அவுரை வடாகவும் ஓய்வாகவும் வைத்திருங்கள். தோல் தொடர்பு ஏற்பட்டால், அசுத்தமான ஆடை மற்றும் காலணிகளை அகற்றி சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும். கண்கள் மாசுபட்டால் குறைந்தது 15 நிமிடங்களாவது சுத்தமான தண்ணீரில் கண்களை உடனடியாக நீர்ப்பாசனம் செய்யுங்கள். உட்கொண்டால், ஆசைகளைத் தடுக்க இரைப்பைக் குழாயை கவனமாக மேற்கொள்ளுங்கள். உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும். .

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து இல்லை. அறிகுறியாகவும் ஆதரவாகவும் சிகிச்சையளிக்கவும்.

வெற்றுக் கொள்கலனை அகற்றுவது: சுற்றுச்வழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் தொகுப்புகள், உபரி பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரத்திலிருந்து கழுவதல் போன்றவை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றப்பட வேண்டும். அவற்றின் மறுபயன்பாட்டைத் தடுக்க தொகுப்புகள் வெளியே விடப்படாது. உணவு அல்லது தண்ணீரை சேமிக்க ஒருபோதும் கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு தாவரங்கள் மற்றும் மனித வாழ்விடங்களிலிருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பக நிலைமைகள்: பூச்சிக்கொல்லி கொண்ட தொகுப்புகள் உணவு, உணவு, பானம், விதைகளை சேமிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களிலிருந்து தனித்தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும் அவுவது அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் விசையின் கீழ் தனித்தனி ஆல்மிராவில் வைக்கப்படும். பூச்சிக்கொல்லியின். பூச்சிக்கொல்லியை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் உலர்ந்ததாகவும், நன்கு காற்றோட்டமாகவும், நீராவிகளுடன் மாசுபடுவதைத் தடுக்க போதுமான பரிமாணங்களாகவும் இருக்கும்.

வேதியியல் கலவை:

ஃபென்பைராக்சிமேட் ஏ.ஐ.	5.00% w/w
குழம்பாக்கி : கால்சியம் அல்கைல் பென்சீன் சல்போனேட் கலவை & எத்தாக்சிலேட்டட் தாவர எண்ணெய் அல்லது அதற்கு இணையான	10.00% w/w
C-IX/ அரோமெக்ஸ் சமமான	QS % w/w
மொத்தம்	100.000% w/w

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள் / துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது

કાસકેડ

ફેનપાયરોક્સિમેટ 5% ઊઈ (જંતુનાશક/એકેરિસાઇડ)

ફેનપાયરોક્સિમેટ એ સંપર્ક અને પેટના ઝેરની ક્રિયા સાથે અત્યંત સક્રિય પાયરાઝોલ એકેરિસાઇડ છે. ફેનપાયરોક્સિમેટ લાલ કરોળિયાના જીવાત, ગુલાબી જીવાત અને ચાના જાંબલી જીવાત, મરચાના પીળા જીવાત અને નાળિયેરના ઈરીયોફાઇડ જીવાત, કપાસના જસીડ અને જીવાતને નિયંત્રિત કરવામાં ખૂબ અસરકારક છે.

ભલામણ:

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gram)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in water (Litre)	Waiting period between last spray to harvest(Days)	Re-entry after each application (in hours)
(બ) ઈરીયોફાઇડ		માઇટ 0.056- 0.075 ગ્રામ પ્રતિ પૂક્ષ દીઠ	1.12-1.5મિલિ	1.5 લીટર ઉપર છંટકાવ કરવો.	7	
	વિકાસશીલ બદામ અથવા પૂક્ષ દીઠ યુવાન બટનો					
કોટન	જેસીડ એન્ડ માઇટસ	37.5	750	500	15	
ટીરેડ	સ્પાઇડર માઇટ	15-30	300-600	400-500	7	
	ગુલાબી નાનું છોકરું જાંબલી જીવાત					
નાળિયેર(ક) રસ્ટ એરિઓફિડ માઇટ		0.5ગ્રા. 10 મિલી.		1% યુરિયાના 10 મિલી		
	ખોરાકની	પદ્ધતિ પ્રતિ પૂક્ષ દીઠ		પૂક્ષ દીઠ દ્રાવણ		
મરચાં	પીળા જીવાત	15-30	300-600	300-500	7	

ઉપયોગની દિશા: એપ્લિકેશનમાં વપરાતા સાધનો : નેપસેક સ્પ્રેયર, ફુટ સ્પ્રેયર, રોકિંગ સ્પ્રેયર અને બેટરી ઓપરેટેડ પાવર સ્પ્રેયર ઉચ્ચ વોલ્યુમ સ્પ્રે કરવા માટે. સ્પ્રે સોલ્યુશનની તૈયારી : ફેનપાયરોક્સિમેટ 5% ઊઈના જરૂરી જથ્થામાંથી માપો અને થોડી માત્રામાં પાણી સાથે સારી રીતે ભળી દો. બાકીની માત્રામાં પાણીનો છંટકાવ જરૂરી માત્રામાં પૂરેપૂરી હલનચલન સાથે ઉમેરો.

અરજી કરવાનો સમય:---

સાવચેતીઓ : ઇન્હેલેશન ટાળો: ત્વચા, આંખ અથવા મૌખિક સંપર્ક. ઉપયોગ કરતી વખતે રક્ષણાત્મક કપડાં, મોજા, બૂટ અને ગોગલ્સ પહેરો. સંભાળતી વખતે પીવું, ખાવું, ચાવવું અથવા ધૂમ્રપાન ન કરવું. વાયર સામે સ્પ્રે કરશો નહીં. અરજી કર્યા પછી કપડાં બદલો અને પોતાને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. દૂષિત કપડાંને સારી રીતે ધોઈ લો. સ્પ્રે ઓપરેશનના અંતે, ડોલ/ડ્રમ અને સ્પ્રે પપને ડિટર્જન્ટ પાવડર/સાબુથી ધોવા જોઈએ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ નાખવા જોઈએ. નાળાઓ, તળાવો, જળમાર્ગો વગેરેને તેમાં બચેલી સ્પ્રે સામગ્રી નાખીને અથવા તેમાં સ્પ્રેયર, દૂષિત ડોલ વગેરે સાફ કરીને દૂષિત કરશો નહીં.

ઝેરના લક્ષણો : નાકમાં બળતરા, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, પિલોઈરેક્શન, પ્રણામ, નીરસતા, સુસ્તી, ઝાડા અને લકવો.

પ્રાથમિક સારવાર : જો શ્વાસ લેવામાં આવે તો દર્દીને તાત્કાલિક તાજી હવામાં લઈ જાઓ. તેને ગરમ અને આરામ પર રાખો. ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં, દૂષિત કપડાં અને જૂતા દૂર કરો અને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ લો. જો આંખોમાં દૂષિતતાના કિસ્સામાં ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ માટે સ્વચ્છ પાણીથી તરત જ આંખોને સિંચાઈ કરો. જો ઇન્જેસ્ટ કરવામાં આવે તો એસ્પિરેશનને રોકવા માટે કાળજી સાથે ગેસ્ટ્રિક લેવેજ કરો. તરત જ ચિકિત્સકને બોલાવો.

મારણ: કોઈ ચોક્કસ મારણ નથી. રોગનિવારક અને સહાયક રીતે સારવાર કરો.

ખાલી કન્ટેનરનો નિકાલ : પેકેજ, વધારાની સામગ્રી અને મશીનમાંથી ધોવા વગેરેનો સલામત રીતે નિકાલ કરવો જોઈએ જેથી કરીને પર્યાવરણ કે જળ પ્રદૂષણને અટકાવી શકાય. તેમના પુનઃઉપયોગને રોકવા માટે પેકેજોને બહાર છોડવામાં આવશે નહીં. ખોરાક અથવા પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે ક્યારેય કન્ટેનરનો ઉપયોગ કરશો નહીં. પેકેજોને વનસ્પતિ અને માનવ વસવાટથી દૂર તોડીને દાટી દેવા જોઈએ.

સ્ટોરેજ શરતો : જંતુનાશક ધરાવતાં પેકેજો ખોરાક, ખોરાક, પીણું, બીજ સંગ્રહવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઓરડાઓ અથવા પરિસરથી દૂર અલગ રૂમ અથવા પરિસરમાં સંગ્રહિત કરવા જોઈએ અથવા જથ્થા અને પ્રકૃતિના આધારે લોક અને ચાવી હેઠળ અલગ અલમિરાહમાં રાખવા જોઈએ. જંતુનાશક. જંતુનાશકનો સંગ્રહ કરવા માટેના ઓરડાઓ અથવા પરિસર શુષ્ક, સારી રીતે પ્રકાશિત સારી વેન્ટિલેટેડ અને વરાળ સાથેના પ્રદૂષણને રોકવા માટે પૂરતા પરિમાણોના હોવા જોઈએ.

રાસાયણિક રચના:

ફેનપાયરોક્સિમેટ સામગ્રી (ફ.સ.)	5.00% વ/વ
ઇમલ્સિફાયર : કેલ્શિયમ એલ્કાઇલ બેનેઝીનનું મિશ્રણ સલ્ફોનેટ અને ઇથોક્સીલેટેડ વનસ્પતિ તેલ અથવા સમકક્ષ	10.00% વ/વ
ઈ-ઈડ/અફ્રોળયક્સ્અથવા સમકક્ષ	ચજ્જ% વ/વ
કુલ	100.000% વ/વ

સાવધાની : આ લેબલ/પત્રિકા પર ઉલ્લેખિત સિવાયના અન્ય પાકો પર ઉપયોગ ન કરવો.