ATTACK

PROFENOFOS 50% E.C. INSECTICIDE

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

It is broad spectrum insecticide having contact and stomach action against Lepidoptera pests such as sucking pest & bollworm complex in cotton etc. It contains 500gms profenofos (0-(4-bromo-2-chloro-phenyl)-0-ethyl S-n-propyl-phosphorothioate) per litre of emulsifiable (EC) formulation. Application & Recommendation for use: It is recommended for the control of following insects in cotton.

Crop	Common Name of the pest	Dosage Per Hectares (gm.) a.i.	(mL) Formu-lation	Dilution in water. (Ltr.)	waiting period between Last Spray to harvest (Days)
American-Cotton	Boll worms (Heliothis)	750-1000	1500-2000	500-1000	15
	Jassids	500	1000	500-1000	15
	Aphids, thrips, White flies	500	1000	500-1000	15

compatibility: It is compatible with other commonly used fungicides pesticides, herbicides and fertilizers in the respective crops. It is always advised to locally check compatibility.
Toxicity: The Acute Oral LD50 to rat of is 613 mg/kg. The Acute dermal LD50 to rat >4600 mg/kg. It is slight to moderately irritant to the eyes and skin of rabbits. Directions for use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with through agitation for high volume of application through knapsack sprayers or high volume sprayers.
Storage: 1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or feed. It should be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour. Precautions: Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask, goggles, boots, while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handing or applying the product. Do not store unused spray solution. Do not spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wildlife is expected, in case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. Disposal of containers 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.
Poisoning Symptoms: MILD TO MODERATELY SYMPTOMS: Headache, feeling of weakness, sweating, indisposition, vomiting, nervousness, difficulty in swallowing. SEVERE POISONING: Profuse sweating, eye pains, pinpoint pupils (miosis), muscular twitching, speech disorders (slurred speech), hypersalivation, respiratory distress, colic, heart complaints, convulsions, unconsciousness. First Aid: Remove the affected person from the danger zone to well ventilated room or to fresh air and protect from undercooling. IN CASE OF SUSPECTED POISONING:Immediately call a physician.
IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes and immediately call a physician. IN capital of INGESTION: If medical assistance is not readily available and poisoning symptoms are severe vomiting should be induced by tickling the finger on the back of the patients throat. Next repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. NOTE:Never give anything by mouth to an unconscious person. Antidote: Atropine, in addition oxime preparation such, as Toxogonin under medical supervision. Inject 2-4, mg atropine sulphate (for children 0.5 to 2 mg according to age) i.v. or i.m. every 5 to 10 minutes until signs of atropinisation occur. The patient must remain atropinised for a sufficient length of time (24 to 48 hours) toprevent subsequent poisoning due to delayed resorption.

Chemical Composition :

ப்ரொஃபேனோஃப் (0-(4-ப்ரோமோ-2-க்ளோரோ-ஃபினைல்)-0-எதில் S-n-ப்ரோபில்-ஃபாஸ்ஃபோரோதையோஎட்)	: 50.00% w/w
வேதியல் ஊடாட்டி	: 9.75% w/w
ஆல்கில் ஆர்தோ பென்ஸீன்சல்ஃபோனேட் சோடியம் உப்பு	: 5.25% w/w
சோயாபீன் ஊடாட்டி	: 3.00% w/w
சோல்வென்ட்	: Q.S
மொத்தம்	: 100.00% w/w

அடாக்

ப்ரொஃபெனோஃபாஸ் 50% இ.சி. கீடநாசினி

எச்சரிக்கை : லேபிளில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள பயிர்களுக்கு மட்டுமே இப்பொருளை பயன்படுத்தவும்.

இது சீறும் பேசுக் மேலமலங்கள் நெல்லைக் ஆக்கிக் கிடக்கிறான் பருத்தியுக்கு பெரிய தொகுப்பை கொண்டுள்ளது. இது 500 கிராம் ப்ரொஃபெனோஃபாஸ் (0-(4-ப்ரோமோ-2-க்ளோரோ-ஃபினைல்)-0-எதில் S-n-ப்ரோபில்-ஃபாஸ்ஃபோரோதையோஎட்) ஒரு லிட்டர் (ஈசி) கரைதிறனாக்கி கொண்டுள்ளது. பயன்பாடு மற்றும் பரிந்துரை: பருத்தியில் கீழ்க்கண்ட பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பயிர்	பூச்சியின் பெயர்	அளவு ஹெக்டேருக்கு (கிராம்)	(மிலி)	ஃபார்முலேஷன் (லிட்.)	தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு இடைப்பட்ட வெண்பகுதி நாட்கள்
பருத்தி	காய்ப்புழு (ஹெலியோதிஸ்)	750-1000	1500-2000	500-1000	15 நாள்
	அசுவணி	500	1000	500-1000	15 நாள்
	பேன்,வெள்ளை ஈ, இலைப்பேன்	500	1000	500-1000	15 நாள்

பொருந்தும் தன்மை: ப்ரொஃபெனோஃபாஸ் மற்ற பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பூஞ்சாணக் கொல்லிகள், கிருமிநாசினிகள், களைக்கொல்லிகள் மற்றும் உரங்களுடன் பொருந்தும் தன்மை கொண்டது. உபயோகப்படுத்தும் முன்னதாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளின் பொதிந்தாள் ப்ரொஃபெனோஃபாஸ் 50% இ.சி. கீடநாசினுக்கு விலைவைக்கிறது.

பயிர்	கட்டுப்படுத்தப்படும் பூச்சிகளின் பெயர்	தெளிப்பு கரைசலை தயாரிக்க (கிராம்)	(மிலி)	(லிட்டர்)	கலந்திருக்க வேண்டிய நாட்கள்
பருத்தி	காய்ப்புழு (ஹெலியோதிஸ்)	750-1000	1500-2000	500-1000	15 நாள்
	அசுவணி	500	1000	500-1000	15 நாள்
	பேன்,வெள்ளை ஈ, இலைப்பேன்	500	1000	500-1000	15 நாள்

தெளிப்பிற்குகான சமயம் பூச்சிகளின் தெளிப்புமுறைப் பொருத்தகரமும். 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் மறுபடியும் மறுபடியும் தெளிக்கலாம். பேலே கொழுக்கப்பட்டுள்ள நீரின் அளவு அதிக அளவு தெளிப்பும் பம்ப்பிற்குகலும். கலவையை சீராக தயாரிக்க அதனை நன்றாகவும் கலக்கவும். கை,முகம்,கண்ணாடி தெளிக்கக் கூடாது. தெளிப்பிற்குகான பயன்பெறுத்தப்படும் சாதனங்கள்: நாப்சாக் தெளிப்பான், லம்டிக்-அப் பம்ப் முதலியவாகும். முன்னெச்சரிக்கைகள் மற்றும் எச்சரிக்கை: 1.கூலித்தகுதிகள், வளர்ப்பு பிராணிகள் மற்றும் பிரயோசனமுள்ளகூடாதவைகளுக்கு கட்டாயவாழு வைக்கக்கூடாது. 2. உபயோகிப்பதற்கு முன்பு பயக்கக்கவில்லை மற்றும் மருந்தை உட்கலவியிப்பதற்குமுன் தனிக்கக்கூடாது. 3. மருந்தை வைப்பறைகளிலோ மற்றும் தெளிக்குமிடமோ மருந்தை வைக்கக்கூடாது. 4. மருந்தை வைப்பறைகளிலோ மேலே தெளிக்குமிடமோ தெளிக்கக்கூடாது. உணவையோ குடிக்கவோ கூடாது. விஷத்திற்குகான அறிகுறிகள் : தலைவலி, மயக்கம், வாந்தி, வலிமிறுவலி, அதிகமான வியர்த்தல், பலவீனம், சளுதடையிடு, கண்பார்வையை மங்குதல் முதலியவைகள் ஏற்படும்பட்டு. முதலுதவி : சுமுகமத்தில் பட்டவருக்குகல் அதி கமான சோர்வும் நீக்கும் விட்டு வருவதைம். மாசுபட்ட ஆடைகளை கலையவும். மருந்துடன் சிகிச்சை பெறவும். உட்கொண்டிருந்தால், உடனடியாக வாந்தி வருவதைர் அவசுகக்கவும். தன் நிலையில் இருந்தால் தண்ணீரோ பாலோ கொடுக்கவும். வாந்தி வருக்கத் தூண்டாதீர் உட்கலவாதித்திருந்தால், கத்தமான காற்றிற்கு கொண்டுச்செல்லவும். கண்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தால் அதிகமான தண்ணீரால் விட்டு கழுவவும். தற்க முறிவு : அட்ரோபின் சல்ஃபேட். ஒர் நச்சு முறிவாகும். விஷத்திற்கு அறிகுறியிலை நீக்க 2-4 மிலி மருந்தை 10-15 நிமிடங்களுக்கு இடைவெளியிலிருந்து நரம்பு ஊடாக ஏற்றவும். [0-5 வயது மருந்தை 5-10 நிமிடங்களுக்கு இடைவெளியில்] கொடுப்பது முறை [கொக்கல்களான தனியான அலமாரியிலே அல்லது கட்டிடங்களிலுள்ள தனியான அலமாரியிலேயே சேமித்து பூட்டி வைக்கவும். அறைகளோ கட்டிடங்களோ நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்த்த, நல்ல வெளிச்சமுள்ளதாகவும். காற்றோட்டமுள்ளதாகவும். காற்றோட்டமுள்ளதாகவும். காற்றோட்டமுள்ளதாகவும், பொதுமான பரப்பளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும். மருந்தை உணவு பொருட்களோடு சேமித்து வைக்கக் கூடாது. கொக்கல்களின்கீழ் இருப்பவர்கள் மற்றும் காற்றிற்கு வெளியே கொண்டுவரப்பட்டு,இடிப்பதாக. கொக்கல்களை பராமரப்பவர் முறைமறிப்பவர் அப்பும் பதிந்தவர். அவைகளை மறுபுறமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வெளியிலே விட்டு வைக்கக்கூடாது. அவைகளை உடைத்து குடியிருப்புக்கு அருகே அப்பால் மண்ணில் புதைக்க வேண்டும். உபயோகத்திற்கு முன் பிரதாந்தரை கவனமாக படிக்கவும். உத்தேசமாகும் : இத்தயாரிப்பின் உபயோகம் எங்கள்கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறைப்படி கலேத்து கலவைகப்பும் இத்தயாரிப்பின் ஒரே சீரான தரத்தைத் தவிர வேறெதற்கும் தாங்கள் பொறுப்பேற்கமுடியாது.

ப்ரொஃபெனோஃபாஸ்	50.00% w/w
(89 % w/w தூய்மை)	
வேதியல் ஊடாட்டி	9.75% w/w
ஆல்கில் ஆர்தோ பென்ஸீன்சல்ஃபோனேட் சோடியம் உப்பு	5.25% w/w
சோயாபீன் ஊடாட்டி	3.00% w/w
சோல்வென்ட்	Q.S
மொத்தம்	100.00% w/w

अटाक

प्रोफेनोफॉस ५०% ई.सी. कीटनाशक

चेतावनी : इस लेबल/इश्तहिकेवर निर्दिष्ट केलेल्या पीकांशिवाय अन्य कृप्तल्याही पीकांवर वापर करावा नाही.

एक सर्वपरिचित कीटनाशक है जिसका प्रभाव कडाम में आकर्षाने संपर्कीदाता कीटकों जैसे की कृप्तिडा और सूसर्व वाले किटक आदि कीटक इससे संबंधे आपेश या पेट में जाकर होता है। इसके घुलनशील कॉन्सन्ट्रेट (ई.सी.) रचना के प्रत्येक लिटर में 500 ग्राम (0-(4-ब्रोमो-२-क्लोरो-फिनाइल)-0-प्रोपाइल-एस-एन-प्रोपील-फॉस्फोरोथियोट) के क्रियाशील घटक आते. तेहत फवाराघ्यासाठी शिफारशी की कापास आढळणाऱ्या पढील कीटकांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केली जाते .

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	शिफारस केलेली मात्रा प्रति हेक्टर (ग्रॅम)	(मि.लि.)	प्रयोगाच्या वेळी पाण्यामध्ये प्रमाण (लिटर)	शेवटची फवारणी व काढणी या दरम्यान जाड हंगाम कालावधी
कपाशी	अमेरिकन बोंडअळी (हेलीकोव्हिर्पा)	७५०-१०००	१५००-२०००	५००-१०००	१५ दिवस
	मावा, तुडतुडे	५००	१०००	५००-१०००	१५ दिवस
	फुलकिडे, थ्रीप्स	५००	१०००	५००-१०००	१५ दिवस

**विक्रय क्षमता : सर्वसाधारणपणे वापरण्यात येणारी कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके व खते यांच्या सोबत मिसळून वापरता येते. ही सर्व रिकामे डबे तेथे पुन्हा वापरू नयेत. दहशतग्रस्त पाणी योग्य राहित. विषारीपणा : (प्रोबेव) उंदराच्या तोंडा वाटे (एल. डी. ५०) यापाच्या शारीरिक वजनाच्या एक किलोमिट १३६ मि.ग्रा. (आणि अंशतच त्वचेवर (एल.डी. ५०) त्याच्या शारीरिक वजनाच्या एक किलोमिट ४६०० मि.ग्रा. विषारी असते. प्रोबेव हे सशाच्या डोळ्यास व त्वचेस सौम्य ते मध्यम उपद्रवकारक आहे.वापरण्याची पद्धत : आवश्यक तेवढे औषध बोटुल पण आणि ते थोडाशा पाण्यात मिसळा. नेपसॅक सेप्रेर, हेडग्रुकीपान सेप्रेर वापरीताना फवारणीचे मात्रा वापरावयाचे असेल तर हवारी पिरेशा केलयामुळ उसेले पाणी ग्लास वापर करा.सावधान: १) कीटकनाशक असलेले मूळ स्वरूपातील वर खोके हे, अन्न वस्तू विशेष : खाद्य पदार्थ साठवलेल्या किंवाघाण्यास वेगळ्या खोलीत अथवा इमारतीं वेडले पाहिजे. किंवा कीटकनाशक स्वतंत्र कपाटात कडी कुलपात बंद करून ठेवावे . २) कीटकनाशकाची साठवण करावयास खोलाच अथवा जागा फवारणी करावयास योग्य, भारूप उबेव व खेळती हवा असणाऱ्या आणि योग्य आकारात्मा. मुलगे वापरलेले पुरवण होणार नाहि. वापरणाऱ्यानी घ्यावयाची दक्षता : द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नकात. द्रावण तयार करताना हलवण्यासाठी काठीचा सपर करावा . त्वचेशी संपर्क टाळण्यासाठी हातमोजे घालावे. औषध हाताने किंवा डोळ्यातील त्यास संपर्क येऊ देवावे. फवारणी करताना संरक्षक पोषाख, रबरी हातमोजे, बूट, गोंडाळा मुखवटा अथवा मूख प्रतिबंधक आवरण घालावे जेणे करून कीटकनाशकाचा संतिराणी प्रत्यक्ष संपर्क येणार नाही. शेतात तोंडाने फुक नका. कीटकनाशक हाताळताना किंवा फवारणी करताना पाणी या धूम्रपान सही करना नाहिए. इतरांमान व किंवा जाए एवा घोषन का सांहाल मत कीजिए। प्रतिदिन प्रयोग के बाद शरीर, वातिल्यों, तथा अन्य वर्तनों को पानी से धोएं। कार्य समाप्त होने के बाद हो साबुन और हो साबुन और हो साबुन से धोएं। वर्क्ड हुई सामग्री को जो झरनों, तालाबों, नहरों आदी में बाहाव या थ्रोयगे, दृष्टिन वातिल्यों आदि को इसमें योक्त उपकरों दृष्टिन मत कीजिए यदि मधुमक्खियां सक्रिय हो तो ही मत कीजीए निवारीण की गई मात्रा में प्रयोग किये गए कम जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है। यदि विष खाने कोई भी विषा दिखाई दे तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें। विषाक्तता का निपटारा : १. कन्टेनर या प्रदूषण स्वरूप के रिक्त डब्बे को फिर से प्रयोग में लाने से रोकने के लिए उन्हें नष्ट कर दें। २. रिक्त डब्बे को बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाए। ३. रिक्त डब्बे को तोड़ कर बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाए।

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
कीटनाशक का उपयोग करने से पहले लेबल और पर्चा पढ़ें
इस्तेमाल करने से पहले सारी चीजें पढ़ें तरह पढ़िये।

Manufactured by :
AGASTYA AGRO LIMITED
UNIT-I : Survey No. 47, Murahari Pally -501 401
Medak Dist.,Telangana State.
Mfg.No: 027/TS-IML/2017 (Old Lic. no:2201997-98, Dt.06-07-1997)
UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Regd.No.: CIR-36,199/2001-Profenofos (EC)-386

AGASTYA

ATTACK

PROFENOFOS 50% E.C. INSECTICIDE

अटाक

प्रोफेनोफॉस ५०% ई.सी. कीटनाशक

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
बच्चों से दूर रखिये
मकुळेही सिगदंडवै दुरवेडि.

विष
POISON

अटाक्

प्रोफेनोफॉस 50% इ.सी. कीटनाशक

सावधान : लेबल/पत्रकावर निर्दिष्ट केलेल्या पीकांशिवाय अन्य कृप्तल्याही पीकांवर वापर करावा नाही.

हा विविध कीटकांवर परिणामकारक स्पर्शजन्य व पोटविष किंवा असणारे कीटकनाशक आहे. कापासाठीच लेपिडोप्टेरा कीटक जसे स्पर्शाकरू कीटक व बोंडअळ्या (उदा. हिलीओथिस) या कीटकांवर परिणामकारक कीटकनाशक आहे. १ लि. करता सध्या ५०० ग्राम प्रोफेनोफॉस (ओ-(४-ब्रोमो-२-क्लोरो-फिनाईल)-ओ-इथाइल एस-एन-प्रोपील-फॉस्फोरोथियोट) हे क्रियाशील घटक आहे. तेहत फवाराघ्यासाठी शिफारशी की कापास आढळणाऱ्या पढील कीटकांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केली जाते .

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर प्रति हेक्टर क्रियाशील घटक ग्रॅम	(मि.ली.)	प्रयोगाच्या वेळी पाण्यामध्ये प्रमाण (लि.)	शेवटची फवारणी व काढणी या दरम्यान जाड हंगाम कालावधी
कपाशी	अमेरिकन बोंडअळी (हेलीकोव्हिर्पा)	७५०-१०००	१५००-२०००	५००-१०००	१५ दिवस
	मावा, तुडतुडे	५००	१०००	५००-१०००	१५ दिवस
	फुलकिडे, थ्रीप्स	५००	१०००	५००-१०००	१५ दिवस

**विक्रय क्षमता : सर्वसाधारणपणे वापरण्यात येणारी कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके व खते यांच्या सोबत मिसळून वापरता येते. ही सर्व रिकामे डबे तेथे पुन्हा वापरू नयेत. दहशतग्रस्त पाणी योग्य राहित. विषारीपणा : (प्रोबेव) उंदराच्या तोंडा वाटे (एल. डी. ५०) यापाच्या शारीरिक वजनाच्या एक किलोमिट १३६ मि.ग्रा. (आणि अंशतच त्वचेवर (एल.डी. ५०) त्याच्या शारीरिक वजनाच्या एक किलोमिट ४६०० मि.ग्रा. विषारी असते. प्रोबेव हे सशाच्या डोळ्यास व त्वचेस सौम्य ते मध्यम उपद्रवकारक आहे.वापरण्याची पद्धत : आवश्यक तेवढे औषध बोटुल पण आणि ते थोडाशा पाण्यात मिसळा. नेपसॅक सेप्रेर, हेडग्रुकीपान सेप्रेर वापरीताना फवारणीचे मात्रा वापरावयाचे असेल तर हवारी पिरेशा केलयामुळ उसेले पाणी ग्लास वापर करा.सावधान: १) कीटकनाशक असलेले मूळ स्वरूपातील वर खोके हे, अन्न वस्तू विशेष : खाद्य पदार्थ साठवलेल्या किंवाघाण्यास वेगळ्या खोलीत अथवा इमारतीं वेडले पाहिजे. किंवा कीटकनाशक स्वतंत्र कपाटात कडी कुलपात बंद करून ठेवावे . २) कीटकनाशकाची साठवण करावयास खोलाच अथवा जागा फवारणी करावयास योग्य, भारूप उबेव व खेळती हवा असणाऱ्या आणि योग्य आकारात्मा. मुलगे वापरलेले पुरवण होणार नाहि. वापरणाऱ्यानी घ्यावयाची दक्षता : द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नकात. द्रावण तयार करताना हलवण्यासाठी काठीचा सपर करावा . त्वचेशी संपर्क टाळण्यासाठी हातमोजे घालावे. औषध हाताने किंवा डोळ्यातील त्यास संपर्क येऊ देवावे. फवारणी करताना संरक्षक पोषाख, रबरी हातमोजे, बूट, गोंडाळा मुखवटा अथवा मूख प्रतिबंधक आवरण घालावे जेणे करून कीटकनाशकाचा संतिराणी प्रत्यक्ष संपर्क येणार नाही. शेतात तोंडाने फुक नका. कीटकनाशक हाताळताना किंवा फवारणी करताना पाणी या धूम्रपान सही करना नाहिए. इतरांमान व किंवा जाए एवा घोषन का सांहाल मत कीजिए। प्रतिदिन प्रयोग के बाद शरीर, वातिल्यों, तथा अन्य वर्तनों को पानी से धोएं। कार्य समाप्त होने के बाद हो साबुन और हो साबुन और हो साबुन से धोएं। वर्क्ड हुई सामग्री को जो झरनों, तालाबों, नहरों आदी में बाहाव या थ्रोयगे, दृष्टिन वातिल्यों आदि को इसमें योक्त उपकरों दृष्टिन मत कीजिए यदि मधुमक्खियां सक्रिय हो तो ही मत कीजीए निवारीण की गई मात्रा में प्रयोग किये गए कम जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है। यदि विष खाने कोई भी विषा दिखाई दे तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें। विषाक्तता का निपटारा : १. कन्टेनर या प्रदूषण स्वरूप के रिक्त डब्बे को फिर से प्रयोग में लाने से रोकने के लिए उन्हें नष्ट कर दें। २. रिक्त डब्बे को बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाए। ३. रिक्त डब्बे को तोड़ कर बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाए।

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
कीटनाशक का उपयोग करने से पहले लेबल और पर्चा पढ़ें
इस्तेमाल करने से पहले सारी चीजें पढ़ें तरह पढ़िये।

Manufactured by :
AGASTYA AGRO LIMITED
UNIT-I : Survey No. 47, Murahari Pally -501 401
Medak Dist.,Telangana State.
Mfg.No: 027/TS-IML/2017 (Old Lic. no:2201997-98, Dt.06-07-1997)
UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Regd.No.: CIR-36,199/2001-Profenofos (EC)-386

अटाक्

प्रोफेनोफॉस 50% इ.सी. कीटनाशक

सावधान : लेबल/पत्रकावर निर्दिष्ट केलेल्या पीकांशिवाय अन्य कृप्तल्याही पीकांवर वापर करावा नाही.

हा विविध कीटकांवर परिणामकारक स्पर्शजन्य व पोटविष किंवा असणारे कीटकनाशक आहे. कापासाठीच लेपिडोप्टेरा कीटक जसे स्पर्शाकरू कीटक व बोंडअळ्या (उदा. हिलीओथिस) या कीटकांवर परिणामकारक कीटकनाशक आहे. १ लि. करता सध्या ५०० ग्राम प्रोफेनोफॉस (ओ-(४-ब्रोमो-२-क्लोरो-फिनाईल)-ओ-इथाइल एस-एन-प्रोपील-फॉस्फोरोथियोट) हे क्रियाशील घटक आहे. तेहत फवाराघ्यासाठी शिफारशी की कापास आढळणाऱ्या पढील कीटकांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केली जाते .

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर प्रति हेक्टर क्रियाशील घटक ग्रॅम	(मि.ली.)	प्रयोगाच्या वेळी पाण्यामध्ये प्रमाण (लि.)	शेवटची फवारणी व काढणी या दरम्यान जाड हंगाम कालावधी
कपाशी	अमेरिकन बोंडअळी (हेलीकोव्हिर्पा)	७५०-१०००	१५००-२०००	५००-१०००	१५ दिवस
	मावा, तुडतुडे	५००	१०००	५००-१०००	१५ दिवस
	फुलकिडे, थ्रीप्स	५००	१०००	५००-१०००	१५ दिवस

**विक्रय क्षमता : सर्वसाधारणपणे वापरण्यात येणारी कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके व खते यांच्या सोबत मिसळून वापरता येते. ही सर्व रिकामे डबे तेथे पुन्हा वापरू नयेत. दहशतग्रस्त पाणी योग्य राहित. विषारीपणा : (प्रोबेव) उंदराच्या तोंडा वाटे (एल. डी. ५०) यापाच्या शारीरिक वजनाच्या एक किलोमिट १३६ मि.ग्रा. (आणि अंशतच त्वचेवर (एल.डी. ५०) त्याच्या शारीरिक वजनाच्या एक किलोमिट ४६०० मि.ग्रा. विषारी असते. प्रोबेव हे सशाच्या डोळ्यास व त्वचेस सौम्य ते मध्यम उपद्रवकारक आहे.वापरण्याची पद्धत : आवश्यक तेवढे औषध बोटुल पण आणि ते थोडाशा पाण्यात मिसळा. नेपसॅक सेप्रेर, हेडग्रुकीपान सेप्रेर वापरीताना फवारणीचे मात्रा वापरावयाचे असेल तर हवारी पिरेशा केलयामुळ उसेले पाणी ग्लास वापर करा.सावधान: १) कीटकनाशक असलेले मूळ स्वरूपातील वर खोके हे, अन्न वस्तू विशेष : खाद्य पदार्थ साठवलेल्या किंवाघाण्यास वेगळ्या खोलीत अथवा इमारतीं वेडले पाहिजे. किंवा कीटकनाशक स्वतंत्र कपाटात कडी कुलपात बंद करून ठेवावे . २) कीटकनाशकाची साठवण करावयास खोलाच अथवा जागा फवारणी करावयास योग्य, भारूप उबेव व खेळती हवा असणाऱ्या आणि योग्य आकारात्मा. मुलगे वापरलेले पुरवण होणार नाहि. वापरणाऱ्यानी घ्यावयाची दक्षता : द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नकात. द्रावण तयार करताना हलवण्यासाठी काठीचा सपर करावा . त्वचेशी संपर्क टाळण्यासाठी हातमोजे घालावे. औषध हाताने किंवा डोळ्यातील त्यास संपर्क येऊ देवावे. फवारणी करताना संरक्षक पोषाख, रबरी हातमोजे, बूट, गोंडाळा मुखवटा अथवा मूख प्रतिबंधक आवरण घालावे जेणे करून कीटकनाशकाचा संतिराणी प्रत्यक्ष संपर्क येणार नाही. शेतात तोंडाने फुक नका. कीटकनाशक हाताळताना किंवा फवारणी करताना पाणी या धूम्रपान सही करना नाहिए. इतरांमान व किंवा जाए एवा घोषन का सांहाल मत कीजिए। प्रतिदिन प्रयोग के बाद शरीर, वातिल्यों, तथा अन्य वर्तनों को पानी से धोएं। कार्य समाप्त होने के बाद हो साबुन और हो साबुन और हो साबुन से धोएं। वर्क्ड हुई सामग्री को जो झरनों, तालाबों, नहरों आदी में बाहाव या थ्रोयगे, दृष्टिन वातिल्यों आदि को इसमें योक्त उपकरों दृष्टिन मत कीजिए यदि मधुमक्खियां सक्रिय हो तो ही मत कीजीए निवारीण की गई मात्रा में प्रयोग किये गए कम जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है। यदि विष खाने कोई भी विषा दिखाई दे तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें। विषाक्तता का निपटारा : १. कन्टेनर या प्रदूषण स्वरूप के रिक्त डब्बे को फिर से प्रयोग में लाने से रोकने के लिए उन्हें नष्ट कर दें। २. रिक्त डब्बे को बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाए। ३. रिक्त डब्बे को तोड़ कर बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाए।

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
कीटनाशक का उपयोग करने से पहले लेबल और पर्चा पढ़ें
इस्तेमाल करने से पहले सारी चीजें पढ़ें तरह पढ़िये।

Manufactured by :
AGASTYA AGRO LIMITED
UNIT-I : Survey No. 47, Murahari Pally -501 401
Medak Dist.,Telangana State.
Mfg.No: 027/TS-IML/2017 (Old Lic. no:2201997-98, Dt.06-07-1997)
UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Regd.No.: CIR-36,199/2001-Profenofos (EC)-386

அட்டாக்

புரொஃபினோபோஸ் 50% இ.சி. பூச்சிக்கொல்லி

எச்சரிக்கை: இலேபிள்/கையேட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள பயிர்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தவும்.

பயிர்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தவும். இது சீறும் மருந்தாகும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பருத்தியில் மிகச் சிறந்த பூச்சிக்கொல்லியாகும். இது 500 கிராம் புரொஃபினோபோஸ் (0-(4-ப்ரோமோ-2-க்ளோரோ-ஃபினைல்)-0-எதில் S-n-ப்ரோபில்-ஃபாஸ்ஃபோரோதையோஎட்) ஒரு லிட்டர் (ஈசி) கரைதிறனாக்கி கொண்டுள்ளது. பயன்பாடு மற்றும் பரிந்துரை: பருத்தியில் கீழ்க்கண்ட பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பயிர்	கட்டுப்படுத்தப்படும் பூச்சிகளின் பெயர்	ஹெக்டேருக்கான அளவு கலப்பான் (கிராம்)	(மிலி)	(லிட்டர்)	தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு இடைப்பட்ட வெண்பகுதி நாட்கள்
பருத்தி	காய்ப்புழு (ஹெலியோதிஸ்)	750-1000	1500-2000	500-1000	15 நாள்
	அசுவணி	500	1000	500-1000	15 நாள்
	பேன்,வெள்ளை ஈ, இலைப்பேன்	500	1000	500-1000	15 நாள்

பொருந்தும் தன்மை: ப்ரொஃபெனோஃபாஸ் மற்ற பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பூஞ்சாணக் கொல்லிகள், கிருமிநாசினிகள், களைக்கொல்லிகள் மற்றும் உரங்களுடன் பொருந்தும் தன்மை கொண்டது. உபயோகப்படுத்தும் முன்னதாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளின் பொதிந்தாள் புரொஃபினோபோஸ் 50% இ.சி. கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

புரொஃபினோபோஸ்	50.00% w/w
(89 % w/w தூய்மை)	
வேதியல் ஊடாட்டி	9.75% w/w
ஆல்கில் ஆர்தோ பென்ஸீன்சல்ஃபோனேட் சோடியம் உப்பு	5.25% w/w
சோயாபீன் ஊடாட்டி	3.00% w/w
சோல்வென்ட்	Q.S
மொத்தம்	100.00% w/w

अटाक

प्रोफेनोफॉस ५०% ई.सी. कीटनाशक

चेतावनी : इस लेबल/इश्तहिकेवर निर्दिष्ट केलेल्या पीकांशिवाय अन्य कृप्तल्याही पीकांवर वापर करावा नाही.

हा विविध कीटकांवर परिणामकारक स्पर्शजन्य व पोटविष किंवा असणारे कीटकनाशक आहे. कापासाठीच लेपिडोप्टेरा कीटक जसे स्पर्शाकरू कीटक व बोंडअळ्या (उदा. हिलीओथिस) या कीटकांवर परिणामकारक कीटकनाशक आहे. १ लि. करता सध्या ५०० ग्राम प्रोफेनोफॉस (ओ-(४-ब्रोमो-२-क्लोरो-फिनाईल)-ओ-इथाइल एस-एन-प्रोपील-फॉस्फोरोथियोट) हे क्रियाशील घटक आहे. तेहत फवाराघ्यासाठी शिफारशी की कापास आढळणाऱ्या पढील कीटकांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केली जाते .

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर प्रति हेक्टर क्रियाशील घटक ग्रॅम	(मि.ली.)	प्रयोगाच्या वेळी पाण्यामध्ये प्रमाण (लि.)	शेवटची फवारणी व काढणी या दरम्यान जाड हंगाम कालावधी
कपाशी	अमेरिकन बोंडअळी (हेलीकोव्हिर्पा)	७५०-१