थ्रिल

लैम्बडासायहैलोथ्रीन ४.९ % सी.एस.

कीटनाशक

लॅम्बडा–सायहेलोथ्रिन ४.९% सी.एस. एक कॅप्सूल सस्पेन्शन सूत्रीकरण आहे, ह्या मध्ये सक्रिय घटक पाण्यात लटकाणे नान्हा कॅप्सूल मध्या बंध घ्यावे आणि शिंपडणाचे टीपा कीटकावर त्वचेवर पडले ह्या बाहेर होते. ह्याची शिफारस कापूसच्या डोडाची सुंडी, भातावरचे पत्ता मोडक, वांगीचे खोड कीट आणि फळ छेदक, भेंडी, टॉमटोच्या फळ छेदक, द्राक्षावरील चुर्दा, माधु, बीटल आणि मिर्चीच्या चुर्दा आणि फळ छेदक कीटकांवर नियंत्रण साठी करते.

वापराच्या पद्धति :

पीक	कीटकांवर सामान्य नाव	प्रति हेक्टर प्रमाण ए.आय. (ग्राम)	फार्म्युलेशन तयार औषध (मि.ली.)	पाण्याचे मिश्रण (ली.)	शेवटली फवारणी व कांपणीतील अन्तर (दिवस)
कापूस	डोडाचा सुंडी	२५	५००	५००	२१
भात	पत्ता मोडक, खोड कीट	१२.५	२५०	५००	१५
वांगी	खोड कीट, फळ छेदक	१५.०	३००	५००	५
भेंडी	फळ छेदक	१५.०	३००	५००	५
टॉमटो	फळ छेदक	१५.०	३००	५००	५
द्राक्ष	चुर्दा आणि बीटल	१२.५	२५०	५००–१०००	७
मिर्ची	चुर्दा आणि फळ छेदक कीट	२५	५००	५००	५

वापरावयाची साधने :

पौध सुरक्षा यंत्र : हाय व्हॉल्यूम स्प्रेयरने करला येले. त्यासाठी नॅपसॅक स्प्रेयर किंवा पावर स्प्रेयर वापर करा.

वापरणाऱ्यानी घ्यावयाची काळजी :

मिश्रण तयार करता आणि शिंपडण वेळ डोळे आणि मुखवाटे संपर्क होऊ देऊ शकतात नये. शिंपडण करते वेळी सुरक्षा साधन कपडे अप्रान, हातमोजे, मास्क, गम आणि बूटचे वापर करा. खाणे, पिणे किंवा धूम्रपान करता पूर्व दूषित अंगावर धुवून. पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषितहोणार नाही याची काळजी घेऊन करावी.

विषबाधेची लक्षण : सामान्य लक्षण इतर पाइरीथाइड समान होते. गिळले गेल्यास वांती, पोटात दर्द, किंवा अलर्जीचे लक्षण दिसून शकतात. जास्त मात्रा औषध घेऊन नाडी मंडल अशांत होऊ शकतात. अगवा जारदार परिणाम झाल्या रोग्यात अशक्ताणा वाळग आतगार व मुळाण स्नायुथी शिथीलता तोंड व हातपाय गळाठणे व मायेस्पेनिया आणि हृदय क्रियेवर परिणाम लक्षणे दिसून येतील.

ह्या लक्षण जास्तीत जास्त बेशुद्धापणे हात किंवा हातमोजा द्वारे मुखवाटे संपर्क करण्यास होतात. ह्या प्रभाव २४ कलाक शुद्धा होऊ शकतात. कोणत्याही जास्त प्रभावचे लक्षण दिसून नये. डोळे दूषित होणे जळन होऊ शकतात.

प्रथमोपचाराचे उपाय : जर श्वासनात, गेल्यास, रोग्याला मोकळ्या हवेत न्या. जर शरीरावर सोडल्यास खूप पाण्याने धुवावे. गिळले गेल्यास उलटी काढावे आणि तोंडावाटे कोणतेही पदार्थ देउ नये. गॅस्ट्रिक लव्हेज करावी. भरपूर ताजे पाणी वापरून डोळे हबके मारून धुवा.

निवारक उपाय : कोणताही निश्चित निवारक उपाय नाहीं. लक्षणानुसार आणि मदत होईल असा उपचार करा. अलर्जीची लक्षणे दिसून आल्यास, अण्टिहिस्टामिन औषधे दिली तरी चालतील.

डबे खोक्यांची विल्हेवाट : रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापरली जाऊ नयेत म्हणून उघडझावर तेवू नयेत. पॅकेजिस किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विल्हेवाट सुरक्षित प्राकरे आणि पर्यावरण किंबा पाणी प्रदूषितहोणार नाही याची काळजी घेऊन करावी.

सांठवण : कीटनाशक साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. कीटनाशकच्या साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेलती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायणिक घटक :

लेम्बडा सायहेलोथ्रिन स.घ.	४.९०० % व/व
पॉली आल्कलीन स.घ.	०.२६० % व/व
डोडिसाइल बेंझीन सल्फोनेटचे सोडियम साल्ट	०.०९० % व/व
पोलिमरिक फैटी एस्टर	०.४३० % व/व
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	०.२२० % व/व
हायड्रेड अल्युमिनियम मेग्निशियम सिलिकेट	१.४४० % व/व
टेट्रायोडियम पायरोफासफेट	०.०६० % व/व
येनथन गम	०.११० % व/व
टेटानियम डायाक्साईड	०.५१० % व/व
प्रापिलीन ग्लायकोल	०.०४० % व/व
पॉलीडायमिथाइल सिलोग्झेन	०.०२० % व/व
सलफ्युरिक एसिड	०.२०० % व/व
१,२–बेन्झिसोथयझेलिन	०.४९० % व/व
अम्मोनियम हायड्रोक्साईड	०.११० % व/व
अरोमेटिक हायड्रोकार्बन	२.८६० % व/व
पालीयूरिया	०.८२० % व/व
पाणी	पर्याप्त प्रमाण
एकूण	१००.००० % व/व

ह्या लेबलामधील/पत्रिकामधील निर्देशित पिकांच्या अतिरिक्त अन्य पिकांच्या साठी उपयोग प्रतिबंधित आहे.

थ्रिल्

ಲೇಂಬಡಾಸೈಹೆಲೊಥ್ರಿನ್ 4.9% ಸಿ.ಎಸ್.

... ಕೀಟನಾಶನಿ

ಲೇಂಬಡಾಸೈಹೆಲೊಥ್ರಿನ್ 4.9% ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕಾರ್ಯಬಾಹಕಬಾಗಿದ್ದು ಇದರ ದ್ರಾವ್ಯ ರೂಪದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೆಳು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಒಣಗಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಗೆ ಬೋಲವರ್ಮ್, ಭತ್ತದ ಸ್ಟೇಮ ಬೋರರ್ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ಬದನೆಕಾಯಿ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್, ದ್ರಾಕ್ಷಗಳು ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೀ ಬೀಟಲ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಪೋಡ್ ಬೋರರ್ ಹುಳುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದರತಿದೆ.

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವಿನ ನಡುವೆ ಕಾಯಿಯಿಕೆ (ದಿನ)
ಹತ್ತಿ	ಬೋಲವರ್ಮ್	25	500	500	21
ಭತ್ತ	ಸ್ಟೇಮ ಬೋರರ್, ಲೀಫ್ ಫೋಲ್ಡರ್	12.5	250	500	15
ಬದನೆಕಾಯಿ	ಷೂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್	15.0	300	500	5
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್	15.0	300	500	5
ಟಮ್ಯಾಟೋ	ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್	15.0	300	500	5
ದ್ರಾಕ್ಷ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಫ್ಲೀ ಬೀಟಲ್	12.5	250	500-1000	7
ಚಿಲ್ಲಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಪೋಡ್ ಬೋರರ್	25	500	500	5

ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷತೆಯ ಸಾಧನ : ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಪಾವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಬಳಕೆದಾರರ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ:

ವಿಡೀಸೈಡ್‌ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತಗುಲದಂತೆ, ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರದಂತೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಸೋಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸ ಬೇಕು. ವಿಷ ಮಾಯಾವಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೀಟನಾಶನಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಹೊಗೆ ಕುಡಿಯ ಬಾರದು ಎಲೆ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶನಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ.

ವಿಷ ಪ್ರಭಾವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಾಲೋಥ್ರಿನ್‌ಗಾ ದೇಹದೊಳಗಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸೀನು ಬರುವುದು, ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಉರಿ, ಡೈಹೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯೇ ಮುಂತಾದ ರೋಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ,ನಾಳದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಟ್ರೆಮೋರ್ಸ್, ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ, ನರಗಳ ನಿಶ್ಕ್ತಿ, ಅರೆ ಮಂಪರು, ಕೋಮಾ ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೋಕಿದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚರ್ಮ ಬಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ವಿಕ್ಷಿರಿಕೆ ವಹಿಸದೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೈ ಮತ್ತು ಕೈಚೀಲಗಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು 24 ಘಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಾಣುವಂಥಾದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೋಕಿದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಬಲದ ನಿಶ್ಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

ವಿಷ ವಾಯುವನ್ನು ಹೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ವಿಷ ವಾಯುವನ್ನು ಹೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆದು.

ಪ್ರತಿರೋಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಟ್ರೀಟಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ನೀಡಿ. ಎಲರ್ಜಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ಕೊಡಬಹುದು.

ವಿಸರ್ಜನೆ :

ಖಾಲಿಯಾದ ಚಟ್ಟಗಳನ್ನು ಒಡದು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಳದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೊತುಹಾಕಬೇಕು. ಮರು–ಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ತೆರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಜಲ–ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತವಾಗಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ :

ಇದನ್ನು ಒರಿಜೀನಲ್ ಪ್ಯಾಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇಜಾಬ್ದರರಾರು ಜನರಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಲೈಡ್ ಸಾಕ್ಟ್ ಮಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೊಗಡಿಯಲ್ಲ ಇರಸಿರಿ. ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಬೀಗದ ಕೈ ಹಾಕಿಡಿ.

ಇದನ್ನು ಶೇಕರಿಸುವ ಕೋಣೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಜಬೂತನಿವ ತಿತಲು, ಒಣಹವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬರುವಂಥ ಬಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಚನಾ :

ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಸೈಹೇಲೋಥ್ರಿನ್ ಎ.ಐ.	4.900% ಭಾ/ಭಾ
ಹಾಲಿ ಆಲ್ಕಲಿಸ ಇಥರ್	0.260% ಭಾ/ಭಾ
ಡೋಡಿಸಿಲ್ ಬೇಂಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್	0.090% ಭಾ/ಭಾ
ಪೋಲಿಮರಿಕ ಫ್ಯಾಟಿ ಎಸ್ಟರ್	0.430% ಭಾ/ಭಾ
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	0.220% ಭಾ/ಭಾ
ಹೈಡ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಮೇಗ್ನಿಶಿಯಮ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್	1.440% ಭಾ/ಭಾ
ಟೇಟ್ರಾಸೋಡಿಯಂ ಪೈರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್	0.060% ಭಾ/ಭಾ
ಜೇಂಥೇನ್ ಗಮ್	0.110% ಭಾ/ಭಾ
ಟೇಟಾನಿಯಮ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್	0.510% ಭಾ/ಭಾ
ಪ್ರಾಪಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್	0.040% ಭಾ/ಭಾ
ಹಾಲಿ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲೋಕ್ಸೈನ್	0.020% ಭಾ/ಭಾ
ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಏಸಿಡ್	0.200% ಭಾ/ಭಾ
1,2– ಬೆಂಜಿಸೋಥಝೋಲಿನ್	0.490% ಭಾ/ಭಾ
ಅಮೈನೋಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್	0.110% ಭಾ/ಭಾ
ಏರೋಮೇಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್	2.860% ಭಾ/ಭಾ
ಹಾಲಿಯೂರಿಯಾ	0.820% ಭಾ/ಭಾ
ನೀರು	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್.
ಒಟ್ಟು	100.000% ಭಾ/ಭಾ

ಈ ಲೇಬಲ್/ಲೀಫ್‌ಲೇಟ್ ಮೇಲಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಹೈಕೆ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

த்ரில்

லெம்படாசைஹெலோத்ரின் 4.9% ஸி.எஸ்.

... பூச்சிக்கொல்லி மருந்து

லெம்படாசைஹெலோத்ரின் 4.9 கேப்ஸ்யூல் சஸ்பென்ஷன் ஒரு கேப்ஸ்யூல் சஸ்பென்ஷன் ஃபார்முலேஷனாகும். இதால் சாறாய மற்றும் மெலாய கூவர்களைக் கொண்ட கேப்ஸ்யூல் களால் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஆக்டிவ் ஆக்கக்கூறுகள் தண்ணீரால் கரைக்கப்பட்டு. இலக்கு வைக்கப்பட்ட பூச்சாகள் மற்றும் இலை மேற்புறத்தான் மீது ஸ்ப்ரேபடிமம் உலர்ந்து போகும் போது மட்டுமே வேளாயாடப்படுகான்றன். பருத்தாயால் போலவர்ம். பருத்தாக்காப்ப போலவர்ம். நேல்லயில் லீஃப் ஃபோல்டர், ஸ்டீம் போரர். கத்தரிகாய் ஷூட் மற்றும் ஃப்ரூட் போரர். ஓக்ரார மற்றும் டோமாடோயில் ஃப்ரூட் போரர். திராட்சை த்ரிபிஸ் & ஃபிலி பிடல். சில்லியில் த்ரிப்ஸ மற்றும் போட் போரர் புழுக்களை கட்டுப்படுத்துவெனன இது பராந்துரைக்கப்படுகாறது.

பயன்படுத்துவதற்கான பரிந்துரைகள் :

பயிர்	பூச்சிகளின் சாதாரணப் பெயர்கள்	ஏஐ. கிராம் (கிராம்)	அளவு கலவை (மிலி	நீரில் கரைவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடைய காத்து இருக்க வேண்டிய காலம் (நாட்கள்)
பருத்தி	போலபர்ம்	25	500	500	21
நெல்ல	ஸ்டிம் போரர், லிஃப் போல்டர்	12.5	250	500	15
கத்தரிகாய்	ஷூட் & ஃப்ரூட் போரர்	15.0	300	500	5
ஓக்ரா	ஃப்ரூட் போரர்	15.0	300	500	5
டமாடோ	ஃப்ரூட் போரர்	15.0	300	500	5
திராட்சை	த்ரிப்ஸ் ஃபிலி பிடல்	12.5	250	500–1000	7
சில்லி	த்ரிப்ஸ் போட் போரர்	25	500	500	5

பாதுகாத்து வைத்தல் : நாப்சாக் தெளிப்பான் பவர் தெளிப்பான் ஹை வால்யூம் தெளிப்பான் பயன்படுத்தவாம்.

முன்னெச்சரிகை : இந்த களைச்செடிக் கொல்லியை கூவாசிப்ப தையும், சரீரத்திலோ அல்லது வாய்வழி தொடர்பைத் தவிர்க்க வும். ஸ்ப்ரே செய்யும்போது உலலில் படாமலிருக்க, காற்று வீசும் திசையில் பாய்ச்ச வேண்டுமே ஒழிய அதை எதிர்த்து அல்ல. மருந்தைப் பயன்படுத்தும்போது சாப்பிடுவதோ, குடிப்பதோ புகை பிடிப்பதோ அல்லது வெற்றிலை போட்டுக்கொள்வதோ கூடாது.

விஷமேறிய அறிகுறிகள் : லம்ப்டா சைஹலோத்ரானை உண்பதால், குமட்டல், வயாற்று வலா, வயாற்றுப்போக்கு மற்றும் ஒவ்வாமை வௌாப்பாடுகள் போன்ற குறாப்பாக அல்லாத அறாகுறாகளை உண்டாகக் கூடும். அதாக அளவு உண்டால், நடுக்கம், தள்ளாட்டம், உடல் உறுப்புக்கள் பலவீனமாதல், வலாப்பு, கோமா மற்றும் சுவாச அழுத்தக் குறைவானால் உயாராழப்பு போன்றவை உண்டாகலாம்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள் :

மருந்து சவாசிக்கப்பட்டிருந்தால். நோயாளியை சுத்தமான காற்று வீசும் பகுதிக்குக் கொண்டு செல்லவும். மருந்து சவாசிக்கப்பட்டி ருந்தால், நோயாளியை சுத்த. மருந்து சிறிதளவு உடம்பின் மீது சிந்திவிட்டால், ஏராளமாக தண்ணீரை ஊற்றி நன்றாக கழுவவும்.

நச்சுமுறிவு : குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு ஏதுமில்லை. அறிகுறிக் கேற்ப சிகிச்சையளிக்கவும். ஒவ்வாமை குணங்கள் தென்பட்டால் ஆன்டிஹிஸ்டாமின் கொடுக்கலாம்.

அப்பறப்படுத்துவது : காலிப் பெட்டிகளை உடைத்து மக்கள் வசிக்காத இடங்களில் ஆழத்தில் புதைக்க வேண்டும் மீண்டும் உபயோகிக்காமல் இருக்கவெளியே போட்டுவைக்கக் கூடாது. பெட்டிகளை. மீதியுள்ள மருந்துவோர், ஸ்பிரேயர் வழவிய நீரையோ சுற்றுச்சூழுல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடாமல் பாதுகாப் பாக அப்பறப்படுத்தவும்.

சேமித்து வைப்பது : புச்சிக்கொல்லி அதன் ஒரிஜினல் பேக்கி லேயே கழுந்தைகளுக்கும். பொருப்பற்றவர்களுக்கும் கால் நடை களுக்கும் எட்டாமல். வேறுபொடுட்கள் வைக்காத அறைகளில் அல்லது தனி அமாரியில் வைத்துப் பூட்டவும். வெப்பமோ, ஜிவாலையோ அருகில் வராமல் பார்த்துக்கொன்னவும். பூச்சிக் கொல்லி வைக்கும் அறைற்ன்குகட்டப்பட்டு. ஈரமின்றி குளிர்ச்ச சியாக, காற்றோோட்டமும் வெளிச்சமும் இருக்கும்படி ஆபியாகி மாசுபடாத அளவு பெரியதாகக் கட்டப்பட வேண்டும். பூச்சிமருந்து உள்ள பெட்டிகளை மற்ற உணவுப்பொருட்கள் அல்லது கால்ந டைத் தீவன்கள் மீது படாமல் கொண்டு செல்லவும்.

இரசயன கலவை :

லெம்படாசைஹெலோத்ரின் எ.ஐ.	4.900% ட/ட
பாலி அல்கலின் இதர்	0.260% ட/ட
டோடிசில் பேன்சின் சல்ஃபோனேட்யில் சிடியம் சால்ட்	0.090% ட/ட
பாலிமரிக் ஃபேட்டி ஏஸிட்	0.430% ட/ட
சோடியம் லிக்னோசல்ஃபேட்	0.220% ட/ட
ஹைட்ரேட் ஏல்யுமினியம் மேக்னிசியம் சிலிகேட்	1.440% ட/ட
டேட்ராசோடியம் பைரோஃபாஸ்ஃபேட்	0.060% ட/ட
ஜேன்தம் கம்	0.110% ட/ட
டேடாநியம் டைஆக்சைட்	0.510% ட/ட
ப்ராபிலின் க்ளைகோல்	0.040% ட/ட
பாலிடைமிதைல் சிலோக்ஸேஸ்	0.020% ட/ட
ஸல்ஃப்யூரிக் ஏஸிட்	0.200% ட/ட
.2–பேண்ஜிஸோதஜேலின்	0.490% ட/ட
அமோநியம் ஹைட்ரோக்சைட்	0.110% ட/ட
ஏரோமெடிக் ஹைட்ரோகார்பன்	2.860% ட/ட
பாலீயூரியா	0.820% ட/ட
நீர்	கியூ.எஸ்.
மொத்தம்	100.000% ட/ட

இந்த அட்டையில்/லிஃப்லேட் பயிர்கள் மத்தியில் மற்ற பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தத்தடை.

थ्रिल

लेम्बडासायहेलोथ्रीन 4.9% सी.एस.

...जंतुनाशक

लेम्बडासायहेलोथ्रीन 4.9% एक कॅप्सूल सस्पेन्शन सूत्रीकरण छे, जेमां सक्रिय पदार्थ पाणी मां लटकावीने नाना कॅप्सूल मां बंद थाय छे अने आ तेवे बहार आवे छे छंटकाव ना टीपा कीट ना शरीरे अने पांदडाओना उपरे सूधी जाय छे. आ कपासनी डोडानी सुंडी, धानना तना छेदक अने पत्ता मोडक, रींगण ना तना छेदक अने फळ छेदक, भेंडी, टॉमाटो ना फळ छेदक, द्राक्षना चुर्दा अने पिस्सू बीटल अने मिर्ची ना चुर्दा अने फळ छेदक कीटना नियंत्रण माटे वपरावामां आवे छे.

उपयोग :

पाक	कीट नुं सामान्य नाम	प्रमाण/हेक्टर सक्रिय तत्व (ग्राम)	पाणीनी संरचना (मि.लीटर)	मिश्रणनुं प्रमाण (लीटर)	छेल्लो छंटकाव के कापणी वच्चेनुं अंतर (दिवसमां)
कपास	लीली ईयड	15-25	300-500	400-600	21
धान	पत्ता मोडक, तना छेदक	12.5	250	500	15
रींगण	तना अने फळ छेदक	15.0	300	500	5
भेंडी	फळ छेदक	15.0	300	500	5
टॉमटो	फळ छेदक	15.0	300	500	5
द्राक्ष	चुर्दा अने बीटल	12.5	2500	500-1000	7
मिर्ची	चुर्दा अने फळ छेदक	25	500	500	5

छोड सुरक्षा यंत्र : नेपसेक छंटकाव पावर छंटकाव यंत्र द्वारा हाई वॉल्यूम छंटकाव माटे खेतरमां छांटी शकाय छे.

वापनार माटे सावचेती: घोळ बनाव्या अने छंटकाव कर्या समये चामडी, आंख अने मॉ ने कीटनाशकना संपर्कथी बचावो. सुरक्षात्मक वस्त्र जेमके अप्रान, हातमोजा, नकाब, गम, बूट वगेरा पहेरीने छंटकाव करो. छांटण वखते खावा, पीवा अने धूम्रपान करवुं नहीं. पर्यावरण अने पाणीने कीटनाशकथी दुषिथ थयाथी बचावो.

ઝેરના ચિન્હ : सामान्य लक्षण बीजा पाइरेथ्राइड जेवा थाय छे, गळी गया होय त्यां वमि भाव, वमि, पेटमां दुखावो, झाडा, अलर्जी ना लक्षण जणाय छे. वधु मात्रा गळी गया होय त्या नाडी मंडल अशांत थई शके छे तेने परिणामे कंपन, असंतुलन, हात अने पगमां कंपन, अेठन, मूर्छा अने श्वास क्रिया मां बाधा थई शके छे अने मृत्यु थई शके छे. चामडी दूषित थई जाय त्या झणझणाट अने चेतना शून्यता थई शके छे.

दुषित हात द्वारा चहेरानो संपर्क थयाथी आ लक्षण जणावे छे. आ असर २४ कलाको सुधी रहे छे. आखो दुषित थई जाय त्या जलन नो असर जणावे छे.

प्राथमिक चिकित्सा: श्वासमां गई होय तो दरदीने खुल्ली हवामां लई जाव. गळी गया होय त्यां ऊल्टी करावी नहि अने मुंख द्वारा खाद्य पदार्थ देवुं नही. प्रभावित चामडी अने कपडाने पाणीथी धुओ.

विष मारण : गेस्ट्रीक लव्हेज करावो. लक्षण अनुसार ઇલાજ करवो. अलर्जी माटे अन्टीहिस्टामिन देवुं.

खाली ડબ્બાઓનો નિકાલ: खाली ડબ્બાઓને તોડીને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ.. खाली ડબ્બાઓનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા માટે એમને બહાર ન ફેંકશો. વધેલા કીટનાશકો તથા મશીન વગેરેની સફાઈ કરેલા પાણીને એ રીતે નિકાલ કરો કે વાતાવરણ અને જળ પ્રદૂષિત ના થાય.

સંગ્રહ: कीटनाशकना ડબ્બાનો સંગ્રહ, જુદા ઓરડા કે સ્થાનમાં, અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો રાખવાનાં ઓરડાથી દૂર કરવો જોઈએ. કે કીટનાશકનું પ્રમાણ અને પ્રકાર પ્રમાણે ડબ્બાઓને અલગ કબાટમાં તાળાચાવીમાં બંધ કરીને રાખો. કીટનાશકનો સંગ્રહ ઓરડા કે સ્થાન હવા-ઉજાસવાળા, મજબૂત અને પૂરતા લંબાઈ પહોળાઇવાળો હોવો જોઇએ, જેનાથી બાધ્ય પ્રદૂષણ ન થાય.

रासायणिक रचना :

लेम्बडा साईहेलोथ्रीन स.त.	४.९००% व/व
पॉली आल्कलीन ईथर	०.२६०% व/व
डोडिसिल बेंझीन सल्फोनेटनुं सोडियम साल्ट	०.०९०% व/व
पोलिमरिक फैटी ईस्टर	०.४३०% व/व
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	०.२२०% व/व
हायड्रेट्रेड अल्युमिनियम मेगनेशियम सिलिकेट	१.४४०% व/व
टेट्रासोडियम पाईरोफासफेट	०.०६०% व/व
जेन

THRILL

Lambda-Cyhalothrin 4.9% Capsule Suspension

(Insecticide)

Lambda cyhalothrin 4.9% Capsule Suspension is a formulation wherein the active ingredient is sealed in a tiny thinwalled capsules suspended in water and is released only when the spray depost dries on the target pest and leaft surface. It is recommended for the control of bollworms in cotton, stem borer & leaf folder in paddy, shoot and fruit borer in brinjal, fruit borer in okra & tomato, thrips & flea beetle in grapes and thrips & pod borer in chilli crops.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	A.I. (gm/%)	Dosage / Ha Formulation (ml)	Dilution in (Ltr)	Waiting Period between last Spray to harvest (in days)
Cotton	Bollworms	25	500	500	21
Paddy	Stem borer, Leaf Folder	12.5	250	500	15
Brinjal	Shoot & Fruit borer	15	300	500	5
Okra	Fruit borer	15	300	500	5
Tomato	Fruit borer	15	300	500	5
Grapes	Thrips & Flea beetle	12.5	250	500-1000	7
Chilli	Thrips & Pod borer	25	500	500	5

Direction of use :
Method of application and spray equipment : Apply as high volume spray with a KJ napsack sprayer fitted with fine mist nozzle or mist blower.

Precaution :
Avoid contact with skin, eyes and mouth during mixing and spraying. Wear protective clothing like apron, gloves, face shield and boots. Wash the affected areas before eating, drinking or smoking. Avoid contamination of environment and water. Avoid contact with treated area until the spray is fully dried.

Symptoms of Poisoning :
Ingestion of lambda-cyhalothrin may product non-specdific symptoms such as nausea, vomiting abdominal pain, diarrhoea and allergic manifestations. If larger doses are ingested, it may cause disturbance of the nervous system with tremors, atazia, weakness of limbs, convulsion, comma and death from respiratory depression
Skin contact may cause subjective sensation or tingling or numbness in the facial area. This effect normally result from unconscious transfer to the face from contaminated hands or glove. This effect is transcient, lasting upto 24 hours and there is not evidence of any long term or cumulative effects. Eye contact will cause irritation.

First aid :
Remove the patient from futher exposure and wash contaminated skin with plenty of water and soap. If swallowed induce vomiting and perform gastric lavage, repeat till the fluid is clear. If eyes contaminated, flush with plenty of water.

Antidote :
Perform gastric lavage, taking care to prevent aspiration of gastric contents. Treat symptomatically. Antihistamines may be applied, in case of manifestation of allergic symptoms.

Disposal of used container :
The empty containers should never be re-used and should be destroyed and buried in safe place. Dispose off packages or surplus materia and washing in a safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions :
Store in the original container away from food and animal feed in a separate room kept under lock and key. Store in a cool dry, well built and well lit place of sufficient dimensions with good ventilation.

Chemical Composition :

Lambda-cyhalothrin (a. i.)	4.900% w/w
Polyalkylene glycol ether	0.260% w/w
Dodecyl benzene sulphonic acid sodium salt	0.090% w/w
Polymeric fatty ester	0.430% w/w
Sodium Lignosulphonate	0.220% w/w
Hydrated aluminium magnesium silicate	1.440% w/w
Tetrasodium pyrophosphate	0.060% w/w
Xanthan gum	0.110% w/w
Titanium dioxide	0.510% w/w
Propylene glycol	0.040% w/w
Polydimethylsiloxane	0.020% w/w
Sulphuric acid	0.200% w/w
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	0.490% w/w
Ammonium hydroxide	0.110% w/w
Aromatic hydrocarbon	2.860% w/w
Polyurea	0.820% w/w
Water	Q.S.
Total	100.00% w/w

NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET

थ्रिल

लेम्बडासायहेलोथ्रीन 4.9% सी.एस.

(कीटनाशक)

लेम्बडा साईहेलोथ्रिन 4.9 प्रतिशत सी.एस. एक कैपस्यूल सूत्रीकरणहै, जिसके सक्रिय पदार्थ, पानी में लटके हुए छोटे कैपस्यूलों में बंद होता है और ये ताबही बाहर निकल आता है जब छिड़काव की बूंद कीट के शरीर पर व पत्ते की सतह पर सूखती है। इसकी कपास की सूडियों, धान में तना छेदक व पत्ता मोड़क, बैंगन में तना व फल छेदक इल्ली, भिंडी, टमाटर के फल छेदक इल्ली, अंगूर के चुरदा और पिस्सू बीटल और मिर्च के चुरदा और फल छेदक इल्ली के नियंत्रण के लिए सिफारिश की जाती है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव व फसल की कटाई के बीच अंतराल (दिनो में)
कपास	सुंडिया	25	500	500	21
धान	पत्ता मोड़क, तना छेदक	12.5	250	500	15
बैंगन	तना छेदक व फल छेदक इल्ली	15	300	500	5
भिंडी	फल छेदक इल्ली	15	300	500	5
टमाटर	फल छेदक इल्ली	15	300	500	5
अंगूर	चुरदा और पिस्सू बीटल	12.5	250	500–1000	7
मिर्च	चुरदा और फल छेदक इल्ली	25	500	500	5

उपयोग के लिये निर्देश :
नेपसेक स्प्रेयर या पावर स्प्रेयर को इस्तेमाल करते हुए, हाई–वाल्यूम छिड़काव करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां :
घोल बनाने और छिड़काव करने के वक्त, त्वचा, आँख और मूँह को कीटनाशक के संपर्क से बचाये। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि एप्रेन, दस्तानों, नकाब और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें। खाने, पीने और धूम्रपान करने से पहले कीटनाशक से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें। हवा या पानी को कीटनाशक से प्रदूषित न होने दें।

विष के लक्षण :
1. सामान्य लक्षण अन्य पायरिथ्राइड जैसे ही होते है। निगले जाने पर जी मिचलना, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त या एलर्जी प्रकाशन जैसे, लक्षण उत्पन्न हो सकते है। अधिक मात्रा निगले जाने पर नाडी मंडल अशांत हो सकता है जिससे कपकंपी, असंतुलन, हाथ पांव में कमजोरी, ऐठन, बेहोशी व श्वास प्रकिया में कमी के कारण मृत्यु हो सकती है। यदि त्वचा से सम्पर्क हुआ तो, झनझनाहट या चेतना शून्यता का आभास पैदा कर सकता है।
यह ज्यादातर अज्ञानता में दूषित हाथों या दस्तानों से चहरे को छूने से होता है। यह प्रभाव अस्थिर होता है और 24 घंटे से ज्यादा नही ठहरता। इसमें किसी प्रकार की लम्बी अवधि या इकट्ठे असर होने के प्रमाण उपलब्ध नही है। आखों के संपर्क में आने से जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा :
रोगी को ताजी हवा में लें आयें। उसके प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डाले। यदि निगल लिया हो तो, वमन करायें और जब तक पेट से सारी दवा निकल जायें। यदि जरूर लगे, तो गैस्ट्रिक लैवेज भी दें। आँखें दूषित होने पर खूब पानी से धोएं।

विष नाशक :
गैस्ट्रिक लैवेज दीजिये और ध्यान रखें कि बाहर हो रहे तत्व उच्छ्वास के साथ अन्दर न जा सके। एलर्जी प्रकाशित होने पर, एन्टिहिटामिन्स का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणानुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :
खाली डिब्बों को दुबारा प्रयोग में न लाये। उनको अवस्था में नही रखना चहिए। बची हुई दवा, मशीन के पानी के धोवन तथा डिब्बों का निपटारा सावधानी से करें, जिससे पानी और हवा या पानी को कीटनाशक से प्रदूषित न होने दे।

संग्रहण की शर्ते :
इस कीटनाशक को इसके मूल कन्टेंनर में खाने–पीने की चीजों और पशुओं के चारे से अलग एंव दूर, कमरे में ताला लगाकर रखें। जगह सूखी, ठंडी, पर्याप्त आयतन एवं मजबूती से बनी हो।

रासायनिक संरचना :

लेम्बडा–साईहेलोथ्रिन स.त.	4.900% भार/भार
पोलीआल्कलयीन ग्लाईकोल ईथर	0.260% भार/भार
डोडेसिल बेन्झीन सल्फोनिक का सोडियम लवण	0.090% भार/भार
पोलिमरिक फेटी इस्टर	0.430% भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	0.220% भार/भार
हायडेट्रेड एल्यूमिनयम मैग्नीशियम सिलिकेट	1.440% भार/भार
टेट्रोसोडियम पायरोफास्फेट	0.060% भार/भार
जेन्थम गम	0.110% भार/भार
टाइटेनियम डायोक्साईड	0.510% भार/भार
प्रोपाइलीन ग्लाईकोल	0.040% भार/भार
पोलीडामिथाईल सिलोक्सेन	0.020% भार/भार
सलफ्यूरिक एसिड	0.200% भार/भार
1, 2 बेंजीसोथियाजोल–3(2एच)–वन	0.490% भार/भार
अमोनियम हाईड्रोक्साइड	0.110% भार/भार
ऐरोमेटिक हाईड्रोकार्बन	2.860% भार/भार
पोलीयूरिया	0.820% भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा
योग	100.000% भार/भार

इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

థ్రిల్

ల్యాంబడాసైహెలోథ్రీన్ 4.9% సి.ఎస్.

(కీటనాశని)

ల్యాంబడాసైహలోథ్రిన్ 4.9 కాప్స్యూల్ సస్పెన్షన్ అనేది కేప్స్యూల్ నుండి విడుదలయ్యే సూత్రీకరణ. ఇది చిన్న పలుచని-గోడతో సీలు చేయబడిన చురుకైన పదార్థం నీటిలో కరిగిపోతుంది మరియు లక్ష్య కీటకం లేదా ఆకు ఉపరితలంపై పిచికారీ చేయబడిన తరువాత ఎండి, దాని నుండి విడుదల అవుతుంది. ఇది ప్రత్తి ఆకుబోలవర్మ్, వరి ఆకు స్టీమ్ బోరర్ మరియు లీఫ్ ఫోల్డర్, వంకాయ షూట మరియు ఫ్రూట్ బోరర్, ఓక్రా మరియు టమ్యాటో ఆకు ఫ్రూట బోరర్, ద్రాక్ష ఆకు థ్రిప్స్ మరియు ఫ్లీ బీటల్ చిల్లి ఆకు థ్రిప్స్ మరియు పోడ్ బోరర్ పంటనాశించే కాయతొలిచే పురుగులను అరికట్టటానికి సిఫార్సు చేయబడుతోంది.

సిఫారసులు :

పంటలు	వ్యాధియొక్క సాధారణ పేరు	ఎ.ఐ. (గ్రా.)	మోతాదు/హెక్టార్ మందు (మీ.లీ.)	చివరిసారి స్ప్రేచేసిన తరువాత పంట కోతకు వేచి ఉండ ఎన్ని రోజుల్లో మిశ్రమము వలసిన సమయం లీటరు
ప్రత్తి	బోలవర్మ్	25	500	500	21
వరి	స్టీమ్ బోరర్	12.5	250	500	15
వంకాయ	షూట,ఫ్రూట్‌బోరర్	15.0	300	500	5
ఓక్రా	ఫ్రూట బోరర్	15.0	300	500	5
టోమాటో	ఫ్రూట బోరర్	15.0	300	500	5
ద్రాక్ష	థ్రిప్స్, ఫ్లీ బీటల్	12.5	2500	500-1000	7
చిల్లీ	థ్రిప్స్ పోడ్ బోరర్	25	500	500	5

పిచికారి యంత్రపరికరములు : న్యాపసాక్ స్ప్రేయర్, పవర్ స్ప్రేయర్ వీని యోగించవచ్చును.

మందుతో పనిచేసేవారికి సూచనలు :
కీటనాశిని వాసన పీల్చ వద్దు మరియు చర్మము మరియు నోటికి దూరంగా ఉంచండి. మిశమము చుక్కలు శరీరము మీద పడకుండా ఉండటానికి గాలివీ చెపైపు స్ప్రేచెయండి కాని ఎదురు గాలి వైపు వద్దు. ఈ మందు వాడే సమయంలో తినడం, త్రాగడం, పొగ త్రాగటం. కిళి సమలటం చేయరాదు.

విషాభావ లక్షణాలు: లామ్డా-సైహలోథ్రిన్ కడుపులోకి వెళ్ళినట్లైతే వికారం, వాంతులు, కడుపు నొప్పి, అతిసారం మరియు అలెర్జీతో కూడిన లక్షణాల వంటి అనిర్దిష్ట లక్షణాలు కలుగవచ్చు. అధిక మోతాదులో మింగినట్లైతే ఆకస్మిక వణుకు, నీరసం, అవయవాల బలహీనత, వంకర్లు పోవడం, కోమాలతో నరాల వ్యవస్థ దెబ్బతిని, శ్వాస మాంధ్యం వలన మరణం సంభవించవచ్చు.
చర్మానికి తగలడం వలన అంతఃకరణ సంచలనం లేదా ముఖం ప్రాంతంలో తిమ్మిరెక్కడం లేదా మొద్దుబారడం జరగవచ్చు. ఈ ప్రభావం సామాన్యంగా కలుషితమైన చేతులు లేదా చేతితొడుగులు తగలడం వలన కలుగుతుంది. దీని ప్రభావం తాత్కాలికమైనది, 24 గంటలకు వరకు ఉండవచ్చు మరియు దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న లేదా పెరిగే అవకాశం లేదు. కళ్ళకు తగిలినట్లైతే మంట పుడుతుంది.

ప్రథమ చికిత్స : విష వాయువును నీల్చిన వ్యక్తిని. ధారాళంగా స్వచ్ఛమైన గాలి పీచే ప్రదేశానికి తీసుకు వెళ్ళండి. శరీరంపై పడితే, ధారాళంగా నీటితో శుభ్రం చేయాలి. మందు కళ్ళల్లో పడితే ఎక్కువ నీటితో కళ్ళు శుభ్ర పరచండి.

విరుగుడు పద్ధతి : ఈ క్రిమి సంహారకాన్ని ప్రత్యేకంగా విరుగుడు చేసే మందు లేదు. వ్యాధి లక్షణాలకనుగుణంగా నయం చేయాలి. ఎలర్జీ కనబడితే ఆంటి హిస్టామిన్‌ని ఇవ్వాలి.

ధ్వంసంచేయటం : ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఉపయోగించే నిమిత్తం బయట ఉంచకుండా పగులగొట్టి నివాసాలకు దూరంగా అర మీటరు గొయ్యి త్రవ్వి మట్టిలో పాతిపెట్టాలి. ఖాళీ డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించేందుకు బయట పడవేయరాదు. ప్యాకింగులను, ఉపకరణాల కడుగు, మిగులు పదార్థాలను జల లేదా వాతావరణ కాలుష్యం జరగకుడా తీసివేయాలి.

నిల్వ : ఏవైనా వస్తువులు ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలను నిల్వచేసే గదులకు లేదా ప్రాంగణాలకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులలోగానీ ప్రాంగణాలలో గానీ లేదా ప్రత్యేక అల్మారాలలో అంటే క్రిమినంహారకమందు పరిమాణం, గుణాన్ని బట్టి ప్రత్యేక అల్మారాలలో పెట్టాలి. ఈ క్రిమినంహారక మందు ఆవిరిలో కలుషితం కాకుండా నిరోధించేందుకుగాను మందు నిల్వచేసేందుకు నిర్మించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలు అవసరమైనంత గట్టిగా, ఎత్తు, పొడవు, వెడల్పుతో నిర్మించబడాలి పొడిగా, చల్లగా ఉండి, వెలుతురు, గాలి రావటానికి సరుపాయం ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమము :

లేంబ్డాసైహేలోథ్రిన్ ఎ.ఐ.	4.900% బ/బ
పోలీ అల్కలిన్ ఇథర్	0.260% బ/బ
డోరిసిల్ బేంజీన్ సల్ఫోనేట సోడియం సాల్ట్	0.090% బ/బ
పోలిమరిక ఫ్యాటి ఇస్టర్	0.430% బ/బ
సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	0.220% బ/బ
హైడ్రేటెడ్ అల్యూమినియం మెగ్నీషియం సిలికేట్	1.440% బ/బ
టెట్రాసోడియం పైరోఫాస్ఫేట్	0.060% బ/బ
జేంథమ్ గమ్	0.110% బ/బ
టైటానియం డైఆక్సైడ్	0.510% బ/బ
ప్రోపిలిన్ గ్లైకోల్	0.040% బ/బ
పాలీడైమిథైల్ సిలోక్సేన్	0.020% బ/బ
సల్ఫ్యూరిక్ ఎసిడ్	0.200% బ/బ
1,2-బేంజిసోథజోలిన్	0.490% బ/బ
అమోనియం హైడ్రోక్సైడ్	0.110% బ/బ
ఎరోమేటిక్ హైడ్రోకార్బన్	2.860% బ/బ
పాలీయూరియా	0.820% బ/బ
నీటిన్	క్యూ.ఎస్.
మొత్తం	100.000% బ/బ

ఈ లేబుల్/లీఫ్‌లేట్ పంటలు మధ్య ఇతర పంటలు నిషేధం.

AGASTYA

THRILL

Lambda-cyhalothrin 4.9% Capsule Suspension

Insecticide

थ्रिल

लेम्बडा–साईलोथ्रिन ५.९ प्रतिशत सी.एस.

कीटनाशक

థ్రిల్

లాంబ్డ-సైహలోథ్రిన్ 4.9% సంఘటిత మిశ్రమ గుళికలు గల కీటకనాశిని

థ్రిలో

లాంబ్డ-స్మేహలోత్రినొ 4.9% సి.ఎస్. గుళిగళళ్ళు ద్రావణ కీటకనాశని

CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

DANGER

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured by :

AGASTYA AGRO LIMITED

UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally -501 401
Medchal Dist.,Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017 (Old Lic. no:220/1997-98, Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Regd. No.: CIR-132970/2016-Lambda-cyhalothrin (Capsule Suspension) (365)-260