Chlorpyriphos 10% GR. (Insecticide)

It is used to control Stem Borer, Leaf roller Gall midge of Rice.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (kg)	Formu-lation (kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Rice	Stem borer, Leaf Roller, Gall midge	1000	10	-	30

Direction of Use :

P.P. Equipment : Recommended dosage for granules should be broadcasted using hand operated granule applicator or mechanical dispenser. For application in Rice 2-3m standing water should be available in the field. Keep water impounded for 2-3 days after application.

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation while using. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after broadcasting. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while broadcasting. 6. Wear full protective clothing while broadcasting.

Symptoms of Poisoning : Headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, diarrhoea, convulsions, sweating, excessive, lacrimation, and salivation may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minuted. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes.

Disposal of used Container : 1. Packages shall be broken and buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental of water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Chlorpyriphos a.i.	10.00 % w/w
Solvent Aromax (Evaporated during manufacturing process)	2.00 % w/w
Inert granules (Bentonite) (850/420 microns)	Q.S. %
Total	100.00 % w/w

CAUTION : "Not to be used on Crops other Than Specified on This Label/Leaflet"

क्लोरपायरिफोस १०% जी.आर (कीटकनाशक)

केवल फसलो के कीटों की रोकथाम के लिये इस्तेमाल होने वाला आरगानोफासफांरस चूर्ण से बना कीटनाशी है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्रा.)	संरचना (मी.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
धान	तना छेदक, पत्ता लपेटक गाल, मिज	१०००	१०	-	३०

उपयोग के लिए निर्देश : हाथ से चलाने वाला ग्रेन्युल एप्लिकेटरए लीफहोर्ल एप्लिकेटर, मशीन से चलने वाला डिस्पर्सर या रबड के दस्ताने बहन कर हाथ से।

प्रयोगकतांओं के लिए सावधानियाः १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३. बुरकाव के कणों को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में बुरकाव करें। ४. बुरकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. बुरकाव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. बुरकाव करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षण : सिरदर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना, मितली, उल्टी, दस्त, झटके (मिरगी) अधिक पसीना आना, आंसू आना और लार टपकना हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह किया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडें उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं. ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धाएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गयाहो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधॉविशात्कता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशात्क नहीं हैं।

विष नाशक : १. खाद्यसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. प्रयोग करते समय सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये । ४. प्रयोग करने के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें जैसे दसताने जुते मास्क रबर एप्रान टोप आदि पहनने चाहिये।

खाली डिब्बों का निपटारा : कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कता का कर्तव्य है कि पैकेज, मशीन की धुलाई बची हुई सामग्री आदि की निकाली की व्यवस्था ऐसी सुरक्षित से करना चाहिए, ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारे दुषित न होफ खाली डिब्बों और पैकेज को तोडकर आबादी से दूर गाढ देना चाहिए। खाली डिब्बों को तोडकर जमीन में ५० से.मी. नीचे गाढ दे, जहां भूमिगत पानी न हो। खाद्य पदार्थ और पानी रखने के लिए खाली डिब्बों का उपयोग न करें। खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने लिए बाहर न छोडे।

संग्रहण की शर्तः १. कीटनाशक के पैकेजों को अलग-अलग कमरों या जगहों पर खाध पदार्थो अथवा अन्य वस्तुओं के रखे जने वले कपरों से दूर अलग-अलग अलमारीयों में कीटनाशक प्रमान और प्रकार के हिसाब से ताला चाबी में रखना चाहिए। २. जिस जगह अथवा कमरें में कीटनाशक का भंण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा प्रकाश युक्त, हवादार व काफी तम्बा चौडा होना चाहिए ताकि कीटनाशक की भाप से वातावरण के दुषित न होने पाये ।

रासायनिक संरचना :

क्लोरपायरिफासें स.त.	१०.०० % भार/भार
सोलवेंट एरोमेक्स (उत्पादन के दौरान उड़ जाता हैं)	२.०० % भार/ भार
इनर्ट के न्यूल्स-बेन्टोनाइट '८५०/४२०' माइकोन्स'	पर्याप्त मात्रा % भार/भार,
योग	१००.०० % भार/भार

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी फसलो के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

క్లోరోపైరిఫాస్ 10 % జి.ఆర్. (కీటకనాశని)

క్లోరిపైరిఫాస్ 10% జిఆర్.. పైర్లను ఆశించు కీటకాలను సమర్థవంతంగా అరికట్టు పొడిరూపంలో వున్న ఆర్గనోఫాస్ఫరస్ జాతికి చెందిన కీటకనాశని.

సిఫారసులు :

పైర్లు	కీటకాలసాధారణ నామము	మోతాదు/హ.మీ. స.వ. (కి.గ్రా)	ద్రావణం (కి.గ్రా)	నీటి పరిమాణం (లీ)	చివరి పిచికారీ పైరుకోతల మధ్య విరామం (రోజులలో)
వరి	కాండం తొల్చు పురుగు ఆకుమచ్చ, ముడుత, సుడిదోమ,ఆకుచుట్టు పురుగు, ఉల్లికోడు, మిడత.	1000	10	-	30

సూచనలు :

యంత్ర పరికరములు : చేతితో పనిచేసే గ్రాన్యూల్ అప్లికేటర్ లేదా మెకానికల్ డిస్పెన్సర్ని ఉపయోగించి కణికల కోసం సిఫార్సు చేయబడిన మోతాదును పిచికారీ చేయాలి. వరిలో పిచికారీ సమయంలో 2-3 మీటర్ల వరకు నీరు పొలంలో అందుబాటులో ఉండాలి. పిచికారీ చేసిన తరువాత 2-3 రోజులు నీటిని ఉంచండి.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసముల నుండి దూరముగా భద్రపరచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. 4. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితదుస్తులు మరియు శరీరభాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి మందును ఉపయోగించునప్పుడు చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణమును కలుపునపుడు మరియు ఉపయోగించునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులను ధరించవలెను.

ప్రథమచికిత్స: 1. మందును మింగినచో గొంతులోనికి వేళ్ళుజొనిపి వాంతిచేయించవలెను. మందుద్రావణమును పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు మరల మరల వాంతి చేయించరాదు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తీసివేసి సబ్బు మరియు ఎక్కువ పరిమాణముగల నీటితో శరీరమును బాగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 3. కళ్ళలో మందుపడినచో 10-15 నిమిషముల వరకు శుభ్రమైన నీటితోధారగా కడగవలెను.

విరుగుడు: 1) వెంటనే రోగికి అట్రోపినైజేషన్ చేయాలి. అలా పూర్తి అట్రోపినైజేషన్ అయ్యేంతవరకూ 2 నుండి 4 మి.గ్రా అట్రోపిన్ సల్ఫేట్‌ను నరాల్లో గుండా 5 నుండి 10 నిమిషాల వ్యవధినిస్తూ తిరిగి తిరిగి ఎక్కిస్తూ వుండాలి. అలారోజుకు 25 నుండి 50 మి.గ్రా. అట్రోపిన్ మోతాదు అవసరం వుంటుంది. ఒకవేళ అలా లక్షణాలు కనబడుతూవుంటే, ఇంకా అట్రోపిన్ ఎక్కించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేగాక నోటినుండి సొంగకారడం కూడా అట్రోపిన్ మోతాదు సర్దుబాటు చేసుకోడానికి అవసరమవుతుంది. 2)10 మి.లీ. డిస్టిల్డ్ వాటర్‌లో 1-2 గ్రా. 2 పి.ఎ.ఎమ్.ను కలిపి నెమ్మదిగా 10-15 రోజుల వరకూ నరాల్లోగుండా ఎక్కించాలి.

ఖాళీ డబ్బాల నష్టీకరణం : 1. కీటనాశక నిర్మాతలు లేక ఉపయోగించేవారి కర్తవ్యం ఏమిటంటే, డబ్బాలు లేదా పాత్రలను విరగ్గొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయటవిడువవద్దు. 3. డబ్బాలు లేదా మిగిలిన కీటనాశకం లేదా యంత్రాలను కడిగిన ద్రవం చాలా జాగ్రత్తగా పరిసరాలు, నీటివనరులు, త్రాగునీటికి హాని కలుగకుండా చూడండి.

నిలువ పరతులు : 1. కీటనాశక డబ్బాలను వేరు-వేరు గదులలో లేక అలమారుల్లో వాడుకొనే సామాన్లకు దూరంగా, ఖాద్యాన్న వస్తువులకు, పశుగ్రాసానికి దూరంగా వేసి జాగ్రత్త పరచండి. 2. ఏ గదులలో లేక అలమారుల్లో కీటనాశకాన్ని నిలువ చేస్తారో అవి బాగా గట్టిగా కట్టబడి, ఎండుగా, చల్లగా, ప్రకాశమయంగా, గాలువాటుగా మరియు సరిపడే ఆయాతంలో ఉండాలి. కీటనాశక భాష్పంతో వాతావరణం కలుషితం కాకుండా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

క్లోరోపైరిఫాస్ ఎ.ఐ.	10.00 % భా/భా
సాల్వెంట్ ఆరోమాక్స్ (ఎవాపోరేటెడ్ డ్యూరింగ్ మాన్యుఫాక్చరింగ్‌ప్రాసెస్	2.00% భా/భా
ఇనర్ట్ గ్రాన్యుల్ (బెంటోనేట్) (850/420 మైక్రాన్స్)	% భా/భా
మొత్తం	100.00% భా/భా

గమనిక : ఈ లేబుల్ / లీఫ్‌లెట్‌లో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికి వాడరాదు.

AGASTYA %

ALTIMA GR
Chlorpyriphos 10 % GR.
(Insecticide)

అల్టిమా జిఆర్

క్లోరోపైరిఫాస్ 10% జి.ఆర్.

(కీటకనాశిని)

अल्टीमा जिआर

क्लोरपायरिफास १०% जी.आर

(कीटनाशक)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగీ సిగదంతే దూరవిడి.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured by :

AGASTYA AGRO LIMITED

UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally - 500 014 Medchal Dist.,Telangana State.
Mfg. Lic. No. : 220/97-98

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company
Customer Care No.: 040-64576958
E-mail : agastyaagro@yahoo.com %

Reg.CIR-183407/2021-Chlorpyriphos 10% GR(428)-1247

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

क्लोरपायरिफॉस १०% जीआर (कीटकनाशक)

हे तांदळाचे स्टेम बोरर, लीफ रोलर पित्त मिज नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाते.

शिफारस:

पीक	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्रा)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बाद अन्तराल (दिवस)
ट्राइस	स्टेम बोरर, लीफ रोलर, पित्त मिड	१०००	१०	-	३०

वापराच्या दिशानिर्देश:

पी.पी. उपकरणे : ग्रॅन्यूलसाठी शिफारस केलेले जोस हाताने चालणाऱ्या ग्रॅन्यूल ॲप्लिकेटर किंवा यांत्रिक मशीनद्वारे प्रसारित केले जावे. तांदळासाठी अर्ज करण्यासाठी शेतात २-मी. उभे पाणी उपलब्ध असावे. अर्ज केल्यावर २-३ दिवस पाण्याचा साठा ठेवा.

खबरदारी: १) इनहेलेशन, त्वचा किंवा कीटनाशकांबरोबर तोंडी संपर्क टाळा. २) फवारणी करताना तंबाखू चघळू नका, अन्न खऊ नका किंवा धुम्रपान करु नका. ३) फवारणी करताना संरक्षक कपे, रबरचे हातमोजे, बूट करते, चेहरा ढाल किंवा धूळ मास्क, ओ व्हराल, रबर एप्रन, टोपी किंवा टोपी वापरतात. ४) केवळ वारा प्रवारणीनंतर हाताने आणि शरीरातील दूषित भाग साबण आणि पाण्याने स्वच्छ करणे. ६) काम पूर्ण झाल्यावर स्वच्छ स्प्रेअर पाण्याने स्वच्छ.

विषबाधाची लक्षणे : डोकेदुखी, हट्टीपणा, चक्कर, मळमळ, उलट्यास अस्पष्ट दृष्टी, अतिसार, आक्षेप, घाम येणे, जास्त प्रमाणात, लट्ठपणा आणि लाळ उद्भवू शकते.

प्रथमोपचार : १. गिळंकृत झाल्यास, घश्याच्या मागच्या भागावर गुदगुल्या करुन उलट्या करण्यास प्रवृत्त करा उलट्या स्पष्ट होईपर्यंत याची पुनरावृत्ती करा. जर रुग्ण बेशुद्ध असेल तर उलट्या करण्यास प्रवृत्त होऊ नका. २. जर कपडे आमि त्वचा दूषित असेल तर कापड काढा आणि दूषित त्वचेला मोठ्या प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. आंख: जर डोळो दूषित असतील तर सुमारे १० ते ५ मिनिटभर खारट-शुद्ध पाण्याने फ्लश करावे. जर श्वास घेतला असेल तर रुग्णाला ताजी हवेमध्ये काढा.

विषाणूविरोधी औषध : १. रुग्माला त्वरित ॲट्रोपिनइझ करा आमि २ ते मिग्रा. मिलीग्राम वारंवार जोस घेत पूर्ण ॲट्रोपिनेजेशन टेवा. अंत: स्रावी ५ ते १० मिनिटांच्या अंतराने अट्रोपाइन सल्फेटचे. एका दिवसात २५ ते ५० मिलीग्राम एट्रोपाइनची आवश्यकता असू शकते. पुटील रोप ट्रोपाईन प्रशासनाची आवश्यकता लक्षणांच्या निरंतरतेद्वारे मार्गदर्शन केले जाते. लाळ नसणे हे डोस समायोजनासाठी उपयुक्त निकष आहे. २) २ ग्रॅम २ पीएएम १० मिली डिस्टल्ड पाण्यात विरघळली आणि १०-१५ निनिटांसाठी हळू हळू इंजेक्ट करा.

पौधविशाक्तता: शिफारस नुसार देव्हा फॉटीटॉक्सिक वापरले जाते.

वापरेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे: १) यंत्रणा आणि यंत्रसामुग्रीचा निपटारा आणि यंत्रापासून स्वच्छ करणे आणि कंटेनरचा निपटारा करण्यासाठी सुरक्षारक्षक आणि ऑपरेशनचे उत्पादन करणे हे कर्तव्य असेल, जेणेकरुन पर्यावरणीय आणि जल प्रदूषण टाळता येईल. २) वापरलेले पॅकेज त्यांची पुन्हा वापर प्रतिबंधित करण्यासाठी बाहेत ठेवले जाणार नाही. ३) पॅकेजेस घराबाहेर मोडून तोडल्या जातील.

साठवण परिस्थिती: १) कीटनाशके असलेली पॅकेजेस इतर खोल्या विशेषत: खाद्यपदार्थ साठवण्याकरता वापरल्या जाणार्या खोल्या किंवा परिसरातून वगळे खोल्या किंवा परिसरात संगुहित केल्या जातील किंवा त्यानुसार कीटकनाशकाच्या स्वरूपावर लॉक व कळ अंतर्गत वेगले अलमारीमध्ये ठेवल्या जातील. २) कीटकनाशक संचयित करण्यासाठी लागणारे खोल्या किंवा परिसरात वाप सह प्रदूषण टाळण्यासाठी तसेच प्रकाशित, चांगले बांधले, कोरड्या थंड, हवेशीर आणि पुरेसे परिमाम असणे आवश्यक आहे.

रासायनिक रचना:

क्लोरपायरीफॉस ए.आय.	१०.००% व/व
दिवाळखोर नसलेला सुगंध (दरम्यान बाष्पीभवन) (उत्पादन प्रक्रिया)	२.००% व/व
निष्क्रिय ग्रॅन्यूलस (बेंटोनाइट) (८५०/४२०मायक्रॉन)	क्यूयस.% व/व
एकूण.	१००.०० % व/व

सावधानी: लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

ಕ್ಲೋರಿಫೈರಿಫಾಸ್ 10% ಆರ್ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಂಡಕೊರೆಯುವವ, ಲೀಫ್ ರೋಲರ್, ಗಾಲ್‌ಮಿಡ್ಜಿ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟ	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆ. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುಡೀಕೆಯ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನ (ಗ್ರಾಂ)	ಸಿಂಪಡಿ ಕೊಯ್ಲು	ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಹಸರು ಕೊನೆಯ ನಡುವ ಸುವಿಕೆಯ ಕಚನೆ (ದಿನಗಳು)
ಅಕ್ಕಿಯ	ಕಾಂಡಕೊರೆಯುವವ, ಲೀಫ್ ರೋಲರ್, ಗಾಲ್‌ಮಿಡ್ಜಿ	1000	10	-	30

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ

ಪಿ.ಪಿ. ಸಲಕರಣೆ : ಕೈಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ ಲೀಪಕ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿತರಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಕಣಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೆಲ ಸಲ್ಲಿಸಲು 2-3 ಮೀ. ನಿಂತಿರುವ ನೀರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ 2-3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಇಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಇನ್ಹಲೇಷನ್, ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 2. ತಂಬಾಕು ಅಗಿಯಬೇಡಿ, ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ತಿನ್ನಿರಿ. 3. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆ, ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಬೂಟುಗಳು, ಮುಖದ ಗುರಾಣಿ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನ ಮುಖವಾಡ, ಒರೈಲ್, ರಬ್ಬರ್ ಏಪ್ರನ್, ಹುಡ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸಿಂಪಡಿಸದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. 5. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ನಂತರ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಕಲುಷಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 6. ಕಲಸದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸಿಂಪಡಿಸುವವನು.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆನೋವು, ಮುಜುಗರ, ವರ್ಟಿಗೋ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಅತಿಸಾರ. ಸೆಳವು, ಬೆವರುವುದು, ಅತಿಯಾದ, ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಚೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಶಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: 1. ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ 4 ಮಿಗ್ರಾಂ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಟ್ರೊಪಿನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಿದಮನಿ ಮೂಲಕ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 50 ಮಿಗ್ರಾಂ. ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಲಕ್ಷಣಗಳ ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಆಡಳಿತದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಲಾರಸದ ವಿಸ್ತಾರವು ಡೋಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. 2. 10 ಮಿಲೀ. ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1-2ಗ್ರಾಂ 2 ಪಿಎಎಂ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಭಿದಮನಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮಾಡಿ.

ಫಿಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಂತೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು: 1) ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೇಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಟೆನರ್‌ನಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು. 2) ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಆವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊರಗ ಬಿಡಬಾರದು. 3) ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರ ಸುಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ನಿಯಮಗಳು: 1) ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಇತರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹಿಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಲ್ಮೈರಾಗಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2) ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಮೀಸಲಾದ ಕೋಡಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿನ್ಹಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶುಷ್ಕ ತಂಪಾದ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಶಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ಲೋರೊಪೈರಿಫಾಸ್ ಸ.ಪ.	10.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆರೋಮಾಕ್ಸ್ (ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯ)	2.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
ಜಡ ಕಣಗಳು (ಬೆಂಟೋನೈಟ್) (850/420 ಮೈಕ್ರಾನ್‌ಗಳು)	ಕ್ಯುಯಸ್% ತೂಕ/ತೂಕ
ಒಟ್ಟು	100.00% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಃಫಾಸ್ 10% GR

(ಪೂಚ್‌ಸಿಕ್‌ಕೊಲ್ಲಿ)

ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಃಫಾಸ್ 10%ಕುರುಣೆಕಣ್ ಇದು ನೆಠ್‌ಪಯಿರ್ ಪೂಚ್‌ಸಿಕಳೆಕ್ ಕಟ್ಟುಪಟ್ಟುತ್ತ ಉಪಯೋಗಿಕ್‌ಪಟ್ಟುಕಿರಿತು, ಇದಿಲ್ ತೀವಿರ ಮೂಲಪ್‌ಪೊರುಳ್ 10% ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಃಫಾಸ್ ಅಡಂಕಿಯುಳ್‌ಳತು.

ಪರಿನ್ತುರೊ:

ಪಯಿರ್ (ಕಳ್)	ಪೂಚ್‌ಸಿಯಿಲ್ ಪೊತುಪ್‌ಪೆಯರ್	ಮರುನ್ತಳವು/ ಎಚ್‌ಎ ಎಜಿ (ಕಿರಾಂ)	ಃಪೊರ್ಮುಲೆಷನ್ (ಕಿಲೋ)	ತಣ್ಣಣ್ಣಿಲ್ ಕರೈತ್ತಲ್ (ಲಿಟ್ಟರ್)	ಕಡೆಸಿತ್ ತೆಳಿಪ್‌ಪು ಮತ್ತುಂ ಅಮ್ರುವಡೆಕ್‌ಕು (ನಾಟ್‌ಕಳಿಲ್) ಇಡೆಯೇ ಕಾತ್ತಿರುಕ್‌ಕುಂ ಕಾಲಂ
ನೆಲ್	ತಣ್ಣು ತುಳೈಪ್‌ಪಾನ್ ಇಲೈ ಕುರುಟ್ಟುಂ ಪುಳು ಆನೈಕೆಕೊಮಬನ್	1000	10	-	30

ಎಚ್‌ಸಿಕ್‌ಕೈ ಅಪಿಕ್‌ಕೈ: ಲೆಪಿಳಿಲುಂ ಕೈಯೆಟ್‌ಟಿಲುಂ ಕುಣಿಪಿಟ್‌ಟತು ತವಿರ ವೇರು ಎತನ್‌ಕುಂ ಉಪಯೋಕಿಕ್‌ಕಕ್‌ಕೂಟಾತು. ಲೈಃಪ್‌ಲೆಟ್‌ಟಿಲ್ ಕುಣಿಪಿಟ್‌ಟತು ಪೋಲ್ ಉಪಯೋಕತ್‌ತಿಂಕು ಪಿನ್ ಕೊಳ್‌ಕಲತ್‌ತೈ ಅಳಿತ್‌ತುವಿಟವುಂ.

ಉಪಯೋಗಿಕ್‌ಕುಂ ವಳಿಮುಱೈ: ಕ.ಕ. ಉಪಕರಣಂ - ಪರಿನ್ತುರೈಕ್‌ಕಪ್‌ಪಟ್ಟ ಅಳವು ಕಿರಾನುವಲ್‌ಸ ಕೈಯಿನಾಲ್ ಇಯಕ್‌ಕುಂ ಕಿರಾನುವಲ್ ಅಪ್‌ಳಿಕೆಟರೈ ಅಲ್‌ಲತು ಮೆಕ್‌ಕಾನಿಕ್‌ಕಲ್ ಟಿಸ್‌ಪೆನ್‌ಸರೈಪ್ ಪಯನ್‌ಪಡುತ್ತಿ ತೆಳಿಕ್‌ಕ ವೇಣ್‌ಡುಂ. ತೆಳಿಪ್‌ಪತ್‌ಕು ನೆಲ್ ವಯಲಿಲ್ 2-3 ಸೆ.ಮೀ. ತಣ್ಣಣ್ಣೀರ್ ತೇಂಕಿಯಿರುಕ್‌ಕ ವೇಣ್‌ಡುಂ. ತೆಳಿತ್ತ ಪಿಱಕು 2-3 ನಾಟ್‌ಕಳುಕ್‌ಕು ತಣ್ಣಣ್ಣೀರ್ ತೇಕ್‌ಕಿ ವೈಕ್‌ಕವುಂ.

ಮುನ್‌ನೆಚ್‌ಚರಿಕ್‌ಕೈ: 1. ಉಣವುಪ್‌ಪೊರುಟ್‌ಕಳ್, ವೆಂಱು ಉಣವು ಕೊಳ್‌ಕಲಂಕಳ್ ಮತ್ತುಂ ವಿಲಂಗುಕಳುಕ್‌ಕಾನ ತೈವನತ್‌ತಿಲಿರುನ್ತು ತೊಲವಿಲ್ ವೈಕ್‌ಕವುಂ 2. ವಾಯ್, ಕಣ್‌ಕಳ್ ಮತ್ತುಂ ಚರುಮತ್‌ತಿಲ್ ಪಡುವತೈ ತವಿರ್‌ಕ್‌ಕವುಂ. 3. ನುಣ್ ತಿವಳೈಕಳೈ ಉಟ್‌ಸುವಾಶಿಪ್‌ಪತೈ ತವಿರ್‌ಕ್‌ಕವುಂ ಮತ್ತುಂ ಕಾಱ್‌ಱು ವೀಶುಂ ತಿಶೈಯಿಲ್ ತೆಳಿಕ್‌ಕವುಂ. 4. ತೆಳಿತ್ತ ಪಿಱಕು ಮರುನ್ತು ಪಟ್ಟ ಆಡೈಕಳ್ ಮತ್ತುಂ ಉಲಲ್ ಉಱುಪ್‌ಪುಕ್‌ಕಳೈ ಮುಳುವತುಮಾಕ ಕಳುವವುಂ. 5. ತೆಳಿಕ್‌ಕುಂಪೋತು ಎತೈಯುಂ ಅರುನ್‌ತವೋ, ಮೆಲ್‌ಲವೋ ಅಲ್‌ಲತು ಪುಕೈಪ್‌ಪಿಡಿಕ್‌ಕವೋ ಕೂಟಾತು. 6. ತೆಳಿಕ್‌ಕುಂಪೋತು ಮುಳು ಪಾತುಕಾಪ್ಪು ಉಟೈಕಳೈ ಅಣಿಯವುಂ.

ಪೈಟೋಟಾಕ್‌ಸಿಟ್‌ಟಿ: ಪರಿನ್ತುರೈಕ್‌ಕಪ್‌ಪಟ್ಟಪಡಿ ವಯಲಿಲ್ ಪಯನ್‌ಪಡುತ್‌ತಿನಾಲ್ ಇನ್ತ ತಯಾರಿಪ್‌ಪುಕ್‌ಕು ಪೈಟೋಟಾಕ್‌ಸಿಟ್‌ಟಿ ಏಱ್‌ಪಡಾತು. ಅಱಿಕುಱಿಕಳುಂ ಮತ್ತುಂ.

ವಿಷಮೆರಿಯತಱ್‌ಕಾನ ಅಱಿಕುಱಿಕಳ್: ತಲೈವಲಿ, ತಲೈಚ್‌ಸುಱ್‌ಱಲ್, ತಳ್‌ಳಾಟುತಲ್, ಕುಮಟ್‌ಟಲ್, ವಾನ್ತಿ, ಮಂಕಲಾನ ಪಾರ್‌ವೈ, ವಯಿಱ್‌ಱುಪ್ ಪೋಕ್‌ಕು, ವಲಿಪ್‌ಪು, ವಿಯರ್‌ವೈ, ಮಿತಮಿಞ್‌ಸಿ ಕಣ್‌ಣೀರ್ ಮತ್ತುಂ ಎಚ್‌ಸಿಲ್ ವಡಿತಲ್ ಏಱ್‌ಪಡಲಾಂ.

ಮುತಲುತವಿ: 1. ವಿಱುಂಗಿವಿಟ್‌ಟಾಲ್, ತೊಣ್‌ಡೈಕ್‌ಕುಳ್ ವಿರಲೈವಿಟ್‌ಟು ವಾನ್‌ತಿ ಎಟುಕ್‌ಕಚ್ ಚೆಯ್‌ಯವುಂ. ತೆಳಿವಾಕ ವಾನ್‌ತಿ ಎಟುಕ್‌ಕುಂ ವರೈ ತೊಟರ್‌ನ್‌ತು ಅವ್‌ವಾಱು ಚೆಯ್‌ಯವುಂ. ನೋಯಾಳಿ ಮಯಕ್‌ಕಮುಱ್‌ಱು ಇರುನ್‌ತಾಲ್ ಅವ್‌ವಾಱು ಚೆಯ್‌ಯಕ್‌ಕೂಟಾತು. 2. ಆಡೈಕಳ್ ಮತ್ತುಂ ಚರುಮತ್‌ತಿಲ್ ಮರುನ್‌ತು ಪಟ್‌ಟಾಲ್, ಆಡೈಕಳೈ ಕಳೈನ್‌ತು ಸೋಪ್‌ಪು ಮತ್ತುಂ ಏರಾಳಮಾನ ತಣ್‌ಣೀರ್ ಕೊಂಡು ಕழುವವುಂ. 3. ಕಣ್‌ಕಳಿಲ್ ಮರುನ್‌ತು ಪಟ್‌ಟಾಲ್ ಏರಾಳಮಾನ ಉಪ್‌ಪು/ಸುತ್‌ತಮಾನ ತಣ್‌ಣೀರೈ ಅಟಿತ್‌ತು ತೋರಾಯಮಾಕ 10 ಲಿರುನ್‌ತು 15 ನಿಮಿಟಙ್‌ಕಳುಕ್‌ಕು ಕழுವವುಂ. 4. ಉಟ್‌ಸವಾಶಿತ್‌ತಾಲ್, ನೋಯಾಳಿಯೈ ಕಾಱ್‌ಱು ವೀಶುಂ ಇಟತ್‌ತಿಱ್‌ಕು ಕೊಂಡು ಚೆಲ್‌ಲವುಂ.

ಎತಿರ್ ಮರುನ್‌ತು: 1. ಉಟನಟಿಯಾಕ ನೋಯಾಳಿಕ್‌ಕು ಅರೋಪೈಟೈಸ್ ಚೆಯ್‌ಯವುಂ. ಮೇಲುಂ 5ಲಿರುನ್‌ತು 10 ನಿಮಿಟ ಇಡೈವೆಳಿಯಿಲ್ ಅಟ್‌ರೋಪೈನ್ ಸಲ್‌ಪೇಟ್‌ಟಿನ್ 2ಲಿರುನ್‌ತು 4 ಮಿಕಿ ಟೋಸ್‌ಕಳೈ ಮೀಣ್‌ಡುಂ ಮೀಣ್‌ಡುಂ ಕೊಟುತ್‌ತು ಮುಳು ಅಟ್‌ರೋಪೈನೈಸೇಷನೈ ನಿಱ್‌ವಕಿಕ್‌ಕವುಂ. ಒರು ನಾಳುಕ್‌ಕು 25ಲಿರುನ್‌ತು 50 ಮಿಕಿ ಅಟ್‌ರೋಪೈನ್ ಕೊಟುಕ್‌ಕ ವೇಣ್‌ಡಿಯ ತೇವೈ ಏற்ಪಡಲಾಂ. ಎಚ್‌ಸಿಲ್ ವಡಿಯುಂ ಅಳವು ಟೋಸೈ ಸರಿಚೆಯ್‌ವತಱ್‌ಕಾನ ಪಯನ್‌ಮಿಕ್‌ಕ ವಿತಿಮುಱೈಯಾಕುಂ. 2. 1-2 ಕಿರಾಂ 2 ಪಿಎಂ-ಇ 10 ಮಿಲಿ ಟಿಸ್‌ಟಿಲ್‌ಟ್ ವಾಟ್‌ಟರಿಲ್ ಕರೈತ್‌ತು ಅತನೈ 10-15 ನಿಮಿಟಙ್‌ಕಳುಕ್‌ಕು ಮೆದುವಾಕ ಇಂಟ್‌ರಾವೀನಸ್ ಇಂಜೆಕ್‌ಷನಾಕ ಉಟ್‌ಸೆಲುತ್‌ತವುಂ.

ಅಪ್‌ಪುಱಪ್‌ಪಡುತ್‌ತುತಲ್: 1. ಪೆಕ್‌ಕೆಜ್‌ಕಳ್ ಅಲ್‌ಲತು ಮಿಞ್‌ಸಿಯ ಮರುನ್‌ತು ಮತ್ತುಂ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತುಂ ಕೊಳ್‌ಕಲನೈ ಕழுವಿಯ ತಣ್‌ಣೀರೈ ಸುற்ಱುಪ್‌ಪುಱಂ, ತಣ್‌ಣೀರ್ ಮತ್ತುಂ ಮಾಸುಕ್‌ಕೆಟ್‌ಟೈ ತடுಕ್‌ಕುಂ ವಕೈಯಿಲ್ ಅಪ್‌ಪುಱಪ್‌ಪಡುತ್‌ತುವತು ಪೂಞ್‌ಚಣಾಙ್‌ಕೊಲ್‌ಲಿಯಿನ್ ಉற்ಪತ್‌ತಿಯಾಳರ್‌ಕಳ್ ಮತ್ತುಂ ಆಪರೇಟ್‌ಟರ್‌ಕಳಿನ್ ಕಡಮೈಯಾಕುಂ. 2. ಪಯನ್‌ಪಡುತ್‌ತಿಯ ಪೆಕ್‌ಕೆಜ್‌ಕಳೈ ಮೀಣ್‌ಡುಂ ಪಯನ್‌ಪಡುತ್‌ತುಂ ವಕೈಯಿಲ್ ವೆಳಿಪ್‌ಪುಱಂ ವಿಟ್‌ಟು ವைக்‌ಕப்‌படக் கூடாது. 3. பெக்‌கேஜ்‌களை உடைக்‌கப்‌பட்‌டு குடியிருப்‌பு பகுதியிலிருந்‌து தொலைவில் புதைக்‌கப்‌பட வேண்‌டும்.

ಚೆಮಿತ್‌ತು ವೈಕ್‌ಕುಂ ನಿಲೈಕಳ್: 1. ಪೂಚ್‌ಸಿಕ್‌ಕೊಲ್‌ಲಿ ಕೊಂಡ ಪೆಕ್‌ಕೆಜ್‌ಕಳೈ ಮಱ್‌ಱ ಪೊರುಟ್‌ಕಳೈ ಚೆಮಿತ್‌ತು ವೈಕ್‌ಕುಂ ಅಱೈಕಳ್ ಅಲ್‌ಲತು ಕட்‌டிடங்‌களிலிருந்‌து தொலைவில் உள்‌ள அறைகள் அல்‌லது கட்‌டிடங்‌களில் பூச்‌சிக்‌கொல்‌லியின் அளவு மற்‌றும் தன்‌மையை பொறுத்‌து பூட்‌டு சாவியுள்‌ள அலமாரிகளில் வைக்‌க வேண்‌டும். 2. பூச்‌சிக்‌கொல்‌லியை சேமித்‌து வைக்‌கும் அறைகள் அல்‌லது கட்‌டிடங்‌கள் உலர்‌ந்‌த, நன்‌றாக கட்‌டப்‌பட்‌ட, நல்‌ல காற்‌றோட்‌டம் உள்‌ள மற்‌றும் ஆவியால் மாசுபடுவதை தடுப்‌பதற்‌கான போதுமான அளவிலானதாக இருக்‌க வேண்‌டும்.

ರಸಾಯನಚ್ ಚೇರ್‌ಕ್‌ಕೈ:

ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಃಫಾಸ್ ತೈ.ಮೂ.ಪೊ.:	10.000% w/w
ಸಾಲ್‌ವೆಂಟ್ ಅರೋಮಾಕ್ಸ್ (ತಯಾರಿಪ್ಪು ಮುಱೈಯಿನ್‌ಬೋತು ಆವಿಯಾಕಿವಿಟ್‌ಟತು):	2.000% w/w
ಚೆಯಲಱ್‌ಱ ಕಿರಾನುವಲ್‌ಸ್ (ಪೆನ್‌ಟೋನೈಟ್) (850/420 ಮೈಕ್‌ರಾನ್‌ಸ್)	100 ಆಕ್‌ಕಿಡ ಮೊತ್ತಂ
ಮೊತ್ತಂ:	**100.000% w/w**

क्लोरपाइरीफ़ॉस 10% जी.आर.

જંતુનાશક

ક્લોરપાઇરીફ઼ોસ 10% દાણાદાર ધાન ના કીટના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમાં ક્લાયપાઇરીફ઼ોસ 10% સ.ત. ધરાવે છે.

ઉપયોગ :

પાક	કીટ નું સામાન્ય નામ	પ્રમાણ/હેક્ટર સક્રિય તત્વ (ગ્રામ)	પાણીની સંરચના (કિ.ગ્રા.)	મિશ્રણનું પ્રમાણ (લીટર)	છેલ્લો છંટકાવ કે કાપણી વચ્ચેનું અંતર (દિવસમાં)
ધાન લીફ રોલર ગાલ મિજ	સ્ટેમ બોરર	1000	10	-	30

છોડ સુરક્ષા યંત્ર: હસ્ત ચાલિત અને મૅકેનિકલ ડિસ્પેન્સર થી શિફારસ કરી માત્રાને ખેતર માં છંટકાવ કરો ખેત માં ૨ થી ૩ સે.મી. પાણી ભર્યો જોઈએ અને ૨-૩ દિવસ સુધી પાણી ખેતર માં ભર્યો રાખો.

વાપનાર માટે સાવચેતી:

1 ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો.
2 મુખ, ત્વચા અને આંખ ના સંપર્કથી બચાવો.
3 છંટકાવને શ્વાસ માં જાવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો.
4 છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીને ધોઈ નાખવા.
5 છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો.
6 વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ.

વિષમયતા : નિર્દેશ અનુસાર પ્રયોગ કરવામાં આવે ત