AALTRAVIN

BPMC (Fenobucarb) - 50% EC

(Insecticide)

It is a stomach and contact action insecticide containing BPMC active ingredient 50% by mass and balance adjuvants.

Recommendations :

Crop(s)	Common name of Pest	a.i. (Kg.)	Dosage/Ha Formu-lation (Ltr)	Dilution in (Ltr)	Waiting period between last spray to harvest (in days)
paddy	green leaf	0.25-0.75	0.5-105	500	30
	brown plant hopper	0.25-0.75	0.5-105	500	30

Time of Application : Spray when of insect attack is seen.

Direction of Use : P.P. Equipment :- High volume nozzle fitted to sprayer like knapsack. Air pressure, Foot pump, Hand Rocker or power operated spraying machines may be used.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendaton.

Symptoms of Poisoning : Headache, nausea, dizziness, vomiting, diarrhoea, abdominal pain, profuse sweating, Salivation, constricted pupils, muscular incoordination, coma and death may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat is until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Do not use oxime as 2 - PAM.

Disposal Of Used Container:
1. Packages of surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:
1. The Packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms of premised used for storing other articles particularly articles of food or shall except in separate almirahs under lock and key.
2. The rooms or premises meant fo restoring the insecticides shall be well built. dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Chemical Composition:

2-Save-Butayl -N-Methyl Carbmet-BPMC 'min. purity - 15' a.i.	50.000% w/w
Emulsifier : 'Blend of Calcium Alkayl Arayl Sulfonate and poly Oxy Ethylene Ether'	10.000% w/w
Solvent : Aromex	40.000% w/w
Total :	100.000% w/w

आलट्राविन

बी.पी.एम.सी. फेनोब्युकार्ब ४०%ई.सी.

(कीटनाशक)

यह बी पी एम सी टेक्निकल से निर्मित तेलीय संरचना है जिसमें भारानुसार बीपीएमसी सक्रिय तत्व ५० प्रति. बाकी अन्य सहयोगी पदार्थ हैं।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम		प्रति हेक्टेयर मात्रा			अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
		स.तत्व. (कि.ग्रा.)	संरचना (ली.)	पानी की मात्रा (ली.)		
धान	हरे पत्ते का फुदका	०.२५-०.७५	०.५-१.५	५००		३०
	भूरे पौध का फुदका	०.२५-०.७५	०.५-१.५	५००		३०

छिड़काव का समय : जब पहली बार कीड़ो का दुष्प्रभाव दिखाई दे तो छिड़काव आरंभ करें।

उपयोग में आने वाले यंत्र : उपयोग में आने वाले यंत्र नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई.एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचाएं। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना,पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

पौध विशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नही है।

विष के लक्षण : सिर दर्द, मचली, उल्टी, चक्कर आना, दस्त, पेटदर्द, लार टपकना, ज्यादा पसीना आना, पुतलियों का सिकुड़ना, नसों में तनाव, कोमा और मृत्यु हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल लिया जाए तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज़ बेहोश हो तो उल्टी न कराएं। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो दूषित कपडे उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जाएं तो उनको काफी मात्रा में सेलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१ मिनट तक धोएं। ४. यदि साँस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएं।

विषनाशक : १. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मि.ग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अंतराल पर अंतःशिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मि.ग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती है। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है। २. किसी ऑक्जिम का प्रयोग न करें।

संग्रह : १. कीटनाशक के पैकेटों को खाद्य पदार्थ या अन्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरों से अलग, अलग-अलग पौधविकास वर्धक के प्रमाण व प्रकार के हिसाब से अलग अलग कमरों अथवा अलमारियों में ताला चाबी में रखें। २. जिस जगह कीटनाशक का संग्रह करना हो वह कमरा अथवा जगह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त हवादार और पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए ताकि पौधविकास सहायक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का डर न हो।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड़ फोड़कर आबादी से दूर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। २. खाली डिब्बों को दोबारा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला हुआ न छोडें। ३. खाली डिब्बो को साधनों के धोवन तथा बची हुई पौधविकास वर्धक का योग्य रीती से निपटारा करें जिसमें वातावरण तथा पीने के पानी विषैला होने का डर न हो।

रासायनिक संघटन :
२-सेक-बुटिलफिनील-एन-मिथील काबमिट-बिपिएमसि.स.त.

किमान शुद्धता ९५ टक्के	५०.०००% भार/भार
इमल्सीफायर्स कॅल्शियम अल्किल अरिल सल्फोनेट आनि पॉली ऑक्सी इथीलीन ईतर चांये मिश्रण	१०.००० % भार/भार
सॉल्वेंट अरोमॅक्स	४०.०००% भार/भार
कुल	१००.०००% भार/भार

ఆల్ట్రావిన్

బిపిఎంసి (పెనోబ్యుకార్బ్)-50% ఇసి

(కీటకనాశని)

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

బి.పి.యం.సి. అనునది ఉదర మరియు స్పర్శ చర్యలు గల 50% సక్రియ పదార్థం మరియు తత్సంబంధమూలకాలు కలిగినకీటకనాశని

సిఫారసులు :

పంట	తెగులు సాధారణ నామము	క్రి.శీ. (గ్రా/10కి.గ్రా. విత్తనమునకు)	మోతాదు / హెక్టారుకు క్రిమిసంహారిణి (గ్రా/10కి.గ్రా. విత్తనమునకు)	నీటి మోతాదుపంట (లీటర్లలో)	ఆఖరి పిచికారి, కోయుటకు మధ్య కాలం (రోజుల్లో)
వరి	ఆకుమాడు పచ్చ ఆకు	0.25-0.75	0.5-105	500	30

ఉపయోగించు సమయం: పైరు మీద కీటకాలు కనబడగానే ఈ మందు స్ప్రే చేయవలెను.

మందు ఉపయోగించు యంత్ర పరికరము : ఎక్కువ పరిమాణము గల విత్తనముల శుద్ధికి, త్రిప్పుటకు వీలుగల హ్యాండిల్ గల మూలకలిగియున్న డ్రమ్మునుపయోగించవలెను. ప్రత్యేకకోణములో డ్రమ్ము కింద స్టాండును ఉంచవలెను. దీని వలన మందు విత్తనములకు సమానముగా అంటుకొంటుంది. విత్తనములు ఆరిన తరువాత విత్తుటకు సురక్షితముగా భద్రపరుచుకొనవలెను.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసముల నుండి దూరముగా భద్రపరచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. 4. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితదుస్తులు మరియు శరీరభాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి మందును ఉపయోగించునప్పుడు చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణమును కలుపునపుడు మరియు ఉపయోగించునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులను ధరించవలెను.

విషలక్షణములు : తలనొప్పి, మగత, వాంతులు, ముక్కు, గొంతు మరియు కళ్లలలో దురద వంటివి కనబడతాయి.

ప్రథమచికిత్స : 1. మందును మింగినచో గొంతులోనికి వేళ్ళుజొనిపి వాంతిచేయించవలెను. మందుద్రావణమును పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు మరల మరల వాంతి చేయించరాదు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తీసివేసి సబ్బు మరియు ఎక్కువ పరిమాణముగల నీటితో శరీరమును బాగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 3. కళ్ళలో మందు పడినచో 10-15 నిమిషముల వరకు శుభ్రమైన నీటితోధారగా కడగవలెను.

విషరుల్యత : మందును సూచింపబడిన మోతాదులో ఉపయోగించినచో హానికారము కాదు.

విరుగుడు : దీనికి ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీలేదు. రోగి లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి.

విషనాశకం : ఎటువంటి విశేషమయిన విషనాశకం లేదు. లక్షణాన్నిబట్టి చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ డబ్బాల సష్టీకరణం : 1. కీటనాశక నిర్మాతలు లేక ఉపయోగించేవారి కర్తవ్యం ఏమిటంటే, డబ్బాలు లేదా పాత్రలను విరగ్గొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయట విడువవద్దు. 3. డబ్బాలు లేదా మిగిలిన కీటనాశకం లేదా యంత్రాలను కడిగిన ద్రవం చాలా జాగ్రత్తగా పరిసరాలు, నీటి వనరాలు, త్రాగు నీటికి హాని కలుగకుండా చూడండి.

నిలువ షరతులు : 1. కీటనాశక డబ్బాలను వేరు-వేరు గదులలో లేక అలమారుల్లో వాడుకొనే సామాన్లకు దూరంగా, ఖాద్యాన్న, వస్తువులకు, పశుగ్రాసానికి దూరంగా మీగం వేసి జాగ్రత్త పరచండి. 2. ఏ గదులలో లేక అలమారుల్లో కీటనాశకాన్ని నిలువ చేస్తారో అవి బాగా గట్టిగా కట్టబడి, ఎండుగా, చల్లగా, ప్రకాశమయంగా, గాలువాటుగా మరియు సరిపడే ఆయాతంలో ఉండాలి. కాటనాశక భాష్పంతో వాతావరణం కలుషితం కాకుండా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

2-సేవ్-బ్యుటైల్-ఎన్-మిథైల్ కార్బోమేట్-బిపియం.సి. (కనీస స్వచ్ఛతపై ఆధారిత)	50.000% భా/భా
ఎమల్సిఫియర్: బ్లెండ్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆల్కైల్ అరైల్ సల్ఫోనేట్ & పాలీ ఆక్సి ఇథైలిన్ ఇథర్	10.000% భా/భా
సాల్వెంట్: ఆరోమెక్స్	40.000% భా/భా
మొత్తము	100.00 భా/భా

AGASTYA

AALTRAVIN

BPMC (Fenobucarb) - 50% EC

(Insecticide)

आलट्राविन

बी.पी.एम.सी. फेनोब्युकार्ब ४०%ई.सी.

(कीटनाशक)

ఆల్ట్రావిన్

బిపిఎంసి (పెనోబ్యుకార్బ్)-50% ఇసి

(కీటకనాశని)

ALTRAVIN

बी.पी.एम.सी. फेनोब्युकार्ब ४०%ई.सी.

(कीटनाशक)

ALTRAVIN

बी.पी.एम.सी. फेनोब्युकार्ब ४०%ई.सी.

(कीटनाशक)

CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

खतरा अलर्ट DANGER

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured by :

AGASTYA AGRO LIMITED

UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally -501 401 Medchal Dist.,Telangana State.

Mfg No: 027/TS-IML/2017 (Old Lic. no:220/1997-98, Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.

Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company

Customer Care Manager No.: 040-64576958

E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Regn.No.:CIR 36559/2001 BPMC (BC)-93

आलट्राविन

BPMC (फेनोबुकार्ब) ५०% ईसी. (कीटनाशक)

खबरदारीः लेबल/हस्तपत्रिकेत निर्देशित पीकां व्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरू नये.

हे एक पोटातून आणि स्पर्शाद्वारे कृती करणारे कीटनाशक आहे आणि त्यामध्ये भाराने ५० टक्के BPMC सक्रीय घटक आणि बाकी सहगामी घटक आहेत.

शिफारसः

पीक	कीटकाचे सामान्य नाम	स.त. (ग्राम)	प्रमाण दर द्रावण (मिली)	सौम्य करण्यासाठी पाणी (लि.)	शेवटची फवारणी व कापणी मधील अंतर (दिवसात)
भातावरील	हिरवा तुडतुडा	०.२५-०.७५	०.५-१.५	५००	३०
	तपकिरी तुडतुडा	०.२५-०.७५	०.५-१.५	५००	३०

वापरण्याची वेळः कीडाचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यानंतर फवारणी करावी.

वापरण्यासाठी निर्देशः पीक संरक्षण उपकरणः नोझलयुक्त उच्च प्रमाणाचा स्प्रेयर जसे की नॅपसॅक, एयर प्रेशर, फूट पंप, हँड रॉकर किंवा वीजेवर संचालित फवारणी यंत्रे वापरता येतील.

खबरदारीः १. अज्ञपदार्थ, अज्ञपदार्थाचे रिकामे डबे आणि पशुखाद्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. ३. फवारणी धुके श्वासावाटे आत जाणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. प्रदूषित कपडे आणि शरीराचे भाग फवारणीनंतर स्वच्छ धुवा. ५. फवारणी करताना धूम्रपान करु नका, काहीही पिऊ, खाऊ आणि चघळू नका. ६. मिसळताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडे घाला. पीकासाठी विषकारकताः शेतात शिफारशीनुसार वापरल्यानंतर हे उत्पादन पीकांना विषारी नाही.

विषबाधेची लक्षणेः डोकेदुखी, मळमळ, गरगरणे, उलटा, अतिसार, ओटीपोटात वेदान, अतिशय घाम, लाळ, बुबुळे बारीक होणे, स्नायूंचा समन्वय बिघडणे, कोमा आणि मृत्यु उद्भवू शकतो.

प्रथमोपचारः १. पोटात गेल्यास, घाट्याच्या मागील बाजूस बोटाने दाबून उलटी करवावी. उलटीचे पाणी स्वच्छ येईपर्यंत पुन्हा करावे. रुग्ण बेशुद्ध असेल तर उलटी करवू नये. २. कपडे आणि त्वचा प्रदूषित असतील तर, कपडे काढा आणि त्वचेचा प्रदूषित भाग भरपूर पाणी आणि साबण वापरुन धुवा. ३. डोळे प्रदूषित झाल्यास, १० ते १५ मिनिये भरपूर सलाईन/स्वच्छ पाण्याने फ्ला करा. ४. श्वासावाटे आत गेल्यास, रुग्णाला ताज्या हवेत न्या. प्रतिउपायः १. रुग्णाला तत्काळ अट्रोपिनाईज करा आणि शिरेतून २ ते ४ मिग्रॅच्या वारंवार मात्रा ५ ते १० मिनिटांच्या अंतराने देऊन संपूर्ण अॅट्रोपिनायझेशन करा. एका दिवसात २५ ते ७० मिग्रॅ अॅट्रोपीन आवश्यक राहील. पुढील अॅट्रोपिन मात्रा देण्याची गरज लक्षणे निरंतर राहण्याने समजते. मात्रा कमी-अधिक करण्यासाठी लाळेचे प्रमाण हा एक उपयुक्त निकष ठरू शकतो. २. ऑक्सीमचा वापर २-PAM म्हणून करु नये.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाटः १. पाकिटे किंवा शिल्क साहित्य आणि मशीन्स आणि भांडी धुण्याचे पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे जेणेकरुन पर्यावरण किंवा पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही. २. रिकामे कंटेनर्स उघडावर ठेवू नयेत म्हणजे त्यांचा पुन्हा वापर होणार नाही. ३. रिकामे कंटेनर्स नष्ट करावेत आणि वस्तीपासून दूर पुरून टाकावेत.

साठवणीसाठी अटीः १. कीटनाशक असलेली पाकिटे स्वतंत्र खोल्या किंवा इमारतींमध्ये अन्य वस्तू विशेषत अज्ञपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर साठवावीत किंवा कीटनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरुप यांच्यावर आधारित कुलुपबंद स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवावीत. २. कीटनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारती चांगल्या बांधलेल्या, कोरडा, प्रकाशमय आणि हवेशीर असाव्यात आणि वाफेशी प्रदूषण टाळण्यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

रासायनिक संरचनाः

२-सेक-बुटिलफिनील-एन-मिथील कार्बामेट-

BPMC स.त. किमान शुद्धता १५ टक्के	५०.००० टक्के भार/भार
इमल्सीफायर्स कॅल्शियम अल्किल अरिल सल्फोनेट आणि पॉली ऑक्सी इथीलीन ईथर यांचे मिश्रण	१०.००० टक्के भार/भार
सॉल्वंट अरोमॅक्स	४०.००० टक्के भार/भार
एकूणः	१००.००० टक्के भार/भार

ಆಲ್ಟ್ರಾವಿನ್

ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. (ಫೆನೋಬುಕಾರ್ಬ್) - 50 % ಇ.ಸಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಇದು ಸ್ವಿಶ್ವಾ ಚಟಿಯಾಪುಳ್ಳ ಹಾಗು ಉದರ ಚಟಿಯನಪುಳ್ಳ ಕೀಟನಾಶಿನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಮೂನೀ ಮತ್ತು ನೀಹಾಯ ದಿದಾಥ್ಯಗಳು ನಿಮುಲುಲ್ಯ ಕಾವರಪಾರದ್ದು.

ಬೆಳೆ	ರೋಗ ಸಧಾರಣ ಹೆಸರು	ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ (ಗ್ರಾ/10.ಕಿ.ಲೋ. ಬೀಜಕ್ಕೆಗ್ರಾ.)	ಅಂದಾಜು/ಹೆ. (ಗ್ರಾ/10.ಕಿ.ಲೋ. ಬೀಜಕ್ಕೆಗ್ರಾ.)	ನೀರಿನ ಕೊನೆಯ ಪರಿಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ದಿಂದ ಬೆಳೆಕೊಯ್ಯಿಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ
ಭತ್ತ	ಹಸೀರು ಕಿಕ್ಕಿಹುಳು	0.25-0.75	0.5-1.5	500	30
	ಕಂದು ಎಲೆಕೊರಿಕ	0.25-0.75	0.5-1.5	500	30

ಔಷಧಿಯ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು : ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಪರಿಕರ : ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಬೀಜ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಹ್ಯಾಂಪಿಲ್ ವುಳ್ಳ, ಮುಚ್ಚಳ ವಿರುವ ಡ್ರಮ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಸದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ಮನ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಥೈರಮ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್‌ನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರುವ ನೀರನ್ನು ಡ್ರಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಔಷಧಿಯೂ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಅಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೀಜಗಳ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಬಿತ್ತಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ: 1. ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಬೇಕು. 2.ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಬೇಕು. 3. ಮೂಗಿನಿಂದ ಮೂಸುವುದು, ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. 4 . ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಖಾಲಿ ಪಾಕೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಸ್ಕಿಯಗೊಳಿಸಿ, ಸಿಂಪರಣೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಗಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಂತೆ ನಿಲುವಂಗಿ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ವಿಷಲಕ್ಷಣಗಳು : ತತೆನೋವು, ಮಂಪ್ಸಾಗಿರುವುದು, ವಾಂತಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಔಷಧಿ ನುಂಗಿದ್ದದಾರೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಿಯ ದ್ರಾವಣ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತೇ ಮತ್ತೇ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 2. ರೋಗಿ ಎಚ್ಚರ ವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬಾರದು. 3. ವಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ಶುಭ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಬಿದ್ದದ್ದರೆ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಶುಭ್ರವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಿಷತ್ಕುಲನೆ : ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕನಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧಿ ವೇನೂ ಇಲ್ಲಾ. ವಿಷಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಖಾಳಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ : 1. ಯಂತ್ರ ಪರಿಕರಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಳೆದ ಔಷಧದ ನೀರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಾವಾಸಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿ, ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಗೋಳಿಸದಂತೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. 2. ಔಷಧಿಯ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬರದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ಇಡಬೇಕು. 3. ಖಾಳಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಅಳವಾಗಿ, ಅಗೆದು ಇಡಬೇಕು. ಔಷಧಿಯ ಶೇಖರಿಣೆ ಭದ್ರಪಡಿಸುವಿಕೆ :1. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಳಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಔಷಧಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರದಂತೆ ನೋಡಬೇಕು. 2. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ, ಒಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಸಾಯನಕ ಮಿಶ್ರಣ :

2-ಸೆಕ್-ಬ್ಯೂಟಾಯಿಲ್

ಫಿನಾಯಿಲ್-ಎನ್-ಮಥಾಯಿಲ್(ಕನಿಷ್ಠ ಶುದ್ಧತೆ - 95%)	50.00%ತೂಕ/ತೂಕ
1ಕಾರ್ಬಾಮೇಟ್ - ಬಿಪಿಎಮ್‌ಸಿ. ಎ.ಐ.	
ಇಮಲ್ಸಿಫಾಯರ್ - ಬ್ಲೇಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಮೂಲ ಆಸ್ಸಿ ಇಥೈಲೀನ್ ಈಥರ್	10.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ : ಆರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್	40.00%ತೂಕ/ತೂಕ
ಮೊತ್ತ:	100.00 % ತೂಕ/ತೂಕ

ஆதடாவிக்ஷ்மந்த

BPMC (ஃபெனோபுகார்ப்)-50% E.C (பூச்சிக்கொல்)

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்கள் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

பட்டவுடன் வயிற்றைத்தாக்கி செயல் படும் பூச்சிக் கொல்யான இதில் BPMC ஆக்டிவ் உட்பொருள் 50% பை மாஸ் ஆகவும் மற்றும் மீதமிருப்பது அட்ஜூவென்ட்ஸாகவும் உள்ளது.

பரிந்துரைகள்:	பயிர்கள்	நெல் பூச்சிகளின்	பொதுவான	பெயர்கள் பச்சை
இலை சுருட்டி	0.25 - 0.75	0.5 - 1.5	500	30
பழுப்பு செடி சுருட்டி	0.25 - 0.75	0.5 - 1.5	500	30

பிரதி ஹெக்டேருக்கான டோஸேஜ்... கரைசல் அ.ஜ. ஃபார்முலேஷன் (g/%) தண்ணீர் அளவு (ட்டர்) (ml.%) கடைசி தெளிப்பு மற்றும் அறுவடைக்கு இடையே காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்) பயன்படுத்தும் காலம்: புழு பூச்சிகளின் தாக்குதல் தெரியத் தொடங்கியதுமே ஸ்ப்ரே செய்ய வேண்டும்.

உபயோகிப்பதற்கானவழிமுறைகள்: P.P. உபகரணங்கள்: நேப்ஸேக், ஏர் பிரஷ்ஷர், ஃபூட் பம்ப், ஹேண்ட் ராக்கர் அல்லது பவரில் இயங்கும் ஸ்ப்ரேயிங் மெஷின்கள் போன்ற நாஸில் பொருத்தப்பட்ட ஹோ வால்யூம் ஸ்ப்ரேயர்களைஉபயோகிக்கலாம். 1. உணவுப்பொருட்கள், உணவுப் பொருட்கள் வைத்திருந்த காடப்பாக்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்களுக்கு அருகே இதை வைக்க வேண்டாம். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தின் மீது படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரேயின் மூட்டத்தை உள்ளுக்குள் முகர்வதைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசை நோக்கி ஸ்ப்ரே செய்யவும். 4. ஸ்ப்ரே சய்து முடித்ததும் பூச்சி மருந்து பட்ட கணிகளையும், சருமப் பகுதிகளையும் நன்றாக சோப்பு போட்டு கழுவவும். 5. மருந்தை தெளிக்கும்போது புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிவோ அல்லது எதையாவது மெல்லவோ கூடாது.. 6. மருந்தை தெளிக்கும்போதும், கலக்கும்போதும் முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணிந்து கொள்ளுங்கள். பைடோஸிடி: வயல்களில் தெளிப்பதற்கான பரிந்துரைகள பின்பற்றினால் இந்த புராடக்ட் பைடோஸிடி அல்ல.

விஷமுண்டானதற்கான அறிகுறிகள்: தலைவ, குமட்டல், கிறுகிறுப்பு, வாந்தி.வயிற்றுப்போக்கு, அடவயிற்றில் வ, மிகுதியான அளவில் வியர்வை வழிதல், கண்மணிகளில் அயர்ச்சி, திக்கல் முரண்பாடாக செயல்படுவது, கோமா மற்றும் மரணம் கூட சம்பவிக்க நேரிடலாம்.

முதலுதவி: 1. உள்ளுக்குள் மருந்தை விழுங்கியிருந்தால், தொண்டைக்குள் விரலை விட்டு வாந்தி எடுக்கச் செய்யவும். பாத்க்கப் பட்ட நபர் எடுக்கும் வாந்தி தெளிவாகத் தெரியும் வரை மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து இவ்வாறு செய்து கொண்டிருக்கவும். நோயாளி மயக்க நிலையில் இருந்தால் அவரை வாந்தி எடுக்கச் செய்ய வேண்டாம். 2. துணிகள் மற்றும் சருமத்தில் பூச்சக் கொல் பட்டிருந்தால் குணிகளை கழற்றி துவைத்து. பாதிக்கப் பட்ட சருமப் பகுதிகளை நன்றாக சோப்பு போட்டு தண்ணீரால் கழுவவும். 3.. மருந்து கண்களில் பட்டிருந்தால் சுமார் 10 - 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான சலைன் / தண்ணீரால் கழுவவும். 4. மருந்தை உள்ளுக்குள் விழுங்கியிருந்தால் நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமான இடத்துக்கு கூட்டிச் செல்லவும். விஷ முறிவு: 1. நோயாளிக்கு உடனடியாக அட்ரோபினைஸ் செய்யவும். 5 முதல் 10 நிமிட இடைவெளி விட்டு 2முதல் 4 மி.கி. அட்ரோபைன்ஸல்பேட்டை நரிம்பு மூலமாக அடுத்தடுத்த டோஸாக முழுமையாக அட்ரோபைனைஸ் செய்து கொண்டே இருக்கவும். ஒரு நாளுக்கு ஏறக்குறைய 25 முதல் 50 மி.கி. அட்ரோபைன் தேவைப் படக் கூடும். சோய் அறிகுறிகள் தொடர்ந்து தென்பட்டால் மேற்கொண்டு ட்ரோபைன் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். டோஸைஸ் அட்டல்ஸ் செய்ய உமிழ்நீர் வழியது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 2. 2-PAM ஆக்ஸிமாக உபயோகிக்க கூடாது.

மருந்து டப்பாக்களை அப்புறப் படுத்துதல்: 1. பேக்கேஜ்கள், உபரி மருந்துகள் மற்றும் கன்டெய்னர்கள் மற்றும் மெஷின்களை கழுவும்போதுவேளியேறும் மிச்சங்களை சுற்றுச்சுழலுக்கோ அல்லது நீர் நிலைகளுக்கோபாதகம் ஏற்படாத விதமாக பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். 2. கா டப்பாக்கள் மீண்டுமாக உபயோகமாவதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு வெளியிட் விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3.கா டப்பாக்களை நசுக்கிஅவற்றை ஆள் நடமாட்டமில்லாத இடத்தில் ஆழமாக குழிதோண்டி புதைத்து விடவேண்டும்.

மருந்தை ஸ்டோர் செய்து வைப்பதற்கான நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிக்கொல் அடங்கியிருக்கும் பேக்கேஜ்களை , இதர பொருட்கள் குறிப்பாக உணவுப்பண்டங்களை ஸ்டோர் செய்து வைக்கும் அறை / இடத்தை விட்டு தூரமாக தனி அறையில் அல்லது இடத்தில் ஸ்டோர் செய்து வைக்கவேண்டும் அல்லது பூச்சிக்கொல்யின் அளவு மற்றும் வீரியத்தைப் பொறுத்து தனி அலமாரியில் பூட்டு போட்டு பூட்டி வைக்க வேண்டும். 2. பூச்சிக் கொல்யை ஸ்டோர் செய்து வைப்பதற்கான இடம் நன்றாக கட்டப் பட்டு, நல்ல வெளிச்சமும் காற்றோட்டமுள்ளதாகவும் மருந்தின் ஆவியை தடுக்கும் விதமாக போதுமான அளவில் கட்டப் பட்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயனக் கலவை:

2 செக்-பியூடைல்பினாயில்-N-மெதைல் கார்பாமேட்-BPMC a.i.

குறைந்தபட்ச தூய்மை - 95%	50.00% w/w
கால்ஷியம் ஆல்கைல் அரைல் ஸல்போனேர் மற்றும் போ எதின் ாதரின் எமல்ஸிஃபையர்களின் கலவை	10.00% w/w
ஸால்வெண்ட் ஆரோமெக்ஸ்	40.00% w/w
மொத்தம்:	100.00% w/w.

ਆਲਟ੍ਰਵੀਂ

ਬੀਪੀਐਮਸੀ (ਫੇਨੋਬਿਯੂਕਾਰਬ)-50% ਈ.ਸੀ. (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਬੀਪੀਐਮਸੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ 50% ਮਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਣਵਰਧਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਟ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼ :

ਫ਼ਸਲਾਂ	ਆਮ ਨਾਮ	ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ (ਗ੍ਰਾਮ/%)	ਏ.ਆਈ ਐਮਐਲ./%)	ਸੁਤਰੀਕਰਣ ਲੀਟਰ	ਹੰਕਣੇਅਰ ਅੰਤਿਮ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਰਮਿਆਨ (ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ
ਧਾਨ	ਹਰੇ ਪੌਤੇ ਦਾ ਫੁਦਕਾ	0.25-0.75	0.5 – 1.5	500	30
	ਭੂਰੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫੁਦਕਾ	0.25 -0.75	0.5 – 1.5	500	30

ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੀਟ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ।

ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਪੀ.ਪੀ. ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ : ਨੈਪਸੇਕ ਵਰਗੇ ਸਪ੍ਰੇ ਹਾਈ ਵੱਲਿਯੂਮ ਫਿੱਟ ਨੋਜ਼ਲ, ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪੈਰ-ਚਲਿਤ ਪੰਪ, ਹੱਥ ਚਲਿਤ ਰੋਕਰ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪ੍ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ : 1. ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 2. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੁੱਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਓ। 3. ਸਪ੍ਰੇ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੋ। ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। 4. ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਕਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ। 5. ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਓ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਉ ਅਤੇ ਨਾ ਚਬਾਉ। 6.. ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੋ।

ਪੱਧਵਿਸ਼ਾਕਤਤਾ/ਵਾਈਟੋਕਸੀਸਿਟੀ : ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ/ਵਾਈਟੋਕਸਿਕ ਨਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿ ਫੀਲਡ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਵਿਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ : ਸਿਰ ਦਰਦ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਸਤੀ ਹੋਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਪੇਚਸ ਲਗਣਾ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਰਾਲਾਂ ਡਿਗਣਾ, ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਕੜਨਾ, ਮਾਂਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਥਮ ਚਿਕਿਤਸਾ : 1..ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲ ਜਾਏ, ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਲਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉ। ਉਲਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਵ ਸਫ਼ੇਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਂ ਕਰੋ। 2. ਜੇਕਰ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਤੁੱਚਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਾਬੁਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੁੱਚਾ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। 3. ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾਰੇ/ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅੱਖਾ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। 4. ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰਮਾਰ : 1. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਦਵਾਈ ਦੇਉ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਉਤੇ ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਸਲਫ਼ੇਟ ਦੀ ਅੰਤਰ- ਨਸੀ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 4 mg ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਐਟ੍ਰੋਪਾਈਨੇਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਦੀ 24 ਤੋਂ 50 mg ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦ