CARBOFURAN 3% C.G.

INSECTICIDE

Introduction:

It is highly active systemic carbamate insecticide/nematocide and miticide with a broad spectrum of biological activity. It is particularly useful for the control of stem borers. Leaf hoppers etc.

Recommendations

Crop	Common Name of Pest	a.i. (gm.%) (Kg.)	Dosage/ Hectare Formulation	Dilution Water (Ltr.)	Waiting Period Between in Last Spray to Harvest (Days)
Bajra	Shoot Fly	1500	50.00	-	-
Barley	Aphid	1000	33.33	-	-
	Jassid	1250	41.65	-	-
Maize	Stem Borer	1000	33.33	-	-
	Shoot Fly	1000	33.33	-	-
	Thrips	1000	33.33	-	-
Paddy	Brown Plant Hopper	750	25.00	-	-
	Gall Midge	750	25.00	-	-
	Green Leaf Hopper	750	25.00	-	-
	Leaf Roller/ Folder	750	25.00	-	-
	Stem Borer	750	25.00	-	-
	Whorl Maggot	750	25.00	-	-
Sorghum	Shoot Fly	1000	33.33	-	-
	Stem Borer	250	8.33	-	-
	Flea Beetle	1500	50.00	-	-
Cotton	Jassid	750	25.00	-	-
	Stem Weaver	1000	33.33	-	-
Groundnut	Pod	1500	50.00	-	-
Pea	Pea Shoot Fly	1000	33.33	-	-
	Pea Aphid	1000	33.33	-	-
Soyabean	Agromyzid Fly	1000	33.33	-	-
	White Fly	1500	50.00	-	-
Bhindi	Jassids	1000	33.33	-	-
Chillies	Aphid	1000	33.33	-	-
	Thrips	1000	33.33	-	-
Potato	Aphid	500	16.55	-	-
	Jassids	1000	33.33	-	-
Sweet Pepper	Thrips	500	16.55	-	-
Tobacco	Green Peach Aphic	1500	50.00	-	-
	Stem Borer	1500	50.00	-	-

Plant Protection Equipment:

This ready made formulation may be applied by broad casting soil by hand operated granule applicator or leaf whorl applicator.

Storage:

1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide.
2. The store room should be well lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient in dimension.

Disposal of Container:

1. Packages or surplus water and washings from the machines and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Precautions by users:

1. Avoid inhalation and skin contact while disposing because of spillages or splashes. Do not mix with bare hands.
2. The user should use full protective clothing which includes rubber gloves, either face should be covered or dust or rubber apron hood or hat.
3. Use in high concentrations with low and ultra low volume application equipment is dangerous and should be avoided.

Limitations for use:

1. Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, livestock, game, wild birds and animals.
2. Minimum interval to be observed between last application and harvesting.

Symptoms of poisoning:

The early symptoms may be combination of Headache, Giddiness, Weakness, Abdominal Pain, Excessive Salivation, Profuse Sweating, Blurred Vision, Vomiting, Diarrhea, Nausea.

First aid measures:

Remove patient to fresh air. Induce vomiting with common salt in warm water. Wash contaminated skin soap and water.

Drug Therapy:

1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinisation doses of 2 to 4 mg at 15 minutes interval for 2 hours together. The need for further continuance of symptoms as much as 25 to 50 mg may be required in a day. The extent of salivation is a useful criterion to follow in adjusting the dosage.

కార్బోఫ్యూరాన్ 3% సి.జి.

కీటకనాశని

పరిచయము: ఇది విస్తృత పరిధిలో పురుగులపై పనిచేస్తూ అతి చురుకైన అంతర్వాహక చర్యగల నులిపురుగుల, తవిట పురుగుల కీటకాల నివారిణి. ఇది కాండంతొలిచే మొగిపురుగులకు, పచ్చదోమలకు ప్రత్యేకంగా నిర్దేశింపబడినది.

సిఫార్సులు:

పంట	పురుగు పేరు	వాడుక మోతాదు/హెక్టారు స.వ. (గ్రా./%)	ఫార్ములేషన్ (కి.గ్రా.)	నీటిపరిమాణం (లీ.)	మందుచల్లిన నాటి నుండి కోత వరకు వ్యవధి (రోజులు)
సజ్జ	మొవ్వచంపు ఈగ	1500	50.00	-	-
బార్లీ	పేనుబంక	1000	33.33	-	-
	పచ్చదోమ	1250	41.65	-	-
మొక్కజొన	మొగిపురుగు	1000	33.33	-	-
	మొవ్వచంపు ఈగ	1000	33.33	-	-
	ఆకుముడత	1000	33.33	-	-
వరి	దోమపోటు	750	25.00	-	-
	ఉల్లికోడు	750	25.00	-	-
	పచ్చదోమ	750	25.00	-	-
	ఆకు చుట్టుపురుగు				
	ఆకు ముడుత	750	25.00	-	-
	అగ్గిపురుగు	750	25.00	-	-
	హోరల మాగట్	750	25.00	-	-
జొన	మొవ్వచంపు ఈగ	1000	33.33	-	-
	మొగి పురుగు	250	8.33	-	-
	పెంకు పురుగు	1500	50.00	-	-
ప్రత్తి	పచ్చదోమ	750	25.00	-	-
	ముక్కుపురుగు	1000	33.33	-	-
వేరుశనగ	కాయతొల్చుపురుగు	1500	50.00	-	-
బఠాణీ	మొవ్వచంపు ఈగ	1000	33.33	-	-
	పేనుబంక	1000	33.33	-	-
సోయాచిక్కుడు	కాయతొల్చుపురుగు	1000	33.33	-	-
	తెల్లదోమ	1500	50.00	-	-
బెండ	పచ్చదోమ	1000	33.33	-	-
మిర్చి	పేనుబంక	1000	33.33	-	-
	వెనుక ముడత	1000	33.33	-	-
అలుగడ్డ	పేనుబంక	500	16.55	-	-
	పచ్చదోమ	1000	33.33	-	-
మిరియాలు	ఆకుముడత	500	16.55	-	-
పొగాకు	పేనుబంక	1500	50.00	-	-
	కాయతొల్చుపురుగు	1500	50.00	-	-

వాడుటకు ఉపయోగించు పరికరాలు:

చల్లటానికి సిద్ధంగా ఉన గుళికలను చేతితో ఉపయోగించే గుళికల అప్లికేటర్‌తోగాని, లీఫ్ హోపర్ అప్లికేటర్‌తో గాని చల్లవచ్చు.

నిల్వ చేయుట:

1. ఈ కీటకనాశని గల ప్యాకేజిలను వేర్వేరు గదులు లేక ఆవరణలతో మిగత పదార్థాలకు, ముఖ్యంగా ఆహారపదార్థాలు నిల్వచేసే ప్రదేశాలలో కాకుండా వేర్వేరు అల్మారాలలో పెట్టి తాళం వేసుకోవాలి.
2. ఈ కీటకనాశని నిల్వచేసే గదులు మంచి కట్టడాలై గాని, వెలుతురు బాగా ప్రసరించేలా తగు విస్తీర్ణంలో ఉండాలి.

ఖాళీ ప్యాకేజిలను పారవేసే విధానం:

1. ప్యాకేజిలను, మిగిలిన మందును, పరికరాలు శుభ్రపరచగా వచ్చు మందు నీటిని పరిసరాలు మరియు త్రాగునీరు కలుషితం కాని రీతిలో విసర్జించుకోవాలి.
2. వాడిన ప్యాకేజిల తిరిగి వాడకాని నిరోధించేందుకు వాటికి బయట పదిలివేయకుండా చూసుకోవాలి.
3. ఖాళీ డబ్బాలను, ప్యాకేజిలను నాశనం చేసి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

మందు చల్లేవారికి ముందు జాగ్రత్తలు:

1. ముక్కుతో మందును పీల్చరాదు. శరీరంపై పడనీయరాదు. వట్టి చేతులతో కలపరాదు.
2. చల్లే వ్యక్తి రక్షక దుస్తులైన రబ్బరు చేతి తొడుగులు, ముఖానికి మాస్కు, గౌను లేక అప్రాను, హుడ్ లేక టోపి వంటివి ధరించాలి.
3. ఈ కీటకనాశనిని అధిక సాంద్రతతో చల్లడం ప్రమాదకరం కాబట్టి అలా వాడరాదు.

వాడకానికున పరిమితులు:

1. తేనెటీగలకు, చేపలకు, పశువులకు, పక్షులకు ఇతర జంతువులకు హాని కలగవచ్చు అనే సందర్భాలలో దానిని వాడరాదు.
2. మందు చల్లడానికి, కోతకు మధ్య తగు మాత్రం వ్యవధి ఉండాలి.

విష ప్రభావ లక్షణాలు:

తలనొప్పి, సిరసం, కడుపునొప్పి, చొంగకారటం, విపరీతంగా చెమటపట్టడం, కళ్ళు బైర్లు కమ్మడం, వాంతులు, విరోచనాలు మొదలైనవి ముందుగా కన్పించే విష ప్రభావ లక్షణాలు.

ప్రథమ చికిత్స:

రోగిని తాజా గాలి పీలే చోటుకు తరలించండి. మందు పడిన శరీర భాగాలను సబ్బునీటితో బాగా కడగండి.

ఔషధ చికిత్స:

1. రోగిని వెంటనే అట్రిపినైజ్ చెయ్యాలి. 2-4 మి.గ్రా. అట్రోపైన్ సల్ఫేటును ప్రతి 5-10 నిముషాల వ్యవధిలో గంటల తరబడి విష ప్రభావ లక్షణాలు పూర్తిగా లేగ్గేవరకూ ఇస్తూ ఉండాలి. అలా రోజుకు 25 నుండి 50 మి.గ్రా. ల అట్రోపిన్ అవసరం కావచ్చు. చొంగకారే తీవ్రతను బట్టి అట్రోపిన్ యొక్క మోతాదును నిరనయించుకోవచ్చు.

कारबोफ्यूरान ३% सी.जी.

कीटनाशक

परिचय: यह बहुत प्रभावशाही अंतरप्रवाही कारबोमेर/कीटनाशक क्रिमीनाशक मकडी मारने वाला व व्यापक जीवणु क्रिया वाला कीटनाशक है। खासकर यह तनाछेदक पत्तियों के टिड्डेकी रोकधाम में बहुत उपययोगी है।

सिफारिसें:

फसल	कीडों के सामान्य नाम	स.त. ग्राम.%	मात्रा प्रति हेक्टर मिश्रण की मात्रा किलो ग्राम	पानी में धोल लीटर में	आखरी छिडकाव व फसल की कटाई के बीच का अंतराल
बाजरा	तने की मक्खी	१५००	५०.००	-	-
जौं	चेंपा	१०००	३३.३३	-	-
	तेला	१२५०	४१.६५	-	-
मक्की	तनाछेदक	१०००	३३.३३	-	-
	तने की मक्खी	१०००	३३.३३	-	-
	त्रिप्स (चुरता)	१०००	३३.३३	-	-
धान	पौधे के भुरे फुदके	७५०	२५.००	-	-
	गाल मिज	७५०	२५.००	-	-
	पतो के हरे फुदके	७५०	२५.००	-	-
	पत्ती मोडक	७५०	२५.००	-	-
	तना छेदक	७५०	२५.००	-	-
	व्हील मेगट	७५०	२५.००	-	-
ज्वार	तने की मक्खी	१०००	३३.३३	-	-
	तनाछेदक	२५०	८.३३	-	-
	पली वीरह	१५००	५०.००	-	-
कपास	तेला	७५०	२५.००	-	-
	स्टैम वीविल	१०००	३३.३३	-	-
मूंगफली	फलीछेदक	१५००	५०.००	-	-
मटर	तने की मक्खी	१०००	३३.३३	-	-
	चेंपा	१०००	३३.३३	-	-
सोयाबीन	एग्रोमाईजिड मक्खी	१०००	३३.३३	-	-
	सफेद मक्खी	१५००	५०.००	-	-
भिण्डी	तेला	१०००	३३.३३	-	-
मिर्च	चेंपा	१०००	३३.३३	-	-
	तेला	१०००	३३.३३	-	-
आलू	चेंपा	५००	१६.५५	-	-
	तेला	१०००	३३.३३	-	-
स्वीट पीपर	चुरवा (त्रिप्स)	५००	१६.५५	-	-
तंबाकु	हरा चेंपा	१५००	५०.००	-	-
	तनाछेदक	१५००	५०.००	-	-

पौध संरक्षण यंत्र:

इसके तैयार मिश्रण को हाथ से चलने वाले ग्रेन्यूल एंप्लीकेटर था लीफ वर्ल एंप्लीकेटर से भूरकाव करना चाहिए।

भंडारण:

१. जिन डिब्बों मे कीटनाशक है उनको अलग कमरे में या कमरों से दूर जगह पर, खासतौर से खाने की वस्तुओं से दूर, बन्द अल्मारी में ताला लगा कर रखे।
२. जिन कमरो में कीटनाशक का भंडरण करना ले वो अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, हवादार व पर्याप्त जगह व रोशनीवाला होना चाहिये।

डिब्बों का निराकरण:

१. डिब्बों में बचा हुआ कीटनाशक, यंत्र व डिब्बों को धोने से निकले हुए पानी का अच्छी तरह निरगकरण करे जिससे वातावरण व पानी में प्रदूषण न फैले।
२. इस्तेमाल किये हुए डिब्बों को वापिस काम में लेने के लिए बाहर नहीं छोडें। डिब्बों को दुबारा इस्तेमाल नहीं करें।

प्रयोगकर्ता के लिए सावधानिया:

१. छिडकाव करते समय कीटनाशक को छलककर, चपडी से लगने तथा सूंघने से बचाना चाहिए।
२. इस्तेमाल करते समय खुद को सुरक्षित कपडे, जिनमें रबड के दस्ताने, मुह को ढक लें या इसकमास्क लगाये और रबर का एपरन कोट और टोपी पहने।
३. उच्च सांद्रता का न्यूनतम या अल्पन्यूनतम यंत्र के साथ उपयोग करना हानिकार है। और जहा तक संभव हो इसे टालना चाहिये।

प्रयोग की सीमायें:

१. ऐसी स्थितियों में प्रयोग न करें जहाँ मधुमक्खिाँ, मछली, जीव जन्तु, जंगली पशु, पक्षियों को हानि पहुँचने की संभावना है।
२. आखरी छिडकाव व कटाई के बीच का अंतराल (दिन) देख लेना चाहिये।

विष चढने के लक्षण:

शुरु के लक्षण में सरदर्द, सुस्ती आना, पेट दर्द, अत्यधिक लार आना पसीना आना, धुंधला दिखना, उल्टी आना, दस्त आना, जुखाम होना इत्यादि।

प्रथमिक उपचार:

रोगी को खुली हवा में ले जायें। नमक का पानी पिलाकर रोगी को उल्टी करवायें। दूषित कपडों को उतार दें तथा दवा से प्रभावित त्वचा को साफ पानी व साबुन से धोयें।

औषधीय उपचार:

१. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दें, तथा प्रत्यक ५-१० मिनट बाद २-४ मि.ग्राम दवा का प्रयोग करते हुए रोगी को पूर्णतया एट्रोपिनाइज रखें। लक्षण जारी रहने की दिशा में दवा का प्रयोग जारी रखें एक दिन में २५-५० मि.ग्राम दवा देनी पड सकती है। लार गिरने की मात्रा से एट्रोपिन दवा की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है।

AGASTYA

AALFURAN 3G

CARBOFURAN 3% C.G.

INSECTICIDE

ఆల్ఫ్యూరాన్ 3జి

కార్బోఫ్యూరాన్ 3% సి.జి.

కీటకనాశని

आलफ्यूरान ३ जी

कारबोफ्यूरान ३% सी.जी.

कीटनाशक

ಆಲ್ಫ್ಯೂರಾನ್ 3ಜಿ

ಕಾರ್ಬೊಫುರಾನ್ 3% ಸಿ.ಜಿ.

ಕೀಟನಾಶಕ

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Marketed by:

M/S Agastya Agro Limited

Plot No: 39 & 40, Chittareddy Colony, Tarbund 'X', Road, Secunderabad, Telangana 500009

An ISO Certified Company

Customer Care Manager No.: 040-64576958

E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Manufactured by: Bhaskar Agro Chemicals Limited, 94/1, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist - 508 252. T.S.

Mfg. Lic. 013/TS-IML/2016 Dt. 23-04-20156

(Old Lic.No. 86/76-78, Dt. 28-09-1978)

Regd. No.: CIR - 25218/97/Carbofuran (CG)-321

कारबोफ्यूरान ३% सी.जी.

कीटनाशक

प्रस्तावनः हे एक अतिशय तीव्र पध्यतशरि कार्बमेट कीटनाशक/नीम्याटो साईड अनी मीटी साईड हया बरोबर गी एत विसीर्ण स्पेक्टरम ची चपक जीवन शास्त्रातील (बायलोजिकल) तीव्रता आहे। झाडांचे कक्षत मध्ये भोंक पाडणारे, पतिडगा ई।

वर ताबा अनन्या साठी विशिष्ट उपयोगी आहे।

पीक	महामारी त	र.ए	डोस हक्टर	पाल्यात	माधील स्प्रे
पीक	सामान्य नाव	जि.एम	फार्मलेशन (कि.ग्रा)	पातत करने (लीटर)	ते पोख कपाणी वी अवधी (दिवस)
बाजरा	सूटफलाई	१५००	५०.००	-	-
जव	अपीड	१०००	३३.३३	-	-
	जरसीड	१२५०	४१.६५	-	-
मक्का	स्टेम बोरर	१०००	३३.३३	-	-
	सूटफलाई	१०००	३३.३३	-	-
	थ्रिप्स	१०००	३३.३३	-	-
चाडी	बाऊनप्लाट होपर	७५०	२५.००	-	-
	गाल मिइअ	७५०	२५.००	-	-
	ग्रीन लिफ होपर	७५०	२५.००	-	-
	लिफ रोलर/फोलडर	७५०	२५.००	-	-
	स्टेम बोरर	७५०	२५.००	-	-
शोरधमसूट	फलाई	१०००	३३.३३	-	-
	स्टेम बोरर	२५०	८.३३	-	-
	पली बोरर	१५००	५०.००	-	-
कापूस	जरसीड	७५०	२५.००	-	-
	स्टेम बोरर	१०००	३३.३३	-	-
शेंगढाने	पोड	१५००	५०.००	-	-
मटर	पी सूठ फलाई	१०००	३३.३३	-	-
	पी अपीड	१०००	३३.३३	-	-
सोयाबीन	एग्रोमाईजिड फलाई	१०००	३३.३३	-	-
	व्हाईट फलाई	१५००	५०.००	-	-
भिंडी	जरसीड	१०००	३३.३३	-	-
मिर्ची	अपीड	१०००	३३.३३	-	-
	थ्रिप्स	१०००	३३.३३	-	-
बटाट	अपीड	५००	१६.५५	-	-
	जरसीड	१०००	३३.३३	-	-
स्वीट पीपर	त्रिप्स	५००	१६.५५	-	-
तंबाकु	ग्रीन पीच	१५००	५०.००	-	-
	अपीड्ड	-	-	-	-
	स्टेम बोरर	१५००	५०.००	-	-

झाडाची सुरक्षा साधन सामुग्रीः

हे तैयार फामेलेशन कवाचीत हाथानी चालवीलेले यंत्र किंवा लिफ वोळ अपलीकेटर द्वारा खता ची मातीत पसरउन लाऊ सकतो।

साठवणोः

१. किटनाशक चे पार्सल वघवशीन वेगल्या खोलीत किंवा जागंयात अन्य पदार्थ साठवणॉ च्या जागा पासून लाम्ब जागेत साठऊन ठेवाणे। नही तर वेगल्या अलमारीत प्रमाणावर अवलंबून कूलूप लाऊन ठेवाणे।

२. वश्तारी ची इमारत चोगलया रीतीने वाधल्याली असावे त्यात चागला प्रकाश असावा, सुळ्या, धंड, खेळली हवा असावें अनी भरपूर रूंद असा असावॉ।

पेठी - पकिटोंची विवियोग व्वस्था

१. पोटी, पाकिट, अनी मशीली चे धुतन्या ले पानी सुरक्षित माने विनियोग करले ज्या च्यांने वातावरण अनो पानी दूषित नाही होणार।

२. वापरल्याले पाकिट किंवा पेटया चा पुनः उपयोग कर प्रतिबंध करणें।

३. पाकिटाचा नाश करून। निवास स्थाना पासून लांव जमीनी पूरवीनें।

वाफरणारान चे आगऊ तजवीजः

१. विनियोग करतानी श्वास अंत घेण्याचे अनी कातडी ला लागन्याचे टाळणॉ। उघडया हाथानी मिश्रण करू नयें।

२. वापरणारानें पूर्ण सूरक्षित कपडया चा उपयोग करावें ज्याच्या समातेशनात रबर चे हितमोजे, मुखवटा, रबर चे ऐपरान किंवा टोपी आसावें।

३. याचा अति तीव्र मात्र चा वापर कमी मात्रा चे उपयोग उपकरण बरोबर घोक्य चे आहे।

वापराय ची मर्यादाः

१. धाचा उपयोग असल्या परिस्थीत न करणें जीथे भुंगा, भ्रमर, मासे, पशू सयुदाय, खेल वन पक्षी अनी जननलरांन करन्याची शक्यता आहे।

२. कमीत कमी आवधी चा पाळण, माधील वापरणे अनी पीक कापणी मध्ये करणे।

विष चे लक्षणः

अगोदर चे लक्षण कदाचीत डोके दुःखी, चक्कर थेजे, अशक्तता, पोट दुःखी, अधीक मात्रा ने थुकी भेणॅ विपुल धाम, अस्पष्ट नजर, ओकणॉ, जुल्व, जीव कःमळ होण, याचा मेकीकरण हाऊ सकतो।

प्रथम चिकत्सा उपायः

रोगी ला ताज्या हवेत येऊन यावे, मीटा च्या गरम पान्या नी वांती थडबून आणणॅ। दूषित चमडी ला सावन अनी पान्यो ने धूने।

औषधोपचारः

१. रोगीला ताबडतोप अट्रोपीन देने अनी पुर्ज अट्रोपीन ते डोस २-४ ची. ग्राम. २५ मिनट च्या अंतरावर, ढोन तास परेंन चालवणे, चिन्ह पुटील टिकणोयास २५ ते ५० मि. ग्रा. ची अवश्यकता ढिट्स ला पडेल। ळाळ चा आकार अट्रोपीन च्या डोस चा अनुमान काडण्यामात एक उपयोगी ठरावीक आहे।

ಕಾರ್ಬೊಫುರಾನ್ 3% ಸಿ.ಜಿ.

ಕೀಟನಾಶಕ

ಕಾರ್ಬೊಫುರಾನ್ 3% ಜಿ (ಕೀಟನಾಶಕ) ಪರಿಚಯಗಳು: ಇದು ಪೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪೊಂದಿದ ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಕಾರ್ಬಮೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಯಾಗೂ ಸುರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಳಿಗೆತೆಗುಲುವ ಕಾಂಡತೊರೆಯುವವುಳು, ದಸಿರ ಜಿಗಿ ಮುಂತಾದ ಕಿಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆತ

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳು	ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮ ಗ್ರಾಂ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊನೆದು ವಾಯುಲೇ ನೀರಿನ ತನ (ಕೆ.ಜಿ)	ಸಿಂಪರಿಣಿ ಮತ್ತುಕೊಯುನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲಿ)	ದಿನಗಳು
ಅಂತರ					
ನಜ್ಜ	ಕಾಂಡಕೊರಕ	1500	20.00	–	–
ಬಾರ್ಲಿ	ಜಿಗಿ	1000	33.33	–	–
	ಗಿಡಹೇನು	1250	41.65	–	–
ಮಕ್ಕೆಜೋಳ	ಕಾಂಕೊರಕ	1000	33.33	–	–
	ಟ್ರಪ್	1000	33.33	–	–
ಬತ್ತ	ಕುದು ಜಿಗಿಪುಳು	750	25.00	–	–
	ಗಾಲ್‌ಮಿಡ್ಡು	750	25.00	–	–
	ಹೆಸರು ಜಿಗಿ	750	25.00	–	–
	ಎಲೆ ಸುರಳಿ ಹುಳು	750	25.00	–	–
	ಕಾಂಡಕೊರೆಯುವ	750	25.00	–	–
ಜೊಳ	ಕಾಂಡಕೊರೆ ಯುವನೊಣ	1000	33.33	–	–
	ಕಾಂಕೊರಕ	250	8.33	–	–
	ಫ್ಲಿಬೀಟಲ್	1500	50.00	–	–
ಹತ್ತಿ	ಜಿಗಿ	750	25.00	–	–
	ಕಾಂಡಕೊರೆಯು ವತಗಣೆ	1000	33.33	–	–
ತೀಂಗಾ	ಕಾಯಿಕೊರಕ	1500	50.00	–	–
ಬಟಾಣಿ	ಬಟಾಣಿ	1000	33.33	–	–
	ಕಾಂಡಕೊರುವತಗಣ				
	ಗಿಡಹೇನು	1000	33.33	–	–
ಸೊಯಾ ಬೀನ್	ಆಗ್ರೊಮಿಡ್ ನೊಣ	1000	33.33	–	–
	ಬಿಳಿನೊಣ	1000	33.33	–	–
ಬೆಂಡಿ	ಜಿಗಿ	1000	33.33	–	–
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ					
	ಗಿಡಹೇನು	1000	33.33	–	–
	ಥ್ರಿಪ್ಸ್	1000	33.33	–	–
ಆಲೇಗಡ್ಡೆ	ಗಿಡಹೇನು	500	16.55	–	–
	ಜಿಗಿ	1000	33.33	–	–
ಗೆಣಸು	ಥ್ರಿಪ್ಸ್	500	16.55	–	–
ತಂಬಾಕು	ಹಸಿರುಗಿಡಹೇನು	1500	50.00	–	–
	ಕಾಂಡ ಕೊರಕ	1500	50.00	–	–

ಸಸ್ಯಸರಕ್ಷಣ ಉಪಕರಣಗಳು:

ಈ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೈಬಾತಿಲ ರುಳು ಆಫ್ಲರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಲೀಫ ವರ್ಲ ಲಿಫ್ಲಿತೇಟರ್ ಮೂಲಕ ವಾಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಗಿ ಚಲ್ಲಬೇಕು ಶೇಖರಣೆ:

1. ಕೀಟನಾಶವನ್ನು ಪೊಂದಿದ ಕಂಟೀನರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿರಣಬೇಕು ಅಥವ ತಿಂದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೊಂದಿದ ಕೊಣೆಯಂದ ದೂರ ವಿಡಬೇಕು.

2. ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊರಡಿಯ ಬನ್ನಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಟಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತುತಂಟು ವಾಗೂ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಿಸಬೇಕು.

ಕಂಟೀನರ್‌ಗಳ ವಿರ್ಜನೆ:

1. ಖಾಳಿ ಕಂಟೀನರ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕಪೊಂದಿದ ಮೆಶನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗು ಅಥವಾ ವಿನರ್ಜಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಜಲ ಕಲ್ಷಷನಾಗದಂತೆ ವಿನರ್ಜಿಸಬೇಕು.

2. ಕಂಟೀನರ್‌ಗಳನ್ನು ಮರು ಉಪಯೋಗಗೈ ಬಾರದಂತೆ ದಾಗೆಯೋ ಬಿಡಬಾರದು. ತ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶವ್? ಮಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಪೂಳಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:

1. ವಿನರ್ಜಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾದಬಾರದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕೈ ತಾಗದಂತೆ ನೊಡಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು.

2. ಉಪಯೋಗಿ ಸುವವರು ರಕ್ಷಕವಚವನ್ನು ಕರಿಸಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೈಗ್ಲೊಸ್ ಪಾಸಕೊಡಿರಬೇಕು.

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿಯಮಿತಗಳು:

1. ಬೇಸು ಮೀನು ಹಾದೂ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗು ಸಂದರ್ಬವಿದ್ಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಸಬಾರದು.

2. ಕೊನೆಯಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತುಕೊಯ್ಲೆನ ನಡಿವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ವಾಯಸ್ಥಿಬೇಕು.

ವಿಷಕ್ಕದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಪ್ರಾರಂಭಿವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇಂದರೆ, ಕತೆನೊದು, ತಲೆಸುತ್ತವಿತೆ, ಸುಸ್ತುಳು, ರೊಚ್ಚಿನೋದು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲುಕಾರಿಸುವಿತಕೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವಿಕೆ ಮಬ್ಬುಕವಿಯುವುದು, ವಾರಿತಿ, ಬೇಸ ಮತ್ತು ಮಾಗು ಸೋರುವಿಕೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಳು:

ತಕ್ಷಣ ರೋಗಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳಿಯ ಗಾಳಿ ವಾತವರಣಕ್ಕಿ ಕರೆತರುವುದು. ಬಿಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತನ್ನು ಬೆರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಕೊಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಿಸಬೇಕು. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನೀರು ನೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ:

ರೋಗಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೊಪಿನ್‌ನ್ನು ಕೊಂಡಬೇಕು ಇದನ್ನು 4 ಮಿ.ಗ್ರಾಳು. ಪ್ರತಿ 15 ಮಿಮಿಷಕ್ಕೂವ್ವಿಳು. ಗಂಟಿಗಟ್ಟಿಲೆ ಕೊರುತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿವಸಕ್ಕೆ 25-50 ಮಿ.ಗ್ರಾಳು. ಬೇಕಾಗಬದ್ರದು. ಜೊಲ್ಲುಸುರಿಕುವಿಕೆಯ ಗತಿಗನುಗಾರವಾಗಿ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ವನ್ನು ಪಂಯಾಗಿ ಕೊಟಬೇಗು.

कार्बोफ्यूरान 3% सी.जी.

(पूच्सिकोल्ली)

मुर्लणुरा:- इथु ऒरु एल्लॊ वकैयान् पूच्सिकळैयुम् कॊल्लुम् पूच्सिक् कॊल्लियागुम्. इथु कुरिप्पाक तण्डु तुरैप्पानैयुम्. वॆट्टुक् किळिकळैयुम् मुडियन्तै कट्टुप्पडुत्तुकिऱतु.

पयिर्	पूच्सिकळिन् पॆयर्कळ्	मरुत्तिन् अळवु लप्-पॊरुळ् (कि.ग्रा)	ऒरु हॆक्टर् मरुन्तिन् अळवु	टॆरुक्कु नीर् (मि.लि.)	काल (निरल्) अवकाशम् (लिट्टर्)
पऱ्रा	कूट्पूच्सि	1500	50.00	-	-
पार्लि	कूःपिट्	1000	33.33	-	-
	ज्लेल्पिट्	1250	41.65	-	-
सोलम्	तण्डु तुरैप्पान	1000	33.33	-	-
	कूट् पूच्सि	1000	33.33	-	-
	तिरिप्स्	1000	33.33	-	-
नॆल्	पऴप्पु मापूच्सि	750	25.00	-	-
	कार्ल मिट्ज्ज्	750	25.00	-	-
	वॆट्टुक्किळि	750	25.00	-	-
	इलै अरुट्कु	750	25.00	-	-
	तण्डु तुळैप्पान्	750	25.00	-	-
कॆऴ्पाकु	कूट्पूच्सि	1000	33.33	-	-
	तण्डु तूळैप्पान्	250	8.33	-	-
	पिनै वण्डु	1500	50.00	-	-
परुत्ति	ज्लेलिट्	750	25.00	-	-
	नॆस्वुप्पूच्सि	1000	33.33	-	-
रलच्टवै	पाटु	1500	50.00	-	-
	कूट् पूच्सि	1000	33.33	-	-
	कूःपिट्	1000	33.33	-	-
सोयाआक्रॆमिबिट्	पूच्सि	1000	33.33	-	-
	वॆळ्ळै पूच्सि	1500	50.00	-	-
वॆण्डै ज्लेलिट्		1000	33.33	-	-
मिकैरय्	कूःपिट्	1000	33.33	-	-
	तिरिप्स्	1000	33.33	-	-
उरुळै चरःपिट्		500	16.55	-	-
	नॆस्ट्	1000	33.33	-	-
स्लिट्पॆप्र् तिरिप्स्		500	16.55	-	-
पूपिलै	पच्चैप्पूपु	1500	50.00	-	-
	तण्डुतुळैप्पिळै	1500	50.00	-	-

तावा पाधुक्कापर् करुविकळ्:

इन्द तयार् कलवैयै कै मूलम् इयक्कुम् इयन्तिरम् अल्लतु लिःप् वार्ल् इयन्तिरम् मूलम् तॆऱिक्कलाम्.

सॊपित्तु वैक्कुम् मूऱै:

1. इप्पूच्सिक्कॊल्लि मुट्टैकळै तनियनैतळिलुम् अल्लतु अतैतळिल् मुन्पुकुतिकळुलुम् अल्लतु तनि अटुत्तळिलुम् सॆमित्तु वैक्कलाम्.

2. पाधुकक्कुम् अतै नन्कु कट्टप्पिट्टु, सरप्पुतुम् इन्ऱु, कुऱिराक, काऱ्ऱुनोट्टमाक मऱ्ऱुम् तॆवैयान् इटत्तैयुम् कॊण्डिरुत्तल् वॆण्डुम्.

कलन्कळै अऴिक्कुम् मुऱै:

1. वयॆयुकप्पडुत्तिय मूट्टैकळ् अल्लतु कूपपॊयप्पडुत्तिय नीर् मऱ्ऱुम् उपयॊकप्पडुत्तय पॊरुट्कळ् आकियवऱ्ऱै पाधुप्पनै मुऱैकळिल् अऴिक्कप्पड वॆण्डुम्.

2. पयॊकप्पडुत्तिय मूट्टैकळ् तनियाक वैप्पतिन् मूलम् मऱुमुऱै उपयॊकिप्पतै तविरिक्कलाम्.

3. पयॊकप्पडुत्तिय मूट्टैकळै उटैत्तु. वाऴ् इटम् इल्लणलुमाक इटङ्कळिल् पुतैक्क वॆण्डुम्.

कवनिक्क वॆण्डियवै:

1. वॆऱुम् कैकळै उपयॊकिप्पतै तविर्क्कवुम्. सुवात्तिल् कलप्पतैयुम्, तॊलिल् पडुवतैयुम् तविर्क्कवुम्.

2. पाधुकाप्पु उटैकळान् तॊलिनाल्, आन् तैयुनैकळ्, मूकमूपुकळ् अणिकवुम्.

अतिक चॆलिवुळ्ळ पूच्सिक्कॊल्लिकळै कुऱैन्त तण्णीरिल् कलप्पतै तविर्क्कवुम्.

पयन्पाट्टु वऱ्ऱ मुऱैकळ्:

1. कार्ल्न्टैकळ्, पऱवैकळ् मऱ्ऱुम् वलङ्कुकळ् मटयुम् इटङ्कळिल् उपयॊकिक्कतै तविर्क्कवुम्.

2. अऱुवटैक्कुम् पूच्सिक्कॊल्लि उपयॊकिप्पुक्कुम् चिलनाट्कळ् इऱत्तुमाऱु पार्त्तुक्कॊळ्ळवुम्.

अऱिकुऱिकळ्:

तलैवलि, नटुक्कम्, तळर्च्चि, वयिऱ्ऱु वलि, अतिकप्पटियान एच्चिल् चुरल्लि, मङ्कलान पार्वै, वान्ति, वयिऱ्ऱुम् पॊक्कु.

मुतलुवलि:

उप्पुक् कतैचलैक्कॊण्डु वान्ति एटुक्कच् चॆय्यम्. काऱ्ऱोट्टमान इटत्तिल् पडुत्तच् चॆय्यवुम्. मरुन्तु पट्ट इटत्तैयै सॊप्पु मऱ्ऱुम् तण्णीर् पॊट्टु कऴुवुम्.

चिकिच्चै:

उटन्टियाक अट्रॊपीन् मरुन्तिनै 2 मुतल् 4 एम्.जी. वारै 15 निमिट इटै वॆळियिल् 2 मणिनॊङ्कळुक्कु कॊटुक्क वॆण्डुम्. अऱिकुऱिकळ् नीट्टिप्पान् 25 मुतल् 50 एम्.जी. वरै ऒरु नाळुक्कु मरुन्तिनै अऱिक्क वॆण्डुम्. उमिऴिनीर् चरप्पु अळविनै पॊरुत्तु कॊटुक्कुम् मरुन्तिनै कणिक्कवुम्.

AGASTYA

AALFURAN 3G

CARBOFURAN 3% C.G.

INSECTICIDE

ಆಲ್‌ಫ್ಯೂರಾನ್ 3ಜಿ

ಕಾರ್ಬೊಫ್ಯೂರಾನ್ 3% ಸಿ.ಜಿ.

ಕೀಟನಾಶಕ

आलफ्यूरान ३ जी

कारबोफ्यूरान ३% सी.जी.

कीटनाशक

ಆಲ್‌ಫ್ಯೂರಾನ್ 3ಜಿ

ಕಾರ್ಬೊಫುರಾನ್ 3% ಸಿ.ಜಿ.

ಕೀಟನಾಶಕ

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

ಪಿಲ್ಲಲಕು ದೂರಮುಗಾ ಉಂಚಂಡಿ.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగీ సిగదంతే దూరవిడి.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ಉಪಯೋಗಿಂಚುಟಕು ಮುಂದು ಲೆಬಿಲ್‌ನು ಮರಿಯು ಕರಪತ್ರಮುನು ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ಚದುವವಲಯುನು.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Marketed by:

M/S Agastya Agro Limited

Plot No: 39 & 40, Chittareddy Colony, Tarbund 'X', Road Secunderabad, Telangana 500009

An ISO Certified Company

Customer Care Manager No.: 040-64576958

E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Manufactured by: Bhaskar Agro Chemicals Limited, 94/1, Toopranpet (V), Choutuppal (M), Yadadri-Bhuvanagiri Dist - 508 252. T.S.

Mfg. Lic. 013/TS-IML/2016 Dt. 23-04-20156
(Old Lic.No. 86/76-78, Dt. 28-09-1978)

Regd. No.: CIR - 25218/97/Carbofuran (CG)-321