POW

Phenthoate 50% EC w/wv
(Insecticide)

A contact and stomach action emulsifiable concentrate formulation based on Phen-thoate Technical.

Dosage Recommendations :

Crop(s) in	Common Name of Pest water spray to	Dosage/HA (g)	Formu Al (m)	Dilution in lation (Litre)	Waiting Period between last Water harvest (Day)
Cereals:					
Paddy	Rice Case worm	500	1000	500-1000	-
Pulses:					
Blackgram	Bihar hairy Caterpillar	400	800	500-1000	-
Gram	Pod borer	1000	2000	500-1000	-
Green gram	Bihar hairy Caterpiller	400	800	500-1000	-
	Pod borer	1000	2000	500-1000	-
Cotton	American bollworm bollworm	1000	2000	500-1000	-
	Spottedbollworm	1000	2000	500-1000	-
	Pink bollworm	1000	2000	500-1000	-
Oil Seeds:					
Groundnut	Leaf Webber	500	1000	500-1000	-
Miscellaneous:					
Cardamom	Thrips	250	500	500-1000	-

Plant Protection Equipment: Knapsack Sprayer, foot Sprayer, compression battery operated knapsack sprayer, ASPEE-HTP power sprayer.

Symptoms of poisoning: The early symptoms may be combination headache, giddiness, nausea, vomiting excessive sweating, lachrymation, salivation, blurred vision etc.

First Aid : If swallowed a gastric lavage with warm water may be given. If skin is contaminated, wash with soap and plenty of water. If eyes are contaminated flush with clean water.

Antidote : Atropinise the patient immediately and maintain full atropinisation by repeated doses of 2-4 mg. at 5-10 mins. interval. Administer 1-2gms of 2 pyridin-2-aldoxine-n-methyl-iodine (2PAM) to be dissolved in 10cc of distilled water and to injected intravenously for 10-15 mins.

Limitations & Cautions for use: 1. Do not use in those situations if there is a possibility of harming bees, fish, livestock, game wild birds and animals. 2. Minimum interval to be observed between last application and harvesting crops treated with liquid, wettable powder or granular formulation 2 weeks. 3. Access of animals and poultry to be treated area-1 week.

Storage: 1. The packages containing the insecticide should be stored in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles, or should be kept in seperate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of insecticides. 2. The room or premises meant for storing the insecticides should be well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Disposal of containers : 1. The packages should be broken and buried away from habitation. 2. The used packages should not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material and washings should be disposed of in the same manner so as to prevent environment or water pollution.

Precautions : 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashses. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing which includes rubber gloves, boots, either face shielf or dust mask and an overall or rubber appron hoods or hats.

Chemical Composition :

Phenthoate Tech (based on 90% w/w purity)	55.75 %w/w
Epichlorhydrin	1.00% w/w
Emulsifier (Alkylaryl sulfonate/polyoxy ethylene ether)	5.00% w/w
Aromax	38.25% w/w
Total	100.00% w/w

Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

पौ

फेन्थोएट ५०% इ.सी.
(कीटनाशक)

फेन्थोएट टेक्नीकल से वनाई गई तैलीय द्रवा है जि स्पर्श करने तथा निगले आने पर असर करती है।

उपयोग के लिए मात्राएँ: (दवा का आपेक्षिकधनत्व १.० लगभग) (कीटों के हथले के समय पर्णित्न फुहार)

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काय तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
खाद्यान्न:					
धान	धान की वंद इल्ली	५००	१०००	५००-१०००	-
दलहन:					
उड़द	विहारी वालवाली इल्ली	४००	८००	५००-१०००	-
चना	फली-ईदक	१०००	२०००	५००-१०००	-
मुंग	विहारी वालावाली इल्ली	४००	८००	५००-१०००	-
	फली-छेदक	१०००	२०००	५००-१०००	-
रेरोवाली फसले:					
कपास	अमेरिकन डोडे की सुंडी	१०००	२०००	५००-१०००	
	चितीदार सुंडियां	१०००	२०००	५००-१०००	
	गुतादी सुंडियां	१०००	२०००	५००-१०००	
तिलहन:					
गूंगफली	पत्ती का जालाबनाने वाला कीट	५००	१०००	५००-१०००	
अन्य फसो:					
इलायची	चुरदा	२५०	५००	५००-१०००	

उपयोग में आने वाला यन्त्रः नेपसेक स्प्रेयर, फूट-स्प्रयर, काम्प्रेशन स्प्रेयर, वैटरी-स्प्रेयर और ए.एस.पी.ई.ई.- एच.टी.पी. पावन स्प्रेयर.

जहर चढ़ने के लक्षणः आरम्भिक लक्षणों में सिरदर्द, चक्कर आना, मिदली, उल्टी आना, आँखों का धुधलापन, पसीना आना, लार टपकना और आँखों से अधिक आँसू आना, आदि.

प्रथम चिकित्साः यदि निकल जाये तो मारम पानी से मेस्ट्रिक लेवेज दे सकते है उसके बाद एक्टिकेटेड चार्कोल २ भाग के साथ १ भाग मैग्नीषियम ऑक्सीड़ और टैत्रिक एसिड़ १ भाग को ३०० मि.ली. की गरम पानी में मिलाकर दे सकते है । यदि चर्म दूषित हो गया तो साबुन और अधिक पानी से धोएं.। यदि आँखे दूषित हो गये तो साफ पानी से धोएं।

उपयोग केलिए सीमाएं तथा सावधानियाः १. मधु माक्रियवयो, मछलियों, पशुओ, पालतू-जानवरों के नुकशान डो ने की आशंक हो तो दवा का उपयोग न करें। २. आखिरी छिड़काव तथा फसल कारने के कम से कम-२ सप्ताह का अन्तर रखना चाहिए। आखिरी छिड़काव के बाद पशुओ तथा मुर्गियों के प्रवेश के लिए कम से कम- १ सप्ताह का अन्तर रखना चाहिए।

विषनाषकः रोगी को तुरन्त संपूर्ण स्ट्रोपिनेज़ दीजिए और ५ से १० मिनट के अन्तराल पर लगातार एट्रोपिन सल्फेट का २ से ४ मि.ग्रा. देते रहे । १-२ ग्रा.२ पाइरीहीन का २ एलड़ोक्जैन एन-नियाइल आयोडिन २ पी.ए.एस. द्वारा धीरे ५ से १० मिनट में दे।

संग्रहण : १. कीटनाशक डिब्बों को अतल कमरे में या अलय परिसर में अन्य पदार्थ खासकर खाद्या पदार्थ रखने की कमरे से दूर में सुरक्षित रुप से अलग रखना चाहिए। कीटनाशक की परिमाण और प्रकार के अनुसर उसको अलमारी में रखकर ताला लगाकर बन्द रखे। २ कीटनाशक को भंडारण करनेवाले कमरथे या परिसर पर्याप्त आयाम में अच्छी तरह निर्मीत सूखा, हवादार एवम् प्रकाशमय होना चाहिए ताकि भाष प्रदषण होने का भय न हो।

खाली डिब्बों को निपटनाः १. डिब्बों को गोडकर निवास स्थान से दूर ज़मीन के अन्दर गाड दें। २. उपयोग की गई डिब्बों को दुबारठा उपयोग करनेके लिए बाहर मत छोडें। ३. खाली डिब्बों या अधिशेष सामान और मशीन से निकली गई यंदगी को सुरक्षित रुप से निपटित करके वातावरण और पानी के प्रदषण को रोकना चाहिए।

उपोग के लिए सावधानियाः १. दवा को सुंधे नही और इसे नंगो हथों न मिलायें धोल वनाटे समय दवा के डाटें आखों में न पड़ना । २. उपयो कर्ता को उपयो के दौरान बचाव के पूरे कपड़े पहनने चाहिए जिनमें, रबर के दस्ताने, बूट, चश्मा, मुंह टकने की ढाल , गैस भाटक परे शरीर को ढ़कने वाल लम्बा कोट, अेप्रान और कटोप वगैरह शामिल है।

रासायनिक संरचना :

फेन्थोस्ट निथाइल (९४% शुद्धता के आधार पर)	५५.७५% भार/भार
सोल्वेन्ट एरोमेक्स	५.०० % भार/भा
स्टेबिलेजकः एपिकरोहेड़िन	१.००% भार/भार
अरोमेक्स	३८.२५% भार/भार
योगः	१००.००% भार/भार

लेबल-लीफलेट में निर्दिष्ट में किये गये फसलों के अलवा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

పౌ

ఫెంథోయేట్ 50% ఈసి దబ్ల్యు/దబ్ల్యు
(కీటకనాశని)

ఫెందాల్50 ఈసి. అనే కీటకనాశని ఫెంథోయేట్ మూల పదార్థముగా ఇతర రసాయనాలు సమపాళ్ళలో కలిగి ఉన్న శక్తివంతమైన కీటకనాశిని. ఇది వివిధ పంటలను ఆశించే అనేక రకముల కీటకాలను సమర్థవంతముగా అరికట్టును.

వాడకపు సిఫారసులు:

పైర్లు	తెగులు సాధారణ నామము	మోతాదు/హెక్టారుకి స.వ. (%)	మందు ద్రావణం (%)	నీటి పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారి నుండి పైరు, కోత మధ్య విరామ సమయము (రోజులలో)
వరి	వరికేసు పురుగు	500	1000	500-1000	-
ప్రత్తి	అమెరికన్ కాయతొలుచు పురుగు	1000	2000	500-1000	-
	చుక్కల తొలిచే పురుగు	1000	2000	500-1000	-
	గులాబి తొలిచే పురుగు	1000	2000	500-1000	-
వేరుశనగ	ఆకువెబ్బర్	500	1000	500-1000	-
మినుము	బహార్ బొచ్చు గొంగళిపురుగు	400	800	500-1000	-
పప్పుదినుసులు	కాయతొలుచు పురుగు	1000	2000	500-000	-
పెసర	బహార్ బొచ్చు గొంగళిపురుగు	400	800	500-1000	-
	కాయతొలుచు పురుగు	1000	2000	500-1000	-
ఎలకులు	తామర పురుగు	250	500	500-1000	-

సస్యరక్షణ పరికరాలు : నాప్‌సాక్ స్ప్రేయరు, ఫుట్ స్ప్రేయరు, కంప్రేషన్‌నేస్ సేక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ సేన్ సేక్ బ్యాటర్‌ఈ స్ప్రేయరు, మరియు అప్పి-హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేయర్ మొదలైనవి.

విషలక్షణములు : తలనొప్పి, తలతిరగటం, వాంతి వచ్చేలాందుదటం, చూపు మందగించుట, అధిక చెమట, కంటి నుండి నీరు కారదం, మరియు అధిక లాలాజం కారటం మొదలైనవి ప్రారంభ స్థితిలో కనబడే రోగ గుర్తులు.

ప్రథమచికిత్స : మందును నోటిలోనికి ప్రింగినట్లయితే గోరువెచ్చని నీటితో గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ చేయవలెను. తరువాత ఏక్టివేటెడ్ చార్‌కోల్ రెండు భాగములు మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఒక భాగము మరియు టేనిక్ ఆసిడ్ ఒక భాగమును 300 మి.లీ. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి రోగికి త్రాగించవలెను. శరీరముపై పడిన మిశ్రమమును సబ్బుతోను మరియు ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపరచవలెను. కళ్ళలో పడినట్లయితే శుభ్రమైన నీటితో కళ్ళను 15 నిమిషాల పాటు కడుగవలెను. వైద్యుని సంప్రదించవలెను.

విరుగుడు :- రోగిని వెంటనే ఆట్రోఫిక్షన్ చేయవలెను. ఆట్రోఫికేషన్ గుర్తింపు కనబడే వరకు ప్రతి 5-10 నిమిషములకు 2-4 మి.గ్రా. ఆట్రోపైన్ సల్ఫేట్ మందును గంటల తరబడి రోగి ఒంటిలో ఎక్కించవలెను. రోగికి కనిపించే రోగ లక్షణాలను బట్టిఆట్రోపైన్ మందును ఇవ్వాలి. ఒక రోజుకి 25-50 మి.గ్రా. కొలత మందే అవసరమవుతుంది. ఆట్రోఫిన్ చికిత్సను కొనసాగించుటకు మనకు ఉపయోగపడే గుర్తింపు రోగి నోటినుండి కారే లాలాజలము మాత్రమే 2-పిఎఎమ్ మాత్రం ఉపయోగించకూడదు.

నిలవ చేయు పద్ధతి : రసాయన పదార్థాలను నిల్వ ఉంచే గదులు ఆహార పదార్థాలకు, పశువులకు, నివాసాలకు దూరంగా ఉండాలి. క్రిమిసంహారక మందులు పెట్టెలు పరిమాణాన్ని అనుసరించి బీరువాలు లేక అల్మారాలలో ఉంచి పిల్లలకు అందకుండ తాళం వేయాలి. గదులు దృఢంగా, విశాలంగా, తగినంత గాలి, వెలుతురు వచ్చేటట్లుగా ఉండవలెను.

ఉపయోగించిన ఖాళీ పెట్టెలను బయటవేసే పద్ధతి : ఉపయోగింపబడిన ఖాళీ పెట్టెలు మిగిలిన వస్తువులు మరియు పనికిరాని పదార్థములను జాగ్రత్తగా వాతావరణం మరియు నీటి కలుషితము కాకుండా ఉత్పత్తిదారులు బయటపడవేసే బాధ్యత వహించాలి. ఈ ఖాళీపెట్టెలు, ప్యాకెట్లు తిరిగి ఉపయోగింపబడునట్లుగా బయటపడవేయరాదు. ఈ ఖాళీపెట్టెలను మరియు ప్యాకెట్లను పూర్తిగా ముక్కలుగా చేసి నివాస ప్రాంతములకు దూరముగా వీలైనంత లోతుగా భూమిలో పాతి పెట్టవలెను.

ఉపయోగించేవారికి హెచ్చరికలు : 1. తినుబండారాలకు, తిను సామాగ్రులు ఖాళీ పాత్రలు మరియు పశువుకు, పశువుల మేతకు దూరంగా ఉంచండి. 2. ముఖం, శరీరం మరియు కళ్ళకు తాకకుండా జాగ్రత్తపడండి. 3. పిచికారి భాష్పాన్ని శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్ళనివ్వకుండా చూసుకోండి. గాలి దిశను బట్టి పిచికారి చేయండి. 4. పిచికారి తర్వాత దూషిత బట్టలను, శరీర అంగాలను బాగా కదుక్కోండి. 5. పిచికారి చేయు సమయంలో ధూమ్రపానం, తినడం, త్రాగడం ఏదైనా నమలటం చేయరాదు. 6. పిచికారి చేయునపుడు, కలిపే సమయంలో పూర్తి సురక్షాకవచాలను వాడండి.

రసాయన మిశ్రమము :

ఫెంథోయేట్ టెక్ని (90% స్వచ్ఛతపై ఆధారంగా)	55.75% భా/భా
ఎమల్సిఫైర్ (ఆల్కైల్ బీరిస్ సల్ఫోనేట్/పాలీఆక్సీ ఎథిలీన్ ఈథర్)	5.00% భా/భా
స్టెబిలైజర్ : ఎపికోరోహైడ్రిన్)	1.00% భా/భా
సార్మాంట్ ఎరోమెక్స్	38.25% భా/భా
మొత్తము:	100:00%భా/భా

కరపత్రం/లేబుల్‌పై ఇవ్వబడిన వాటికి మినహా ఇతర పంటలకు ఉపయోగించకూడదు.

AGASTYA
POW
Phenthoate 50% EC w/wv
(Insecticide)

पौ

फेंथोयेट 50% ईसी
(कीटकनाशनी)

पौ

फेन्थोएट ५%० इ.सी.
(कीटनाशक)

ಪೌ

ಫೆಂಥೋಯೇಟ್ 50 ಇ.ಸಿ.
(ಕೀಟಕನಾಶನಿ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

విష
ज़हर
విషము
POISON

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured by :
AGASTYA AGRO LIMITED
UNIT-I : Suvery No. 47, Murahari Pally -501 401
Medchal Dist.,Telangana State.
Mfg No: 027/TS-IML/2017 (Old Lic. no:220/1997-98, Dt.06-07-1997)

UNIT-II : H.N.: 2-05, Sy. No. 94/1 & 95,
Toopranpet (V), Choutuppal (M),
Yadadri-Bhuvanagiri Dist. 508 252, T.S.
Mfg. Lic. No. : 022/TS-IML/2016

An ISO Certified Company
Customer Care Manager No.: 040-64576958
E-mail: agastyaagro@yahoo.com

Reg.No. CIR No. 131844/2016-PHENTHOATE(EC)(354)-60

पौ

फेन्थोएट ५०% ई.सी.
(कीटनाशक)

हे एक आंतरप्रवाही बुरशीनाशक असून हात फेन्थोएट ५०% ईसी ५०% सक्रीय तत्व आणि इतर सहयोगी पदार्थ आहेत. पिकाच्या नगांवर त्याचे प्रतिबंधक तसेच निवारच परिणा महोतात.

उपयोग :

पीक	किडीचे सामान्य नाव	दर हेक्टरी प्रमाण प्रतिघटक (ग्राम)	कार्मुलेशन (मि.ली)	प्राणायासील मिश्रण (ली)	अखोरच्या फवारणीनंतर सर्व क्रियाशील (दिवसांनी)
भात	भातावरील कपात अळी	५००	१०००	५००-१०००	-
भूईमुग	पानावरील कोळिष्टक	५००	१०००	५००-१०००	-

फवाराणिचे उपकरणो: नॉषासॉक घंघ, फूट पंप, दाबनॉपसॉक बॉटरी पंप किंवा अस्फी-हिट पंप वापरावे.

दिषवाधेची लक्षणे : डोकेदुखी, भोदळ येणे, घेरी येणे, मळमळ, उलट्या होणे, दृष्टी अघुक होणे, पाण्यासारखे जुलाब होणे, आंकडी, घाम, येणे, डोल्यातून अधिक पाणी येणे आणि तोंडावाटे लाळ सुटणे अशी लक्षणे दिसु शकतात.

प्रथमोपचार : ज़र गिळने गेले असेल तर, घशात बोट घालून उल्टी करवादी हीच क्रिया पुनः पुनः करीत रहावी जो पर्यंत उल्टी साफ होत नाही, जर रुग्ण बेशुद्ध असेल तर उल्टी करचू नये, दूषित कपडे काढा व त्वचा भरपूर साबण व पाण्याने धुवा.

विषरोधकता: १. रुग्णास त्वरीत अँट्रोपिनीझ द्या आणि त्याचे २ ते ३ मि.ग्रॅ. चे प्रमाण ५ से १० मिनीटाच्या अतराने शिरेद्वारे सतत देत पूणे अॅट्रोपिनाइज देवा. दिवसाकांठी २५ ५० मिग्रॅ अॅट्रोपिन देण्याची गरज पडू शकेल, अॅट्रोपिन सल्फेटचे आणखीन प्रमाणा, लक्षण तशीच राहता दिली जावू शकते। लाळ सुटण्याचे प्रमाण हे अॅट्रोपिनचे प्रमाण कमी जास्त करण्याचे गमक आहे. २. १ते २ ग्रॅम पीएएम १० मि.ली. डिस्टिल्ड पाण्यात विरघळदून त्यांचे इंजेक्शन अगदी सादकाश ग्हणजे १०-१५ मिनिटे लागतील इतक्या साक्काश शिरेतून द्यावे.

साठवण: १. ह्या बुरस्हिनाशकाचे खोके, हतर वस्तु उवण्यासाठी असलेल्या खोल्या व जागा यापासून दूर अशा खोल्यात किंवा जागेत दुरशीनाशकाचे प्रमाण व स्वरुप या नुसार कपाटात, कडी कुलपात ठेवावे. २. हे बुरशीनाशक ठेवण्याच्या खोल्या वा जागा उत्तम बोधणीच्या, कोरड्या, हवा खेल्ती राहणाऱ्या आणि पुरेशा मोठ्या असाव्यात, म्हणजे त्यांचा बाफेने प्रदुषण होणार नाही.

वापरलेल्या डब्यांची बिल्हेबाट- १. निर्माता, उत्पादन बनदिणाऱ्याचे आणि हाताळणाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की पॅकेजिस किंवा उरलेल द्रावणा किंवा मशीनीतील घाणा- पाणी यांची दिल्हेवाटे पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावादी. २. पुन्हा कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उघड्यावर टाकू नयेत. ३. रिकामी पॅकेजिस मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत.

रासायनिक संरचना :

फेन्थोएट टेक (९०% व/व शुद्धता आधारित)	५५.७५% व/व
इमल्सिफायर (आल्कील अरिल सल्फोनेट पॉलिऑक्सि एथिलीन ईथर)	५.०० % व/व
स्टेबिलैजरः एपिक्लोहैड्रिन	१.००% व/व
सॉल्वन्टः अरोमेक्स	३८.२५% व/व
योगः	१००.००% व/व

प०

ફેન્થોયેટ 50% ઇ.સિ.
કીટનાશક

ફેન્થોયેટ 50% ઇ.સી. એ 50% દ્રવ્યોના અવયવોનું બારીક સ્વરૂપમાં સ્ટ્રેન્થ કામ ઇમલ્સિફાયર અને સ્ટેબિલાઇઝર તરીકે કામ કરતાં સહાયક પદાર્થો ધરાવે છે. આ દવાનો ઉપયોગ મોટા ભાગે ચોખાના પાકમાં કરવામાં આવે છે.

રાસાયણિક સંયોજનો :

ફેન્થોયેટ સ્ટ્રેન્થ (ભારાંક 50% ઇલ્લ્લ્/ઇલ્લ્લ્ મુજબ)	55.75% ઇલ્લ્લ્ / ઇલ્લ્લ્
ઇમલ્સિફાયર (આલ્કીલ, આર્યલ સલ્ફોનેટ / સોર્બીટોલ ઓલેટ)	5.00% ઇલ્લ્લ્ / ઇલ્લ્લ્
સ્ટેબલાઇઝર : એપિક્લોરહેડ્રિન	1.00% ઇલ્લ્લ્ / ઇલ્લ્લ્
સ્ટ્રેન્થ : અરોમેક્સ	38.25% ઇલ્લ્લ્ / ઇલ્લ્લ્
કુલ	100.00% ઇલ્લ્લ્ / ઇલ્લ્લ્

અવલોકનમાં લેવાયેલાં લક્ષણો :

પીક	કીટકનું સામાન્ય નામ	પ્રમાણ / હેક્ટરે		ઉમેરવા સંયોજનો અને તેમાંથી તૈયાર થતું મિશ્રણ કયારે લેવું (દિવસોમાં)
		એ.આ. (ગ્રા.)	ફોર્મ્યુલેશન (મિ.લિ.)	પીએએમ દીઠ (લિ.)
ભાત	કેશરી કીડો	500	1000	500-1000
	લશ્કરી કીડો	1000	2000	500-1000
	ગીધડી કીડો	1000	2000	500-1000
	ગીધડી બ્લુઈ કીડો	1000	2000	500-1000
નેપાળી	ઘઉંનો કંસારી	500	1000	500-1000
ઘઉં	ઝીણી ઘૂંટી કંસારી	400	800	500-1000
મરચાં	કેશરી કીડો	1000	2000	500-1000
	ઝીણી ઘૂંટી કંસારી	400	800	500-1000
	કેશરી કીડો	1000	2000	500-1000
ચણા	ચણા (હેલીકો)	250	500	500-1000

મુખ્ય સંરક્ષણ અવલોકન : ચાઇનીઝ સ્ટેઈનર, વૂલ્ફ સ્ટેઈનર, કેન્ટ્રોલર, ઇન્ડ્રોલર, ઇન્ડોલર ચાઇનીઝ સ્ટેઈનર, બ્લ્યૂ-લીફવોર્મ કોલર સ્ટેઈનર.

માંડણકીટકોનો : 1. ઝાકળ ચાઇનો, ઝાકળનો ચાઇનો ઇન્ડ્રો કામ કીટકનો મોટાભાગે ઝાંખોડી. 2. કાગડો, કબૂતરો અને તીતરો કીટકોનાં ઇન્ડ્રોનાં કામકારી મોટા. 3. ઝાકળ કિલોકોલો કોલોનોનું કાકડાવાળી કીટકોમાંથી. 4. કિલોકોલોનાં ઇન્ડ્રો કાકડાકોલોનાં ઇન્ડ્રો અને તીતરો ઇન્ડ્રોનાં કોલોનોનું. 5. કોલોનોનો કીટકોનાં ઇન્ડ્રોનાં ઝાંખોડી. 6. કોલોનોનો કીટકોનાં ઇન્ડ્રોનાં કામકારી મોટા.

ઉપયોગ કરતાં અગત્યની સૂચનાઓ : કોલોનોનો, કોલોનોનો, કોલોનોનો, કોલોનોનો, કોલોનોનો, કોલોનોનો, કોલોનોનો, કોલોનોનો, કોલોનોનો, કોલોનોનો, કોલોનોનો, કોલોનોનો.

પ્રક્રિયા કેવી રીતે : 1. કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો, કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો. 2. કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો. 3. કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો. 4. કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો. 5. કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો. 6. કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો.

પ્રક્રિયાનો : 1. કોલોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોનોનો કોલોન